42550

FLORÆ PARISIENSIS *PRODROMUS*,

OU

CATALOGUE DES PLANTES qui naiſſent dans les environs de Paris, rapportées ſous les Dénominations Modernes & Anciennes, & arrangées ſuivant la Méthode ſéxuelle de M. LINNÆUS.

Avec l'Explication en François de tous les Termes de la nouvelle Nomenclature.

Par M. DALIBARD.

A PARIS,

Chez { DURAND, Libraire, rue S. Jacques, au Griffon.
PISSOT, Quay des Auguſtins, à la Sageſſe.

M. D.CC. XLIX.

Avec Approbation & Privilége du Roy.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

PRE'FACE.

TOUTES les Sciences ont chacune leur langue propre ; la Botanique seule a presqu'autant de langues différentes qu'elle a eu de différens Auteurs. Chacun s'est servi de noms & de phrases particulieres pour représenter les mêmes Plantes ; & quelquefois la même dénomination prise en divers Auteurs marque des plantes toutes différentes. Mais quoique la Nomenclature de la Botanique ait varié dans tous les tems, jamais elle n'avoit éprouvé de si grands changemens que depuis quelques an-

nées. De nouvelles vues ont donné lieu à de nouvelles obſervations, qui ont mis les Botaniſtes modernes en état de rectifier les dénominations des Anciens.

Une dénomination eſt d'autant plus parfaite, qu'elle contient moins de choſes arbitraires & moins de rapports étrangers ; c'eſt une eſpéce de définition, qu'il faut rendre auſſi exacte qu'il eſt poſſible, en n'y employant que les attributs & les qualités viſibles de la plante même, abſtraction faite des relations qu'elle peut avoir avec les autres plantes ſoit du même genre, ſoit de genres différens.

Les Botaniſtes modernes ont ſur les anciens l'avantage d'avoir ſuivi cette régle : ils ont dénommé les plantes par les parties qu'elles contiennent, & les autres

n'avoient preſque fait que les comparer par quelques rapports extérieurs. Les modernes ont encore l'attention de ne mettre dans chacune de leurs Phraſes que ce qui eſt eſſentiel à la plante qu'elle énonce, ce qui la caractériſe le plus particuliérement, en un mot ce qui peut la faire reconnoître à la premiere inſpection ; évitant d'allonger leurs dénominations de termes ſuperflus, qui ne ſervent qu'à charger la mémoire ſans éclairer l'eſprit, ils en banniſſent les noms des anciens Auteurs, des pays où elles naiſſent, de leurs vertus, de leurs propriétés, &c. toutes choſes qui n'appartiennent qu'à l'hiſtoire, & ne ſont pas du reſſort de la Nomenclature.

Lorſqu'un Genre ne contient qu'une ſeule eſpéce, il n'eſt point

néceſſaire d'ajouter de dénomination ſpécifique à ſon nom générique, puiſqu'il n'y a point d'autre eſpéce dont il faille la diſtinguer. Il ſeroit de même à ſouhaiter que chaque Plante eût un ſeul caractére eſſentiel qui la diſtinguât de toutes les autres eſpéces de ſon genre. Dans ce cas chaque dénomination ne ſeroit compoſée que de deux ou trois mots : mais comme il arrive ſouvent qu'une eſpéce porte pluſieurs caractéres différens & communs les uns à quelques-unes, & les autres à quelques-autres eſpéces du même genre, on eſt obligé alors de lui donner une plus longue dénomination. Cependant, toutes choſes d'ailleurs égales, les phraſes les plus courtes ſont toujours les meilleures.

C'eſt en conſéquence de cette

réflexion que M. Linnæus a proposé des termes simples & propres pour exprimer non-seulement toutes les différentes parties des plantes, mais encore les principales qualités, formes, figures, situations, directions & manieres d'être de chacune de ces parties. Il ne s'est pas contenté de joindre des définitions & des explications à chacun de ces termes, pour en fixer & déterminer le véritable sens ; il a encore ajouté des figures à ceux qui en avoient besoin pour en donner une idée plus juste & plus complette. Ses principes adoptés de presque tous ceux qui ont écrit après lui, sont une régle dont il n'est plus permis de s'écarter, & sa maniere de s'exprimer est devenue la langue vivante de la Botanique.

Voulant me familiariſer avec ce nouveau langage, j'ai commencé par ajouter ſur le *Botanicum Pariſienſe* les dénominations des Botaniſtes modernes aux anciennes dénominations des plantes qui naiſſent dans les environs de Paris. J'ai enſuite joint à ce Catalogue celles qui y ont été découvertes depuis, & j'en ai formé cet Ouvrage. Je le rends public, parce qu'il pourra être de quelque utilité à ceux qui voudront s'occuper du même objet.

Dès les premiers pas que l'on fait dans la connoiſſance des plantes, l'on ſent combien il eſt néceſſaire de ſuivre une méthode. Sans ce ſecours, quelles difficultés ne rencontreroit-on pas dans une ſi vaſte carriere ? Quelle confuſion dans une ſi grande

multitude d'objets ? Quel embarras pour les connoître, les diſtinguer, & les retenir ?

De tous ceux qui ont étudié les plantes de ce pays-ci, je crois qu'il n'y a perſonne qui ne ſçache par expérience que le *Botanicum* & les autres Catalogues de ces plantes ſeroient bien plus utiles, s'ils étoient plus méthodiques. L'ordre Alphabétique dans lequel elles y ſont rangées, ne peut ſervir qu'à y faire trouver celles que l'on connoît déja ; mais comment y reconnoître une plante que l'on rencontre à la campagne, ſi l'on n'en ſçait pas le nom ? & où le trouver, ce nom, quand même on verroit le caractére de la plante, ſi l'on n'a avec ſoi les Livres qui contiennent l'un & l'autre ?

C'eſt donc en vue de rendre

ce recueil plus utile que j'y ai rangé les plantes dans un ordre méthodique. J'eſpere que par-là il aura cet avantage de plus que les autres, de mettre les étudians en état d'apprendre à connoître les plantes, & de ſuppléer du moins à la campagne, aux autres Livres élémentaires. La méthode ſexuelle eſt celle que j'ai jugé le plus à propos d'y employer ; pluſieurs raiſons ont concouru à lui faire donner la préférence ſur toutes les autres. 1°. De toutes celles qui ont été propoſées juſqu'à préſent, il n'y en a point qui paroiſſe approcher davantage de la méthode naturelle, qui eſt l'objet des recherches des Botaniſtes ; elle renferme même pluſieurs Claſſes très-naturelles. 2°. Elle eſt fondée ſur les parties des plantes les plus conſtantes &

les moins ſujettes aux variations, les Etamines & les Piſtiles, qui ſont les vrais organes de la génération. 3°. Elle eſt ſimple & aiſée à retenir ; les Claſſes ſont établies ſur les Etamines, organes mâles : les ordres ou ſous-diviſions des Claſſes ſur les Piſtiles, organes fémelles, & les genres ſur l'aſſemblage de toutes les parties de la fructification ; toutes ces parties étant conſidérées ſuivant leur nombre, leur figure, leur proportion, & leur ſituation. 4°. Enfin voulant ajouter aux phraſes des anciens Auteurs de Botanique celles des Botaniſtes modernes, & même faire précéder ces dernieres, on ne pouvoit gueres ſe diſpenſer d'arranger les Plantes ſuivant la nouvelle méthode qui peut le plus

contribuer à les faire connoître.

Ceux qui voudront se donner la peine d'examiner cette méthode en reconnoîtront mieux l'excellence que je ne pourrois l'expliquer. Son Auteur n'a pas prétendu qu'elle fût parfaite ; la seule méthode naturelle, s'il y en a une, pourroit avoir cet avantage. Au défaut de cette derniere, il convient de suivre celle qui paroît y avoir le rapport le plus prochain.

M. Linnæus en s'attachant aux parties les plus essentielles des Plantes, qui sont toutes celles de la fructification, a établi d'une maniere plus fixe que tous les Auteurs qui l'ont précédé, les caracteres des genres. Les descriptions exactes & détaillées qu'il a faites de toutes ces parties,

en ſe ſervant de termes précis qui les rendent au naturel, & les obſervations qu'il a ajoutées à ceux de ſes genres qui portent quelque caractere eſſentiel, ou qui ſouffrent exception dans quelques-unes de leurs eſpèces, ſont le fruit des travaux de cet habile Botaniſte. L'on peut même avancer, ſans crainte de ſe tromper, que ces deſcriptions auront l'avantage de pouvoir ſervir à toutes les méthodes qui pourront être imaginées dans la ſuite. Par l'établiſſement de nouveaux genres, lorſque les anciens étoient inſuffiſans : par la jonction de ceux dont l'identité avoit échapé aux premiers méthodiſtes : par le démembrement de quelques-uns, qui étoient chargés d'un trop grand nombre d'eſpeces, (ce qui embarraſſe &

fatigue le plus les commençans.) Enfin par l'éclairciſſement de quelques autres, dont les caracteres étoient équivoques ou obſcurs, M. Linnæus a trouvé le moyen de rappeller les eſpèces égarées à leurs véritables genres, & d'en détacher celles qui ne leur appartenoient pas.

Les avantages des nouvelles dénominations des Plantes ne ſont pas moins réels que ceux des caractères des genres. C'eſt la premiere raiſon qui m'a déterminé à les préférer aux anciennes, ſans cependant renoncer à celles-ci. Me propoſant de donner dans ce recueil les Plantes des environs de Paris ſous les dénominations de M. Linnæus, & arrangées ſuivant ſa méthode ſéxuelle, je n'ai pas cru pouvoir me diſpenſer d'y

rapporter en forme de préliminaire & les termes nouveaux, & les définitions de cet Auteur. Cherchant à en faciliter l'intelligence ſur-tout aux commençans, qui pourroient trouver de la difficulté à les entendre même ſur le texte latin, j'ai cru qu'on pourroit me ſçavoir quelque gré d'en donner les explications en notre langue. J'ai conſervé les termes latins, en ajoutant à chacun d'eux une interprétation françoiſe auſſi approchante qu'il m'a été poſſible. Tout le monde ſçait que les termes d'Art ne ſont pas aiſés à tranſmettre d'une langue dans une autre; & il n'y a peut-être point de langue plus ingrate que le françois pour ces ſortes d'interprétations. Eu égard à cette difficulté, & en faveur de mon intention, j'eſpere que

l'on voudra bien avoir de l'indulgence pour quelque mots latins que je me ſuis donné la liberté de franciſer au défaut de termes en notre langue qui répondiſſent à leur ſignification. Les figures jointes aux explications de la plûpart, aideront encore à les faire entendre.

Les Livres d'où j'ai tiré les nouvelles phraſes que je rapporte en celui-ci, ſont

1°. De M. LINNÆUS, flora Lapponica. 8°. *Amſterdam.* 1737.

— Hortus Cliffortianus. fol. *Amſterdam.* 1737.

— Viridarium Cliffortianum 8°. *Amſterdam.* 1737.

— Flora ſuecica. 8°. *Stockolm.* 1745.

— Hortus Upſalienſis. 8°. *Stockolm.* 1748.

2°. De M. VAN-ROYEN, floræ Leydenſis Prodromus. 8°. *Leyde.* 1740.

3°. de M. DILLENIUS, Hiſtoria Muſcorum. 4°. *Oxfort.* 1741.

4°. de M. GRONOVIUS, flora Virginica. 8°. *Leyde.* 1743.

5°. De M. HALLER, ſtirpes Helveticæ. fol. *Gottingue.* 1742.

6°. DeM. GUETTARD, Obſervations ſur les Plantes. 12. *Paris.* 1747.

7°. Acta Societatis Regiæ Scientiarum Upſalienſis. 4°.

8°. Acta Societatis Regiæ Scientiarum Stockolmenſis. 4°.

Comme chaque pays a ſes Plantes particulieres, & que les Livres cy-deſſus ne contiennent pas toutes celles qui ſe trouvent dans les environs de Paris, il m'en eſt reſté un certain nombre dont je n'ai pu avoir les

phraſes de la façon de ces Auteurs. A leur exemple, j'ai fait les dénominations de toutes celles dont j'ai pu obſerver la fructification. Pour les autres qu'il ne m'a pas été poſſible de voir en état, j'ai mieux aimé les laiſſer ſous leurs anciens noms, en les rapportant cependant chacune à leurs genres légitimes, que de riſquer d'en faire de mauvaiſes phraſes ſur des Plantes deſſéchées, qui ſouvent ne conſervent plus leurs caracteres ſpécifiques.

J'ai joint les variétés qui ne ſont pour la plûpart, au ſentiment de M. Linnæus, que des effets de la culture, aux eſpeces auſquelles elles appartiennent, en les diſtinguant ſeulement par des aſtériques. J'ai marqué d'une étoile celles qui

étoient connues, & d'une lettre italique celles qui ne ſont reconnues pour telles que par les Auteurs modernes.

LES PARTIES DES PLANTES.

ON compte dans la plûpart des Plantes ſix parties principales ; ſcavoir la Racine *Radix*, le Tronc *Truncus*, les Supports *Fulcra*, les Feuilles *Folia*, les Fleurs *Flores*, & les Fruits *Fructus*.

I. LES RACINES.

Radix. La Racine eſt la partie par laquelle une Plante s'attache à la terre, ou à quelqu'autre corps. Il y en a de trois eſpeces: Bulbeuſe, Tubéreuſe, Fibreuſe..

Radix bulboſa, la Racine bulbeuſe, ou bulbe, eſt ce qu'on appelle vulgairement Oignon, qui eſt le plus

ſouvent garni à ſa baſe de racines fibreuſes. Les bulbes ſont ſolides *Solida*, par couches *tunicata*, écailleux *ſquamoſa*, deux à deux *duplicata*, ou pluſieurs enſemble *aggregata* & de différentes figures.

Radix tuberoſa, la racine tubéreuſe, ou en tubercule, eſt celle qui étant charnue & ſolide, groſſit bien plus que la tige, elle lui eſt adhérente *ſeſſilis*, ou ſuſpendue par un filet *pendula*, & de différentes figures.

Radix fibroſa. La racine fibreuſe eſt compoſée de pluſieurs autres racines plus petites que le tronc d'où elles partent. Elle eſt perpendiculaire *perpendicularis*, ou horiſontale *horizontalis*, charnue *carnoſa*, ou filamenteuſe *filamentoſa*, ſimple *ſimplex*, ou branchue *ramoſa*.

II. LE TRONC.

Truncus. Le Tronc eſt la partie de la Plante qui naît de la racine, & qui ordinairement ſoutient les feuilles, les fleurs, & les fruits. On en diſtin-

gue deux eſpèces, la Tige, & le Chaume.

a. Caulis. La tige eſt ſimple ou compoſée.

Caulis ſimplex. La tige ſimple eſt celle qui ſe continue ſans interruption depuis le bas juſqu'au haut ; on l'appelle entiere *integer*, quand elle ne pouſſe aucunes branches ; & elle eſt ſans feuilles *nudus*, ou garnie de feuilles *foliatus ;* s'éleve droit *rectus*, ou obliquement *obliquus*, en s'entortillant *volubilis*, ou en ſe pliant *flexuoſus* ; ſe panche *reclinatus*, retombe *procumbens*, rampe *repens*, ou pouſſe des ſarments *ſarmentoſus* ; eſt vivace *perennis*, en arbriſſeau *fruticoſus*, en ſousarbriſſeau *ſuffruticoſus*, ou annuelle *annuus* ; eſt cylindrique *teres*, à deux angles *anceps*, à trois angles *trigonus*, *&c.* à pluſieurs angles *polygonus*, canelée *ſtriatus*, en goutiere *canaliculatus*, liſſe *glaber*, velue *villoſus*, raboteuſe *ſcaber*, ou hériſſée de poils *hiſpidus.*

Caulis ramoſus. La tige branchue

pouſſe des branches latérales qui montent *aſcendens*, qui s'écartent *diffuſus*: elle porte de groſſes branches *brachiatus*, quantité de petits rameaux *ramoſiſſimus*, des ſupports *fulcratus* ou eſt prolifique *prolifer*; elle a d'ailleurs tous les attributs de la tige entiere.

Caulis compoſitus. La tige compoſée eſt celle qui ſe perd en ſe ramifiant: elle ſe fourche *dichotomus*, ſe partage en deux rangs de branches *diſtichus*, ou ſe ſubdiviſe *ſubdiviſus*.

b. Culmus le chaume eſt une tige fiſtuleuſe & garnie de feuilles, qui d'ordinaire porte des épis ou des panicules comme dans les graminées; il eſt entier *integer*, ou branchu *ramoſus*, uniforme *æqualis*, articulé *articulatus*; ou écailleux *ſquamoſus*, ſans feuilles *nudus*, ou garni de feuilles *foliatus*.

III. LES SUPPORTS.

Fulcra les Supports ſont certaines parties d'une Plante qui ſervent à ſou-

tenir ou à défendre les autres. On en compte de dix eſpeces, ſçavoir la ſtipule *ſtipula*, la feuille florale *bractea*, la vrille *cirrhus*, l'épine *ſpina*, l'aiguillon *aculeus*, le pétiole ou queuë *petiolus*, le péduncule ou pédicule *pedunculus*, la hampe *ſcapus*, la glande *glandula*, l'écaille *ſquama*.

Pedunculus. Le Péduncule ſert à ſoutenir & porter la fructification, c'eſt-à-dire la fleur & le fruit ; il porte une ſeule fructification *unicam*, deux *geminam*, pluſieurs *plurimam*, un grand nombre *numeroſam*, qui part de la racine *radicalem*, de la tige *caulinam*, des aiſſelles *alarem*, des extrémités *terminatricem* ou *terminalem*, ſolitaire *ſolitariam*, éparſe *ſparſam*, ramaſſée en groupes *conglobatam*, en pelotons *conglomeratam*, en panicule *paniculatam*, en bouquet *corymboſam*, en pacquets *faſciculatam*, en anneaux *verticillatam*, en épis *ſpicatam*, en grappes *racemoſam*, en ombelle *umbellatam*, en tête *capitatam*.

Scapus. La hampe uniquement deſti-

née à porter la fructification, naît immédiatement de la racine, & non pas du tronc.

Petiolus. Le Pétiole soutient les feuilles, comme le Péduncule soutient la fructification.

Cirrhus. La Vrille est une espece de lien, par lequel une Plante s'attache à un autre corps.

Bracteu. La feuille florale est une espece de feuille singuliere qui se trouve près de la fleur, & ne paroît qu'avec elle. (v. n°. 107. des feuilles.)

Stipula. La stipule forme le bourgeon, & se trouve aux insertions.

Aculeus. L'aiguillon est une pointe fragile qui tient si peu à la Plante, qu'on l'en détache aisément sans rien déchirer.

Spina. L'épine est tellement adhérante à la Plante, qu'on ne sçauroit l'arracher sans déchirure.

Glandula. La glande sert à la sécrétion des humeurs.

Squama. L'écaille se trouve d'ordinaire dans les chatons, où elle sert à

couvrir

couvrir les étamines, à la baſe du calice de quelques fleurs [comme à celles des Œillets] ou ſous les fleurs mêmes de quelques Plantes.

IV. LES GENRES DES FEUILLES.

Outre les termes de l'Art les plus uſités, (dit M. Linnæus au commencement du *Hort. Cliff.*) j'ai cru devoir en ajouter quelques-uns pris ſur les feuilles mêmes ; ainſi j'établirai ici les genres primordiaux des feuilles.

Mon intention n'eſt pas de décrire tous les genres, mais ſeulement les principaux, & de ne donner ici que les noms les plus eſſentiels des feuilles. Je prendrai pour cela non pas les termes propres à un ſeul genre, mais ceux qui ſont communs à pluſieurs. Comme d'un côté la quantité de ces noms ſeroit à charge à la mémoire, & que de l'autre on ſe trouveroit fort embarraſſé dans l'uſage, ſi l'on n'en avoit pas un nombre ſuffiſant,

on tâchera de garder un juſte milieu entre ces deux extrémités.

Quand on combine deux genres enſemble, il s'en forme une ſeule eſpece ; ainſi l'eſpece eſt compoſée de deux genres, & ceux-ci deviennent les parties de l'eſpece. Les genres étant une fois établis, il eſt fort aiſé d'en former les eſpeces, qui n'ont plus beſoin de définition, pourvu que les genres en ſoient connus, & qu'ils ne chargent point la mémoire, par exemple :

Cordato-ovatum.	*Ovato-cordatum.*
Cordato-ovale.	*Ovali-cordatum.*
Cordato-oblongum.	*Oblongo-cordatum.*
Cordato-lanceolatum.	*Lanceolato-cordatum.*
Cordato-ſagittatum.	*Sagittato-cordatum.*
Cordato-haſtatum.	*Haſtato-cordatum.*

Mais il faut avoir égard au genre qu'on met le premier ou le dernier dans la formation des eſpeces ; car cela n'eſt pas indifférent. Le dernier marque la forme de la feuille qui en réſulte, & le premier la corrige en quelque ſorte, en y ajoutant

comme une exception, de façon que ſi on les changeoit de place, ce ne ſeroit plus la même feuille : par exemple *Lineari-lanceolatum* eſt plus large, plus approchant du *Lanceolatum* : *Lanceolato-lineare*, eſt plus étroit, & a plus de rapport au *lineare*. Les deux premieres Planches où l'on a gravé les feuilles, aideront à les faire concevoir plus aiſément.

On diviſe les feuilles en trois Claſſes, ſçavoir en ſimples, compoſées, & déterminées.

PREMIERE CLASSE.

DES FEUILLES SIMPLES,

PLANCHE I.

ON nomme feuilles ſimples *ſimplicia*, celles dont le Pétiole n'en porte qu'une.

Il y a ſept ordres de feuilles ſimples, où l'on conſidere une feuille ſuivant ſa circonférence, ſes angles,

ſes ſinus, ſa bordure, ſa ſurface, ſon ſommet, & ſes côtés.

I. *CIRCUMSCRIPTIO* la Circonférence d'une feuille dépend de ſon contour conſidéré ſans ſinus & ſans angles ; ainſi l'on doit comprendre ſous ce titre, toute figure qui ſe préſente ſous la forme d'un anneau diverſement comprimé, ſans pourtant y admettre aucun ſinus ni aucun angle.

On n'a ici aucun égard à l'extrémité ni de la bordure ni du ſommet ; on ne conſidére les feuilles que comme entieres, en faiſant abſtraction des diviſions qu'elles peuvent avoir.

On appelle *Folium*.

1. *Orbiculatum*, feuille orbiculaire ou ronde, celle dont la longueur & la largeur ſont égales, & dont les bords ſont également éloignés du centre, *fig.* 1.

2. *Subrotundum*, ſousorbiculaire, celle qui a plus de largeur que de longueur, *fig.* 2.

Ce terme ſe prend auſſi ſouvent

dans un ſens plus étendu, & renferme les articles 1. 2. 3. 4. 5.

3. *Ovatum*, en forme d'œuf, celle qui eſt plus longue que large, & dont la baſe ou partie inférieure forme un ſegment de cercle, pendant que la ſupérieure ſe retrécit vers le ſommet. *fig.* 3.

Obversè ovatum, en forme d'œuf renverſé, la même. (3.) Quand elle eſt attachée au Pétiole par ſa partie la plus étroite.

4. *Ovale* ſeu *Ellipticum*, ovale, ou elliptique, celle qui eſt plus longue que large, & dont les parties ſupérieure & inférieure ſont de même largeur, l'une & l'autre même ſegment de cercle. *fig.* 4.

5. *Oblongum*, oblongue, celle dont la longueur contient pluſieurs fois la largeur, & dont l'une & l'autre extrémité eſt plus étroite qu'un ſegment de cercle. *fig.* 5.

6. *Cuneiforme*, en forme de coin, celle dont la longueur ſurpaſſe la largeur, & dont la partie inférieure ſe

13. *Rotundum*, arrondie, celle qui n'a aucun angle, & qui eſt par conſéquent oppoſée à celles des articles précédens. (7---12.)

III. *SINUS*, les Sinus partagent le diſque de la feuille en pluſieurs parties.

Ces ſinus ſont ou { à la baſe 14--18. / au haut 21. 22. / aux côtés 23--25. 19. 20. / tout autour 26.

14. *Réniforme*, en forme de rein, c'eſt la feuille ſousorbiculaire (2.) creuſée à la baſe & ſans angle. *fig.* 9.

15. *Cordatum*, en cœur, c'eſt la feuille en forme d'œuf (3.) creuſée à ſa baſe, & ſans angles à ſa partie poſtérieure. *fig.* 10.

Obversè cordatum, en cœur renverſé, la même (15.) lorſqu'elle eſt attachée au Pétiole par le ſommet.

16. *Lunulatum*, en forme de croiſſant, c'eſt la feuille ſousorbiculaire (2.) creuſée à la baſe avec deux angles curvilignes en forme de faulx à ſa partie poſtérieure. *fig.* 11.

17. *Sagittatum* en fer de flêche, c'eſt la feuille triangulaire (10.) creuſée à la baſe. *fig.* 13.

18. *Cordato-ſagittatum*, c'eſt la précédente (17.) avec des bords convexes. *fig.* 14.

19. *Haſtatum*, en fer de pique, c'eſt la feuille triangulaire (10.) dont les côtés & la baſe ſont creuſés, & les angles réfléchis. *fig.* 15.

20. *Panduræforme*, Dill. en forme de Violon, c'eſt la feuille oblongue, (5.) ſerrée par les côtés, plus large par le haut, & encore plus par le bas.

21. *Bifidum*, fendue en deux, c'eſt une feuille partagée par le haut en deux parties, deſquelles les bords inférieurs en dedans de la coupure ſont droits. *fig.* 16.

D'où il eſt aiſé de reconnoître ce que c'eſt que *trifidum*, fendue en trois, *quadrifidum*, fendue en quatre; *quinquefidum*, *multifidum*, le nombre des découpures étant limité.

22. *Trilobum*, découpée en trois lobes; c'eſt une feuille partagée juſ-

qu'au milieu en trois parties écartées les unes des autres, & qui ont les bords arrondis. *fig.* 17.

Ce que l'on vient de dire, fait ſuffiſamment connoître ce que ſignifient *bilobum*, *quadrilobum*, *quinquelobum*; il ne s'agit que d'avoir égard au nombre des lobes. *fig.* 19.

23. *Palmatum*, en forme de main ouverte; c'eſt une feuille qui ſe partage en pluſieurs parties depuis le haut juſqu'au de-là du milieu, ou preſque juſqu'à la baſe. *fig.* 22.

24. *Pinnatifidum*, découpée en forme d'aîles, c'eſt celle qui a pluſieurs ſinus latéraux ſéparés par de longues découpures horizontales. *fig.* 23.

25. *Laciniatum*, déchiquetée, celle qui a pluſieurs ſinus juſqu'au milieu de la feuille, & dont les lobes ſont eux-mêmes découpés. *fig.* 24.

26. *Sinuatum*, remplie de ſinus proprement dite, eſt celle qui a ſur ſes côtés des ſinus ſéparés par des lobes peu découpés. *fig.* 25.

Sinuato-dentatum, la même (26.) dont les lobes latéraux sont linéaires. *fig.* 26.

Retrorsum sinuatum, la même (26.) dont les lobes sont aigus, & tournés vers la base. *fig.* 27.

27. *Quinquepartitum*, partagée en cinq, celle qui est découpée en cinq parties jusqu'à la base. *fig.* 28.

En changeant le nombre, on entend la signification de *bipartitum*, *tripartitum*, *quadripartitum* & *multipartitum*.

28. *Integrum*, entiere, celle qui n'a aucun sinus, par conséquent c'est l'opposée des nº. (14--27.)

Indivisum, c'est la même chose, & synonime de la précédente (28.) mais il faut bien distinguer *integrum* de *integerrimum* (38.) le premier de ces termes marque qu'il n'y a point de sinus dans le disque de la feuille, & le second qu'il n'y en a point à la bordure, où n'atteint pas le premier.

IV. *Margo*, la Bordure marque les

diverſités qui ſe rencontrent ſur le limbe, & au bord même de la feuille, pourvu qu'elles n'intéreſſent pas le diſque. On n'y comprend point celles qui ſe rencontrent à la bordure du ſommet.

29. *Dentatum*, dentelée, celle dont la bordure eſt garnie de pointes horizontales, de même conſiſtence que la feuille, diſtinctes & ſéparées les unes des autres.

30. *Serratum*, à dens de ſcie, celle dont la bordure eſt garnie d'angles aigus, ou dentelures poſées les unes ſur les autres en maniere de tuiles, & ordinairement tournées vers le ſommet. *fig.* 31.

Retrorſum ſerratum, la même (30.) dont les dentelures ſont tournées vers la baſe.

Obſoletè ſerratum, la même (30.) dont les dentelures ſont émouſſées.

Duplicato-ſerratum, la même (30.) dont la bordure eſt garnie de deux ſortes de dentelures, de plus petites ſur de plus grandes. *fig.* 32.

31. *Crenatum*, crénelée, celle dont

la bordure eſt garnie d'angles ou dentelures contigues, & tournées en dehors ſans être aucunement courbées ni vers le ſommet ni vers la baſe. *fig.* 38.

Acutè crenatum, la même (31.) dont les dentelures ſont aigues. *fig.* 35.

Obtusè crenatum, la même (31) dont les dentelures ſont arrondies. *fig.* 36.

Duplicato-crenatum, la même (31.) garnie de plus petites dentelures ſur de plus grandes. *fig.* 33.

32. *Repandum*, godronnée, celle dont la bordure eſt marquée dans toute ſa longueur de lobes qui font chacun un ſegment de cercle entremêlés de ſinus obtus. *fig.* 46.

33. *Cartilagineum*, cartilagineuſe, celle dont la bordure eſt diſtinguée par une eſpece de cartilage de la ſubſtance membraneuſe ou charnue de la feuille. *fig.* 34.

34. *Ciliatum*, celle qui eſt bordée tout au tour de poils ou filets paralleles comme les cils des paupieres. *fig.* 50.

35. *Lacerum*, déchirée, celle dont la bordure eſt compoſée de ſegmens entaſſés de grandeur & de figure différentes. *fig.* 24.

36. *Criſpum*, crêpue ou friſée, celle qui étant ondée ou pliſſée, a ſa bordure dentelée, crénelée, déchiquetée, ou déchirée. (29. 30. 31. 35.) *fig.* 39.

37. *Eroſum*, rongée, celle qui a des ſinus dans ſon diſque, & d'autres petits & obtus à ſa bordure. *fig.* 21.

38. *Integerrimum*, tout-à-fait entiere, celle dont la bordure eſt entiere & ſans aucune découpure. *fig.* 42.

On a vu (28.) en quoi elle eſt différente de la feuille entiere.

V. *SUPERFICIES*, la Surface d'une feuille montre ce qui ſe rencontre au-deſſus & au revers.

39. *Tomentoſum*, drappée ou cottonneuſe, celle qui eſt couverte de poils que l'œil ne peut pas diſtinguer. *fig.* 48.

40. *Piloſum*, velue, celle dont la

ſurface eſt garnie de poils apparens. *fig.* 47.

Hirſutum, *villoſum*, *lanigerum*, ont à peu près la même ſignification que *piloſum*. (40.)

41. *Hiſpidum*, hériſſée de poils, celle dont la ſurface eſt parſemée de filets roides & fragiles. *fig.* 49.

42. *Scabrum*, raboteuſe, celle dont le diſque eſt couvert de petites inégalités.

43. *Aculeatum*, piquante, celle dont la ſurface eſt hériſſée de pointes cartilagineuſes, piquantes, & faciles à arracher.

44. *Spinoſum*, épineuſe, celle dont le diſque ou la bordure eſt armée de pointes cartilagineuſes, piquantes, & tellement adhérantes à la feuille qu'on ne ſçauroit les en ſéparer ſans l'offenſer.

45. *Papilloſum*, garnie de mammelons, celle dont la ſurface eſt couverte de très-petites véſicules. *fig.* 54.

46. *Nitidum*, liſſe, celle qui eſt luſtrée comme ſi on l'avoit polie exprès.

47. *Plicatum*, pliſſée, celle de la baſe de laquelle il ſort des vaiſſeaux ou nervures qui s'étendent juſqu'aux bords, les uns élevant, & les autres abaiſſant alternativement le diſque de la feuille à angles aigus. *fig.* 37.

48. *Undulatum*, ondée, celle dont la partie extérieure du diſque devient plus étendue qu'un cercle de même diametre, enſorte que les bords s'élevent & s'abaiſſent ſymmétriquement. *fig.* 46.

49. *Rugoſum*, ridée, celle dont les veines enfoncées laiſſent entr'elles des eſpaces plus étroits que la ſubſtance du diſque, de façon que la chair interpoſée ſurmonte. *fig.* 51.

50. *Venoſum*, veinée, celle qui eſt parſemée de vaiſſeaux très-branchus, où l'on apperçoit une grande quantité d'anaſtomoſes. *fig.* 52.

51. *Nervoſum*, nerveuſe, celle dont les vaiſſeaux ſont ſimples, & s'étendent parallélement de la baſe vers le ſommet ſans aucunes ramifications. *fig.* 53.

52. *Nudum*, nue, celle qui n'a aucune des marques indiquées (39-51.) & qui par conſéquent leur eſt oppoſée.

VI. *APEX*, le Sommet d'une feuille repréſente les diverſités qui ſe rencontrent à ſon extrémité ſupérieure.

53. *Truncatum*, tronquée, celle dont le ſommet eſt terminé par une ligne tranſverſale.

Retuſum, émouſſée, celle dont le ſommet eſt terminé par un ſinus obtus. *fig.* 46.

55. *Præmorſum*, rongée au ſommet, celle qui eſt tronquée & partagée au ſommet par un ſinus aigu & ouvert. *fig.* 18.

56. *Emarginatum*, échancrée, celle qui a une petite entaille au ſommet.

Obtusè emarginatum, la même (56.) dont l'entaille eſt terminée par des ſommets obtus. *fig.* 45.

Acutè emarginatum, la même (56.) dont l'entaille eſt terminée par des ſommets aigus. *fig.* 44.

57. *Obtuſum*, obtuſe, celle qui

est terminée par un segment de cercle. *fig.* 40.

58. *Acutum*, aigue, celle qui est terminée par un angle aigu. *fig.* 41.

59. *Acuminatum*, pointue, celle qui est terminée par un sommet pointu comme une alêne. (9.) *fig.* 42.

60. *Obtusum cum acumine*, obtuse avec une pointe, celle dont le sommet est obtus, & terminé par une petite pointe aigue. *fig.* 43.

VII. *Latera*, les Côtés s'apperçoivent quand on considere de toutes parts les feuilles dans une situation perpendiculaire.

61. *Teres*, celle qui est cilindrique, excepté le sommet, ~~pour l'ordinaire~~. *fig.* 62.

62. *Tubulosum*, fistuleuse, celle qui est creuse en-dedans, ce qui s'apperçoit quand on la coupe transversalement.

63. *Carnosum*, charnue, celle qui est remplie de pulpe, ou substance charnue entre les membranes, qui forment ses surfaces supérieure & inférieure.

64. *Membranaceum*, membraneuſe, celle dont les membranes ne renferment point de pulpe.

65. *Depreſſum*, déprimée, celle qui porte une empreinte, comme ſi elle avoit été preſſée du côté qui regarde la tige.

66. *Compreſſum*, comprimée, celle qui porte la même empreinte des deux côtés oppoſés qui ne regardent point la tige.

67. *Planum*, platte ou plane, c'eſt la feuille déprimée (65.) dont la longueur peut être cenſée horizontale.

68. *Convexum*, convexe, c'eſt la feuille déprimée (65.) qui eſt relevée dans ſon milieu.

69. *Concavum*, concave, la feuille déprimée (65.) qui eſt creuſée dans ſon milieu.

70. *Canaliculatum*., en goutiere, c'eſt la feuille déprimée (65.) qui eſt creuſée en goutiere ſuivant toute ſa longueur. *fig.* 61.

71. *Enſiforme*, en forme d'épée,

c'eſt la feuille comprimée (*66.*) qui eſt affilée par ſes deux bords, avec une arrête convexe dans toute ſa longueur.

72. *Acinaciforme*, Dill. en forme de ſabre, c'eſt la feuille comprimée en fer de lance, dont les côtés ſont convexes dans leur partie inférieure, le bord extérieur affilé, & l'intérieur obtus & plus droit. *fig.* 56.

73. *Dolabriforme*, Dill. en forme de doloire, c'eſt la feuille comprimée, ſousorbiculaire, obtuſe, qui eſt ſaillante, & affilée en dehors, & preſque cilindrique par ſa partie inférieure. *fig.* 57

74. *Linguiforme*, Dill. en forme de langue, c'eſt la feuille linéaire, obtuſe, charnue, déprimée, convexe en deſſous, & ordinairement cartilagineuſe à ſa bordure. *fig.* 55.

75. *Triquetrum*, à trois faces, celle qui a trois faces planes; elle eſt en même tems preſque toujours ſubulée. (*9.*) *fig.* 59.

D'où il eſt aiſé de reconnoître ce

que signifie *quadriquetrum.*, *&c.*

76. *Trigonum*, à trois arrêtes, c'est la précédente (75.) mais dont les faces sont creusées en goutiere, & les arrêtes affilées & membraneuses.

Ce qui explique clairement la signification de *Tetragonum*, *Pentagonum*, *&c.* que l'on confond ordinairement avec (10. 11. 12.)

77. *Sulcatum*, sillonnée, celle qui est entourée d'arrêtes sans nombre, seulement entremêlées de sinus obtus. *fig.* 60.

78. *Striatum*, cannelée, celle qui est empreinte de lignes creusées parallélement dans toute sa longueur.

SECONDE CLASSE.

DES FEUILLES COMPOSÉES.

PLANCHE II.

LES Feuilles composées se divisent en composées proprement dites, recomposées, & surcomposées.

Les feuilles compoſées ſe forment de pluſieurs feuilles ſimples réunies enſemble. Quand pluſieurs feuilles ſont portées ſur un même pétiole commun, il en réſulte une feuille compoſée.

On nomme feuille *folium*, celle qui eſt compoſée de pluſieurs petites, & *foliolum* foliole, chacune de celles qui forment la feuille compoſée.

79. On appelle proprement compoſées (*compoſita*) celles qui ne le ſont qu'une fois, ou qui ne ſont le produit que d'une ſeule compoſition.

80. *Digitatum*, en éventail, celle qui raſſemble pluſieurs folioles au ſommet d'un pétiole commun, & par conſéquent renferme les eſpeces (81. 82. 83.) mais dans un ſens plus ſtricte, c'eſt celle qui eſt compoſée de plus de quatre folioles. *fig. 66.*

81. *Ternatum*, compoſée de trois, celle qui porte trois folioles à l'extrémité d'un pétiole commun.

Foliolis ſeſſilibus, folioles ſans pétiole propre. *fig.* 64.
Foliolis petiolatis, folioles ayant chacune leur propre pétiole. *fig.* 65.

82. *Binatum*, compoſée de deux, celle qui porte deux folioles ſur un pétiole commun. *fig.* 63.

83. *Ramuloſum*, rameuſe, celle qui porte pluſieurs folioles ſur un pétiole commun, & branchu. *fig.* 67.

84. *Pinnatum*, la feuille aîlée, ou en façon d'aîles, eſt celle qui eſt compoſée de folioles rangées des deux côtés le long d'un pétiole commun.

Comme cela ſe fait de différentes manieres, il ſera bon de détailler les eſpeces ſuivantes.

a. Pinnatum cum impari, la même (84.) terminée par une ſeule foliole impaire. *fig.* 68.
—*abruptum*, la même (84.) qui n'eſt terminée ni par une impaire, ni par une vrille. *fig.* 69.
—*oppoſitè*, la même (84.) dont les folioles ſont oppoſées. *fig.* 69.
—*alternatim*, la même (84.) dont

les folioles ſont rangées alternativement. *fig.* 70.
—*interruptè*, la même (84.) dont les folioles ſont inégales. *fig.* 71.
—*cirrhosè*, la même (84.) terminée par une ou par pluſieurs vrilles. *fig.* 72.
—*foliolis decurrentibus*, ou *decurſivè*, à folioles courantes. (voyez §. 111.) *fig.* 74.
—*petiolis membranaceis*, la même (84.) dont les pétioles ſont membraneux & articulés. *fig.* 75.

85. *b. conjugatum*, la feuille conjuguée eſt la précédente (84.) compoſée d'une ſeule paire de folioles. *fig.* 73.

Elle eſt ou
- *abruptum*, ſans vrilles.
- *cirrhoſum*, avec des vrilles *b b.*
- *Petiolis membranaceis*, avec pétioles membraneux. *d d.*
- *Petiolis ſtipulatis*, avec pétioles accompagnés de ſtipules. *c c.*

86.

86. *c. Lyratum*, en maniere de lyre; c'eſt une feuille compoſée, formée d'une feuille ſimple, qui ſe diviſe en ſa partie inférieure de telle ſorte que les découpures d'en-bas s'écartent du corps de la feuille, & ſont détachées de la plus grande qui occupe le haut. *fig.* 76.

87. *d. Decompoſita*, les feuilles recompoſées ſont celles dont le pétiole commun ſe partage deux fois avant de ſe charger de folioles, comme dans les deux articles ſuivans. (88. 89.)

88. *Duplicato-ternatum*, eſt une feuille compoſée de feuilles compoſées elles-mêmes chacune de trois folioles. (81.) *fig.* 77.

Bigeminatum, ſe dit de la feuille doublement conjuguée (85.)

89. *Duplicato-pinnatum*, ou *Pinnato-Pinnatum*, eſt une feuille compoſée de feuilles déja compoſées en aîles. *fig.* 78.

90. *e. Supradecompoſita*, les feuilles ſurcompoſées ſont celles dont le

pétiole commun ſe ſubdiviſe plus de deux fois, avant de ſe charger de folioles, comme dans les deux articles ſuivans. (91. 92.)

91. *Triplicato ternatum*, ou *Ternato ternatum*, celle dont le pétiole ſe partage trois fois en trois branches, avant d'admettre les folioles. *fig.* 79.

92. *Triplicato-Pinnatum*, celle dont le pétiole pouſſe trois ſubdiviſions en aîles, (84.) avant de ſe charger de folioles.

Ses feuilles particulieres ſont terminées

ou { par deux folioles, (*abrupta.*) *fig.* 80.
ou { par une impaire, (*cum impari.*) *fig.* 81.

TROISIE'ME CLASSE.

DES FEUILLES DETERMINE'ES.

LA détermination des feuilles conſiſte dans cette différence qui fait diſtinguer une feuille, ſans avoir égard à ſa ſtructure, ni à ſa forme.

La détermination ſe diviſe en quatre ordres, qui conſiſtent dans la direction, le lieu, l'inſertion, & la ſituation.

1. *Directio*, la Direction eſt cette expanſion que la feuille acquiert depuis la baſe juſqu'au ſommet. *fig.* 82.

93. *Inflexum*, arquée, celle qui ſe retourne vers la plante. *a. a.*

94. *Erectum*, dreſſée, celle qui fait un angle fort aigu avec la perpendiculaire. *b. b.*

95. *Patens*, ouverte, celle qui s'écarte de la perpendiculaire à angle preſque droit. *c. c.*

96. *Horizontale*, ou *Patentiſſimum*,

horizontale, celle qui fait angle droit avec la perpendiculaire. *d. d.*

97. *Reclinatum* & *Reflexum*, rabattue, celle dont le sommet est plus bas que la base. *e. e.*

98. *Revolutum*, roulée, celle dont la partie supérieure se roule en-dessous. *f. f.*

99. *Radicans*, poussant racine, celle qui pousse une radicule de son sommet, comme le font quelques Fougeres.

100. *Radicatum*, enracinée, celle qui pousse des racines de dessous son disque, comme il arrive à quelques Algues.

101. *Natans*, flottante, celle qui se soutient à la surface de l'eau. *Pl.* 1. *fig.* 29.

II. *Locus*, le lieu d'une feuille est l'endroit de la plante où elle est attachée. *fig.* 83.

102. *Seminale*, feuille séminale, ou *Cotiledon*, est celle qui sort la premiere de la semence germée. *a. a.*

103. *Radicale*, Radicale, celle qui

ſort immédiatement de la racine, ſans être attachée à la tige. *b. b.*

104. *Caulinum*, de la tige, celle qui ſort de la tige. *c. c.*

105. *Ramoſum*, des branches, celle qui eſt poſée ſur une branche. *d. d.*

106. *Subalare*, celle qui ſe trouve ſous les ramifications, ou de l'aiſſelle de laquelle il ſort une ou pluſieurs branches. *e. e.*

107. *Florale*, florale, celle qui ſe trouve proche de la fleur, & qui ne pouſſe jamais ſans la fleur. (§. III. des ſupports.)

III. *Inſertio*, l'Inſertion des feuilles eſt la maniere dont elles ſont attachées à la plante. *fig.* 84.

108. *Peltatum*, en rondache, celle dont le pétiole s'attache au diſque même, & non pas à la baſe ou au bord de la feuille. *a.*

109. *Petiolatum*, à queue, celle dont le pétiole entre dans le bord de la baſe. *b.*

110. *Seſſile*, ſans queue, celle qui naît immédiatement ſur la tige, ou

ſur les branches ſans aucun pétiole. *c.*

111. *Decurrens*, courante, la même (110.) dont la partie inférieure s'étend au-de-là de la baſe en deſcendant le long de la tige ou des branches, & y eſt adhérante. *d.*

112. *Amplexicaule*, embraſſant la tige, c'eſt celle dont la baſe s'étend de façon qu'elle environne la tige de tous côtés. Cela eſt ordinairement ainſi lorſqu'une feuille ſans queue eſt en forme de cœur, ou en fer de flêche. *e.*

Semiamplexicaule, la même (112.) dont les lobes de la baſe ſont trop courts pour embraſſer totalement la tige.

113. *Perfoliatum*, enfilée, celle dont le diſque eſt tranſpercé par la tige, la branche ou le péduncule ſans aucune adhérence à ſes bords. *f.*

114. *Connata folia*, feuilles cohérantes, ſont des feuilles oppoſées (119.) dont les baſes s'uniſſent de part & d'autre, & ne font qu'un ſeul corps. *g.*

115. *Vaginans*, feuille en guaine, c'eſt celle dont la baſe porte ſur un cilindre ou tuyau, qui enveloppe de toutes parts la tige, une branche, ou le péduncule, comme dans la plûpart des graminées. *h.*

IV. *Situs*, la ſituation des feuilles dépend de la poſition de chacune par rapport aux autres. *fig.* 85.

116. *Articulata folia*, feuilles articulées, ce ſont celles qui croiſſent du ſommet l'une de l'autre. *a.*

117. *Stellata*, en étoiles, celles dont il y en a plus de ſix verticillées, ou rangées comme par anneaux autour de la tige. *b. b.*

118. *Terna*, *quaterna*, *quina*, *ſena*, &c. trois à trois, quatre à quatre, cinq à cinq, ſix à ſix, &c. ſont des eſpeces des précédentes (117.) en nombre conſtant. *c. c.*

119. *Oppoſita*, oppoſées, ce ſont deux feuilles de la tige qui ſe trouvent vis-à-vis l'une de l'autre, la tige entre deux. *d. d.*

120. *Alterna*, alternes, celles qui

ſont rangées comme par dégrés en montant le long de la tige de part & d'autre alternativement.

121. *Sparſa*, éparſes, celles qui ſont parſemées ſur la plante ſans aucun ordre.

122. *Conferta*, entaſſées, celles qui ſont tellement preſſées qu'on n'en peut découvrir diſtinctement la ſituation. *f.*

123. *Imbricata*, arrangées en maniere de tuiles ou d'écailles, celles qui étant entaſſées (122.) ſont en même tems dreſſées. (94.) *g.*

124. *Faſciculata*, en pacquets, ce ſont celles qui ſortent pluſieurs enſemble d'un même point. *h.*

125. *Aceroſa* * Celles qui ſont articulées ſur les branches. *fig.* 86.

126. *Frondes.* On nomme feuillage les feuilles qui ſont confondues avec la fructification, ou avec les

* M. Linnæus n'a point aſſez expliqué ce terme pour le bien faire entendre, & ne l'a employé dans aucune de ſes phraſes.

branches, de façon qu'on ne ſçauroit les expoſer diſtinctement. *fig.* 87.

Les Parties de la Fructification.

Les parties de la fructification ſont ou générales ou particulieres. Les générales ſont au nombre de deux, la fleur & le fruit. Les particulieres ſont au nombre de ſept avec leurs ſous-diviſions ou eſpeces. Le Calice, la Corolle, l'Etamine, le Piſtile, le Péricarpe, la Semence, & le Réceptacle, ou Placenta. Les quatre premieres appartiennent à la fleur, & les trois dernieres au fruit.

V. LES PARTIES DE LA FLEUR.

PLANCHE III.

I. *Calyx*, le Calice enveloppe ou ſoutient les autres parties de la fleur: on en compte ſept eſpeces, le Périanthe, l'enveloppe, le ſpathe, la bale, le chaton, la coëffe & la bourſe.

Perianthium, le Périanthe eſt l'eſpece de calice la plus commune; il

eſt ſouvent compoſé de pluſieurs piéces, où s'il eſt d'une ſeule piéce, il ſe partage au moins en pluſieurs découpures, il n'enveloppe pas toujours la fleur toute entiere.

Involucrum, l'Enveloppe embraſſe pluſieurs fleurs ramaſſées enſemble, qui peuvent avoir chacune leur périanthe propre. Elle eſt compoſée de pluſieurs piéces diſpoſées en rayons, & quelquefois colorées (*aaa. fig.* 1.) cette eſpece ſe rencontre ſur-tout dans le deuxiéme ordre de la V. Claſſe.

Spatha, le Spathe enveloppe une ſeule fleur ou pluſieurs raſſemblées, & ordinairement dépourvues de périanthe propre; il conſiſte en une membrane attachée à la tige, de différente figure & conſiſtance (*b b b. fig.* 2.) il y en a auſſi de deux piéces (*c c. fig.* 2.) il ſe trouve dans pluſieurs genres des Claſſes I. III. VI. XX.

Gluma, la Bale eſt une eſpece de calice conſacrée ſur-tout à la famille

des graminées, elle eſt compoſée de deux ou trois valvules (*dd. fig.* 3.) membraneuſes, & le plus ſouvent tranſparentes à leurs bords.

Amentum ou *Julus*, le Chaton eſt un amas de fleurs toutes mâles ou toutes fémelles, attachées à une eſpece d'axe ou de poinçon. Les écailles, lorſqu'il y en a, leur ſervent de calyces (*fig.* 4.) il ſe rencontre dans la Claſſe XXI.

Calyptra, la coëffe eſt une enveloppe mince, membraneuſe, & le plus ſouvent conique, qui couvre les parties de la fructification; elle ſe trouve ordinairement aux ſommités des fleurs de pluſieurs Mouſſes.

Volva, la Bourſe eſt une eſpece d'enveloppe épaiſſe, qui d'abord renferme certaines Plantes de la famille des Champignons, & s'ouvre enſuite par le haut, pour les laiſſer ſortir. Elle eſt propre ſur-tout aux *Phallus*.

II. *Corolla*, la Corolle environne immédiatement les parties de la gé-

nération. Il y en a deux eſpeces, le Pétale & le Nectarium ; on l'appelle monopétale, quand elle eſt d'une ſeule pièce, & Polypétale, quand elle eſt de pluſieurs piéces.

Petalum, le Pétale eſt une eſpece de corolle ordinairement diſtinguée par la beauté de ſa couleur (*e. e. fig.* 5.) quand la corolle eſt monopétale, on y diſtingue le tuyau *Tubus*, (*h.*) & le limbe *Limbus.* (*g.*) quand elle eſt polypétale, on diſtingue dans chaque pétale l'onglet *unguis* (*l.*) & la lame *lamina.* (*i.*)

Nectarium, c'eſt une eſpece ou plus ordinairement une partie de la corolle deſtinée à contenir le miel ; il y en a de différentes figures ; c'eſt ou une foſſette, ou une écaille, ou un petit tuyau, ou enfin un tubercule. Voyez-en pluſieurs eſpeces. (*f. f. f. fig.* 5.)

Corollula tubulata, le Fleuron à tuyau, appellé ſimplement Fleuron, conſiſte en un limbe en cloche, découpé en cinq ou en quatre lobes

qui se recourbent en s'ouvrant. (*fig.* 9.)

Corollula ligulata, le Fleuron à languette, qu'on nomme Demi-fleuron, consiste en un limbe linéaire & plat, tourné en-dehors, dont le sommet est entier, tronqué, à trois ou à cinq dentelures. (*fig.* 10.)

III. *Stamen*, l'Etamine renferme les parties mâles de la génération; elle est composée de deux parties, le filet & le sommet.

Filamentum, le Filet sert à soutenir le sommet, il a quelquefois la forme d'une alêne, & alors on le dit subulé, *subulatum*.

Anthera, le Sommet est la partie essentielle de l'étamine, ou l'organe mâle de la génération, il consiste dans un petit sac à une ou à plusieurs cavités, ordinairement attaché à la pointe du filet.

IV. *Pistillum*, le Pistile renferme les parties fémelles de la génération, sçavoir le germe, le stile, & le stigmate.

Germen, le Germe défend & renferme les embrions des ſemences ; il tient lieu de matrice dans les Plantes.

Stylus, le Stile porte ſur le germe, ſoutient le ſtigmate, & tient lieu de trompe ; il y a quelques Plantes qui n'ont point de ſtile.

Stigma, le Stigmate eſt l'organe femelle de la génération ; il y en a de différentes figures ; il eſt ordinairement placé à l'extrémité du ſtile, & quand il n'y a point de ſtile il porte ſur le germe.

VI. LES PARTIES DU FRUIT.

V. *Pericarpium*, le Péricarpe formé du germe groſſit & renferme les petites ſemences ou graines (*m. n. fig. 6.*) il manque quelquefois. On en compte huit eſpeces, ſçavoir la capſule, la coque, la ſilique, la gouſſe, le fruit à noyau, la pomme ou le fruit à pépin, la baye, le cône.

Capſula, la Capſule eſt compoſée de pluſieurs panneaux ſecs & élaſti-

ques, qui dans la maturité s'ouvrent le plus ſouvent par leur ſommité. On l'a dit *unilocularis* ou *multilocularis*, ſuivant que les graines y ſont diſtribuées en une ou en pluſieurs loges.

Conceptaculum, la Coque eſt différente de la capſule uniloculaire, en ce que les panneaux en ſont mols & moins roides.

Siliqua, la Silique (*fig.* 7.) eſt compoſée de deux panneaux (*o. o.* qui s'ouvrent de la baſe vers la pointe, ſéparés par un diaphragme ou cloiſon membraneuſe, d'où pendent les petites ſemences attachées chacune par un cordon ombilical.

Legumen, la Gouſſe (*fig.* 8.) eſt un péricarpe oblong à deux coſſes aſſemblées en-deſſus & en-deſſous par une ſuture longitudinale. Les ſemences (*q. q.*) ſont attachées alternativement au limbe ſupérieur de chacune de ces coſſes.

Drupa, le Fruit à noyau eſt compoſé d'une pulpe charnue, molle, & ſucculente, qui renferme dans ſon milieu un noyau.

Pomum, la Pomme ou fruit à pépin eſt compoſée d'une pulpe charnue & ſolide, au milieu de laquelle ſont nichées les ſemences défendues par des enveloppes membraneuſes.

Bacca, la Baye renferme les ſemences à nud au milieu d'une pulpe ſucculente.

Strobilus, le Cone eſt compoſé de pluſieurs écailles appliquées les unes contre les autres, & contournées par le haut.

VI. On ſçait aſſez ce que c'eſt que la Semence, il y en a de deux ſortes, la graine & la noix.

Nux, la Noix approche de la dureté d'un os, & renferme la véritable ſemence.

Semen, la Graine, ou le corps de la ſemence eſt de toutes ſortes de figures ; elle eſt quelquefois ornée d'une couronne.

Corona, la Couronne eſt ſimple (*fig.* 11. *t.*) ou aigretée. (*fig.* 10. & 11. *x. z. u.*)

Pappus, l'Aigrette eſt ou ſans pied,

ſeſſilis. u. (*u. fig.* 10. & 11.) ou avec un pied *ſtipiti inſidens* (*r. x. s. z. fig.* 11.) chacune de ces aigrettes ſe diviſe encore en ſimple & branchue, la ſimple (*u. z.*) eſt compoſée de rayons ſimples, & la branchue (*u. x. fig.* 10. & 11.) de rayons barbelés, ou en forme de barbe de plume.

VII. *Receptaculum*, le Réceptacle, ou Placenta eſt l'endroit ſur lequel eſt portée la fleur ou le fruit, ou tous deux enſemble ; il y en a de différentes figures.

EXPLICATION
DES CLASSES.

Planche IV.

LES Plantes portent des fleurs visibles ou presqu'invisibles.

Les fleurs visibles sont ou hermaphrodites, c'est-à-dire garnies chacune d'Etamines & de Pistiles en même tems, ou d'un seul sexe, c'est-à-dire toutes mâles, lorsqu'elles n'ont que des étamines sans pistiles, ou toutes fémelles quand elles n'ont que des pistiles sans étamines.

Les étamines sont détachées les unes des autres, ou unies, soit entr'elles par quelqu'une de leurs parties, soit avec le pistile.

Les étamines ne gardent entr'elles aucune proportion exacte de longueur, ou bien il y en a constamment un certain nombre qui sont plus courtes que le reste.

Les Classes dans la méthode sexuel-

le sont établies sur ces principes, & renferment les Plantes suivant le nombre, la proportion, & la situation des étamines, sçavoir

Pour les Plantes qui portent des fleurs hermaphrodites.

I. *Monandria*, Monandrie, une étamine.

II. *Diandria*, Diandrie, deux étamines.

III. *Triandria*, Triandrie, trois étamines.

IV. *Tetrandria*, Tétrandrie, quatre étamines.

V. *Pentandria*, Pentandrie, cinq étamines.

VI. *Hexandria*, Héxandrie, six étamines égales, ou alternativement plus longues & plus courtes.

VII. *Heptandria*, Heptandrie, sept étamines.

VIII. *Octandria*, Octandrie, huit étamines.

IX. *Enneandria*, Ennéandrie, neuf étamines.

X. *Décandria*, Décandrie, dix étamines.

XI. *Dodecandria* , Dodécandrie ; douze étamines.

XII. *Icosandria* , Icosandrie , plus de douze étamines attachées aux parois internes du calice , & non pas au Placenta.

XIII. *Polyandria*, Polyandrie, plus de douze étamines attachées au Placenta.

Pour les Plantes qui portent des fleurs dans lesquelles il se trouve constamment deux étamines plus courtes que les autres.

XIV. *Didynamia* , Didynamie , deux étamines plus longues.

XV. *Tetradynamia*, Tétradynamie, quatre étamines plus longues.

Pour les Plantes dont les étamines sont unies , soit entr'elles par quelqu'une de leurs parties , soit avec le pistile.

XVI. *Monadelphia*, Monadelphie, toutes les étamines réunies par leurs filets en un seul corps.

XVII. *Diadelphia* , Diadelphie , toutes les étamines réunies par leurs filets en deux corps.

XVIII. *Polyadelphia*, Polyadélphie, toutes les étamines réunies par leurs filets en trois ou en plusieurs corps.

XIX. *Syngenesia*, Syngénésie, toutes les étamines unies par leurs sommets en forme de Cylindre.

XX. *Gynandria*, Gynandrie, les étamines portées sur le pistile même, & non pas sur le Placenta.

Pour les Plantes qui ont des fleurs de différent sexe.

XXI. *Monoecia*, Monœcie, fleurs mâles & fleurs fémelles sur le même individu.

XXII. *Dioecia*, Diœcie, fleurs mâles & fleurs fémelles, chacune sur des individus séparés.

XXIII. *Polygamia*, Polygamie, fleurs hermaphrodites avec fleurs d'un seul sexe, mâles ou fémelles, sur le même individu.

Pour les Plantes dont les fleurs sont presque invisibles.

XXIV. *Cryptogamia*, Cryptogamie, fleurs renfermées dans le fruit, ou que leur petitesse empêche d'appercevoir.

EXPLICATION DES ORDRES.

LES Ordres ou Sous-diviſions des Claſſes ſont établis ſur les piſtiles, comme les Claſſes le ſont ſur les étamines.

Le nombre des piſtiles ſe prend à la baſe du ſtile, & quand il n'y a point de ſtile, on compte les ſtigmates.

Les Ordres des 13. premieres Claſſes ſont :

1. *Monogynia*, Monogynie, un piſtile.

2. *Digynia*, Digynie, deux piſtiles.

3. *Trigynia*, Trigynie, trois piſtiles.

4. *Tetragynia*, &c.

Polyginia, Polygynie, piſtiles ſans nombre.

La 14. Claſſe (Didynamie) ſe diviſe en deux Ordres.

1. *Gymnoſpermia*, Gymnoſpermie, quatre graines à découvert au fond du Calice.

2. *Angioſpermia*, Angioſpermie, les graines renfermées dans un péricarpe.

La 15. Claſſe (Tétradynamie) ſe diviſe auſſi en deux Ordres.

1. *Siliculoſa*, à Silicules, Péricarpe ſous-orbiculaire garni d'un ſtile à peu près de même longueur.

2. *Siliquoſa*, à ſiliques, Péricarpe très-long avec un ſtile peu apparent.

La 19. Claſſe (Syngénéſie) ſe diviſe en cinq Ordres.

Polygamia, Polygamie, fleur compoſée de pluſieurs fleurons.

1. *Polygamia æqualis*, Polygamie égale, fleur compoſée de fleurons hermaphrodites, tant dans ſon diſque qu'à ſa circonférence.

2. *Polygamia ſuperflua*, Polygamie ſuperflue, fleur compoſée de fleurons hermaphrodites dans le diſque, & de fleurons fémelles à la circonférence.

4. *Polygamia fruſtranea*, Polygamie fauſſe, fleur compoſée de fleurons hermaphrodites dans le diſque, & de fleurons neutres à la circonférence.

4. *Polygamia neceſſaria*, Polygamie néceſſaire, fleur compoſée de fleurons mâles dans le diſque, & de fleurons fémelles à la circonférence.

5. *Monogamia*, Monogamie, fleur qui n'eſt point compoſée de fleurons.

La 16. Claſſe (Monadelphie,) la 17. (Diadelphie,) la 18. (Polyadelphie,) la 20. (Gynandrie,) la 21. (Monœcie,) la 22. (Dioécie,) & la 23. (Polygamie,) établiſſent leurs Ordres ſur les caracteres Claſſiques des Claſſes qui les précédent.

Enfin la derniere Claſſe (Cryptogamie,) ſe diviſe en autant d'Ordres qu'il y a de familles qui la compoſent.

INDEX.

INDEX

VOCABULORUM RECENS PROPOSITORUM.

A.

Abruptus.	xxix. xxx. xxxij
Aceroſus.	xxxviij
Acinaciformis.	xxvj
Aculeatus.	xxj
Aculeus.	v. vj
Acuminatus.	xxiv
Acutè.	xix. xxiij
Acutus.	xxiv
Æqualis.	iv
Aggregatus.	ij
Alaris.	v
Alternatim.	xxix
Alternus.	xxxvij
Amentum.	xlj
Amplexicaulis.	xxxvj
Anceps.	iij
Angioſpermia.	liij
Angulus.	xij
Annuus.	iij
Anthera.	xliij
Apex.	xxij

Articulatus. iv
Aſcendens. iv. xxxvij

Bacea. xlvj
Bifidus. xv
Bigeminatus. xxxj
Bilobus. xvj
Binatus. xxix
Bipartitus. xvij
Brachiatus. iv
Bractea. v. vj
Bulboſus. j

C.

Calyptra. xlj
Calyx. xxxix
Canaliculatus. iij. xxv
Capitatus. v
Capſula. xliv
Carneſus. ij. xxiv
Cartilagineus. xix
Caulinus. v. xxxv
Caulis. iij
Ciliatus. xix
Circumſcriptio. x
Cirrhosè. xxx
Cirrhoſus. xxx
Cirrhus. v. vj
Compoſitus. iv. xxviij

Compressus. xxv
Concavus. xxv
Conceptaculum. xlv
Confertus. xxxviij
Conglobatus. v
Conglomeratus. v
Conjugatus. xxx
Connatus. xxxvj
Convexus. xxv
Cordato-hastatus. viij
Cordato-lanceolatus. viij
Cordato-oblongus. viij
Cordato-ovalis. viij
Cordato-ovatus. viij
Cordato-sagittatus. viij. xv
Cordatus. xiv
Corolla. xlj
Corollula. xlij. xliij
Corona. xlvj
Corymbosus. v
Cotiledon. xxxiv
Crenatus. xviij
Crispus. xx
Cryptogamia. lj
Culmus. iv
Cum acumine. xxiv
Cum impari. xxix. xxxij
Cuneiformis. xj

D.

Decandria. xlix
Decompositus. xxxj
Decurrens. xxx. xxxvj

Decurſivè. xxx
Deltoides. xiij
Dentatus. xviij
Depreſſus. xxv
Determinatio. xxxiij
Diadelphia. l
Diandria. xlix
Dichotomus. iv
Didynamia. l
Diffuſus. iv
Digynia. lij
Digitatus. xxviij
Directio. xxxiij
Diſtichus. iv
Dodecandria. l
Dolabriformis. xxvj
Drupa. xlv
Duplicato-crenatus. xix
Duplicato-pinnatus. xxxj
Duplicato-ſerratus. xviij
Duplicato-ternatus. xxxj
Duplicatus. ij

E.

Ellipticus. xj
Emarginatus. xxiij
Enneandria. xlix
Enſiformis. xxv
Erectus. xxxiij
Eroſus. xx

F.

Fasciculatus. v. xxxviij
Fibrosus. ij
Filamentosus. ij
Filamentum. xliij
Flexuosus. iij
Floralis. xxxv
Flores. j
Folia. j
Foliatus. iij. iv.
Foliolum. xxviij. xxx
Folium. xxviij
Frondes. xxxviij
Fructus. j
Fruticosus. iij
Fulcra. j. iv
Fulcratus. iv.

G.

Geminus. v
Germen. xliv
Glaber. iij
Glandula. v. vj
Gluma. xl
Gymnospermia. liij
Gynandria. lj

H.

Hastato-cordatus. viij
Hastatus. xv

Heptandria. xlix
Hexandria. xlix
Hirsutus. xxj
Hispidus. xxj
Horizontalis. ij. xxxiij

I.

Icosandria. I
Imbricatus. xxxviij
Indivisus. xvij
Inflexus. xxxiij
Insertio. xxxv
Integer. iv. xvij
Integerrimus. xvij. xx
Interruptè. xxx
Involucrum. xl
Julus. xlj

L.

Laciniatus. xvj
Lacerus. xx
Lamina. xlij
Lanceolato-cordatus. viij
Lanceolato-linearis. ix
Lanceolatus. xij
Laniger. xxj
Latera. xxiv
Legumen. xlv
Ligulatus. xliij
Limbus. xlij

Lineari-lanceolatus. ix
Linearis. xij
Linguiformis. xxvj
Locus xxxiv
Lunulatus. xiv
Lyratus. xxxj

M.

Margo. xvij
Membranaceus. xxv. xxx
Monadelphia. l
Monandria. xlix
Monoecia. lj
Monogamia. liv
Monogynia. lij
Multifidus. xv
Multilocularis. xlv
Multipartitus. xvij

N.

Natans. xxxiv
Nectarium. xlij
Nervosus. xxij
Nitidus. xxj
Nudus. iij. iv. xxiij
Numerosus. v
Nux. xlvj

O.

Obliquus. iij
Oblongo-cordatus. viij

Oblongus. xj
Obſoletè. xviij
Obtusè. xix. xxiij
Obtuſus. xxiij. xxiv
Obversè. xj. xiv
Octandria. xlix
Oppoſitè. xxix
Oppoſitus. xxxvij
Orbiculatus. x
Ovali cordatus. viij
Ovalis. xj
Ovato-cordatus. viij
Ovatus. xj

P.

Palmatus. xvj
Panduraformis. xv
Paniculatus. v
Papilloſus. xxj
Pappus. xlvj
Patens. xxxiij
Patentiſſimus. xxxiij
Pedunculus. v
Peltatus, xxxv
Pendulus. ij
Pentagonus. xxvij
Pentandria. xlix
Perennis. iij
Perfoliatus, xxxvj
Perianthium. xxxix
Pericarpium. xliv

Perpendicularis. ij
Petalum. lxij
Petiolatus. xxix. xxxv
Petiolus. v. vj
Pilosus. xx
Pinnatifidus. xvj
Pinnato-pinnatus. xxxj
Pinnatus. xxix
Pistillum. xliij
Planus. xxv
Plicatus. xxij
Plurimus, v
Polyadelphia. lj
Polyandria. l
Polygamia. lj. liij
Polygamia æqualis. liij
Polygamia frustranea. liv
Polygamia Monogamia. liv
Polygamia necessaria. liv
Polygamia superflua. liij
Polygonus. iij
Polygynia. lij
Pomum. xlvj
Præmorsus. xxiij
Prolifer. iv
Procumbens. ij

Q

Quadrifidus. xv
Quadrilobus. xvj

Quadripartitus. xvij
Quadriqueter. xxvij
Quaternus. xxxvij
Quinquangularis. xiij
Quinquefidus. xv
Quinquelobus. xvj
Quinquepartitus. xvij
Quinus. xxxvij

R.

Racemosus. v
Radicalis. v. xxxiv
Radicans. xxxiv
Radicatus. vxxiv
Radix. j. ij
Ramosissimus. iv
Ramosus. ij. iv. xxxv
Ramulosus. xxix
Receptaculum. xlvij
Reclinatus. iij. xxxiv
Rectus. iij
Reflexus. xxxiv
Reniformis. xiv
Repandus. xix
Repens. iij
Retrorsùm. xvij xviij
Retusus. xxiij
Revolutus. xxxiv
Rotundus. xiv
Rugosus. xxij

S.

Agittato-cordatus. viij
Sagittatus. xv
Sarmentoſus. iij
Scaber. ilj. xxj
Scapus. v
Semen. xlvj
Semiamplexicaulis. xxxvj
Seminalis. xxxiv
Senus. xxxvij
Serratus. xviij
Seſſilis. ij. xxix. xxxv. xlvij
Siliculoſus. liij
Siliqua. xlv
Siliquoſus. liij
Simplex. ij. iij. ix
Sinuato-dentatus. xvij
Sinuatus, xvj. xvij
Sinus. xiv
Situs. xxxvij
Solidus. ij
Solitarius. v
Sparſus. v. xxxviij
Spatha. xl
Spicatus. v
Spina. v. vj
Spinoſus. xxj
Squama. v. vj
Squamoſus. ij. iv
Stamen. xliij

Stellatus, xxxvi
Stigma. xliv
Stipiti inſidens. xlvij
Stipula. v. vj
Stipulatus. xxx
Striatus. iij. xxvij
Strobilus. xlvj
Stylus. xliv
Subalaris. xxxv
Subdiviſus. iv
Subrotundus. x
Subulatus. xiij. xliij
Suffruticoſus. iij
Sulcatus. xxvij
Superficies. xx
Supradecompoſitus. xxxj
Syngenéſia. lj

T.

Teres. iij. xxiv
Terminalis. v
Terminatrix. v
Ternato-ternatus. xxxij
Ternatus. xxviij
Ternus. xxxvij
Tetradynamia. l
Tetragonus. xxvij
Tetragynia. lij
Tetrandria. xlix
Tomentoſus. xx
Triandria. xlix

Triangularis. xiij
Trifidus. xv
Trigonus. iij. xxvij
Trigynia. lij
Trilobus. xv
Tripartitus. xvij
Triplicato-pinnatus. xxxij
Triplicato-ternatus. xxxij
Triqueter. xxvj
Truncatus. xxiij
Truncus. i. ij
Tuberosus. ij
Tubulatus. xlij
Tubulosus. xxiv
Tubus. xlij
Tunicatus. ij

V.

Vaginans. xxxvij
Venosus. xxij
Verticillatus. xxv
Villosus. iij. xxj
Umbellatus. v
Undulatus. xxij
Unguis. xlij
Unicus. v
Unilocularis. xlv
Volva. xlj
Volubilis. iij

FLORÆ

Feuilles simples.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Feuilles composées.

Feuilles determinées



a
a
a
1
a
a
d
b
b
2
b
c
c
3
d
d
4
e
e
e
f
f
f
5
e
g
h
i
l
f
6
m
n
y
9
y
10
u
o
o
7
p
x
r
z
s
11
q
8
q
t
u

FLORÆ PARISIENSIS PRODROMUS.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

Monogynia.

1. HIPPURIS. *flor. lapp.* 1. *hort. cliff.* 3. *flor. ſuec.* 2. *flor. leyd. prodr.* 205.
Limnopeuce. *Cord. Hiſt.* 150.
Equiſetum paluſtre, brevioribus foliis, polyſpermon. *Pin.* Presse d'eau, ou Pin aquatique.

Digynia.

1. CORISPERMUM foliis oppoſitis. *flor. lapp.* 2. *hort. cliff.* 3. *fl. ſuec.* 3. *fl. leyd. prodr.* 205.
Stellaria quæ Alſine aquis innatans,

foliis longiuſculis. *Bauh. hiſt.* 3. 786.
a. Stellaria quæ Lenticula paluſtris bifolia, fructu tetragono. *Pin.* 362. *ex fl. ſuec.*
b. β.—quæ Lenticula paluſtris anguſtifolia, folio in apice diſſecto. *flor. pruſſ. ex fl. ſuec.*
c. γ.—aquatica, foliis longis tenuiſſimis. *Rai. plukn. almag. bot. ex fl. lapp.*

CLASSIS II.

DIANDRIA,

MONOGYNIA.

1. LIGUSTRUM. *hort. cliff.* 6. *flor. ſuec.* 4. *flor. leyd. prodr.* 398.
Liguſtrum. *Bauh. hiſt.* 1. 528. TROESNE.
a.—foliis è luteo variegatis. *hort. reg. par.*
1. SYRINGA foliis lanceolato-cordatis. *hort. cliff.* 6. *flor. leyd. prodr.* 397.
Lilac Matthioli. 1237. LILA.

Lilac flore saturatè purpureo. *I. R. H.* 602.

*α.—flore albo. *I. R. H.* 601.

1. CIRCÆA. *hort. cliff.* 7. *fl. suec.* 5. *fl. leyd. prodr.* 303.

*—calice colorato. *fl. lapp.* 3.

Circæa Lutetiana. *lob. ic.* 260. CIRCEE.

1. VERONICA floribus spicatis, foliis oppositis, caule procumbente. *fl. suec.* 8.

*—caule repente, scapis spicatis, foliis oppositis ovatis strigosis. *fl. lapp.* 5. *hort. cliff.* 8. *fl. leyd. prodr.* 302.

Veronica mas supina & vulgatissima. *Pin.* 246. VERONIQUE.

*—ead. floribus rubellis.

*—ead. floribus candidis. *Pin.*

2. VERONICA floribus spicatis; foliis oppositis, caule erecto. *flor. suec.* 7.

*—foliis oppositis, caule spicâ terminato. *hort. cliff.* 8. *fl. leyd. prodr.* 302.

Veronica spicata minor. *Pin.* 247.

Veronica flore pallidè cæruleo.
*——ead. flore albo. *Pin.*
*——ead. flore roſeo.
α Veronica ſpicata anguſtifolia. *Pin.* 246. *ex hort. cliff.*
3. VERONICA floribus racemoſis decuſſatis, foliis oblongo-ſagittatis dentatis. *obſ. pl.* 226.
Veronica ſupina, facie Teucrii pratenſis. *Lob. Ic.* 473.
4. VERONICA floribus racemoſis lateralibus, foliis ovatis plicatis dentatis. *fl. ſuec.* 12.
*——foliis oppoſitis plicatis dentatis, ſcapis ex alis inferioribus laxè ſpicatis. *hort. cliff.* 8. *fl. leyd. prodr.* 303.
*——Foliis cordatis ſeſſilibus oppoſitis, ramis laxè floriferis. *fl. lapp.* 8.
Veronica minor, foliis imis rotundioribus. *hiſt. ox. part.* 2. 220.
*——ead. flore obſoletè purpuraſcente.
*——ead. foliis oblongis, flore cæruleo.
5. VERONICA floribus ſolitariis, foliis ovatis glabris crenatis. *fl. ſuec.* 14.

*Veronica foliis inferioribus oppositis ovatis, superioribus alternis lanceolatis, floribus solitariis. *hort. cliff.* 9. *fl. leyd. prodr.* 302.

*—floribus sparsis, foliis ovatis crenatis glabris. *fl. lapp.* 6.

Veronica pratensis serpilli folia. *Pin.* 247.

*—ead. flore albo.

6. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus. *fl. suec.* 16.

*—foliis oppositis cordatis crenatis, floribus solitariis sessilibus. *hort. cliff.* 9. *fl. leyd. prodr.* 303.

Veronica floscul is cauliculis adhærentibus. *hist. ox.* 322.

7. VERONICA floribus solitariis subsessilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtusis integerrimis, caule erecto. *fl. suec.* 15.

Veronica minima, Clinopodii minoris folio, Romana. *Bocc. mus. part.* 2. 19. *t.* 102.

*—ead. flore purpuro-cæruleo.

8. VERONICA floribus solitariis,

foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus. *fl. ſuec.* 19.

Veronica foliis alternis inferioribus quinquepartitis, ſuperioribus tripartitis, floribus ſolitariis. *hort. cliff.* 9. *fl. leyd. prodr.* 303.

Veronica verna trifido vel quinquefido folio. *I. R. H.* 145.

*—verna, folio integro triangulari dentato.

9. VERONICA floribus ſolitariis foliis cordatis inciſis pedunculo brevioribus. *fl. ſuec.* 17.

*—foliis cordatis crenatis, floribus ſolitariis pedunculatis. *hort. cliff.* 9. *fl. leyd. prodr.* 303.

Veronica floſculis oblongis pediculis inſidentibus, Chamædryos folio. *hiſt. ox. part.* 2. 322.

*—ead. flore cæruleo & albo mixto.

*—ead. Chamædryos folio alterno. *hort. L. Bat.*

10. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. *fl. ſuec.* 18.

*—foliis alternis cordatis quinquelo-

bis, floribus ſolitariis. *hort. cliff.* 9. *fl. leyd. prodr.* 303.

Veronica Cymbalariæ folio verna. *I. R. H.* 145.

*—ead. flore purpuraſcente.

11. VERONICA floribus racemoſis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *fl. ſuec.* 11.

*—foliis oppoſitis lævibus crenatis, floribus racemoſis lateralibus. *hort. cliff.* 8.

*—foliis oppoſitis lævibus crenatis, floribus laxè ſpicatis lateralibus. *fl. leyd. prodr.* 302.

Veronica aquatica major, folio ſubrotundo. *hiſt. ox. part.* 2. 323.

*—ead. minor. *I. R. H.*

12. VERONICA floribus racemoſis lateralibus, foliis lanceolatis ſerratis, caule erecto. *fl. ſuec.* 10.

Veronica aquatica major, folio oblongo. *hiſt. ox.* 323.

*—aquatica minor, folio oblongo. *I. R. H. ex hort. cliff.*

13. VERONICA floribus racemoſis lateralibus, foliis linearibus integerrimis. *fl. ſuec.* 9.

* Veronica foliis lineari-lanceolatis integris, racemis laxè floriferis. *fl. lapp.* 9. *hort. cliff.* 10. *fl. leyd. prodr.* 302.

Veronica aquatica, anguſtiore folio. *I. R. H.* 145.

14. VERONICA minor annua, Ocymi caryophyllati folio ſubtùs rubro, flore cæruleo. *Bot. Par.* 202.

1. PINGUICULA nectario cylindraceo, longitudine petali. *fl. lapp.* 11. *fl. ſuec.* 21. *fl. leyd. prodr.* 304.

Pinguicula Geſneri. *Bauh. hiſt.* 3. 546. GRASSETTE.

1. UTRICULARIA nectario conico. *fl. lapp.* 14. *fl. ſuec.* 24. *fl. leyd. prodr.* 304.

Lentibularia vulgaris. *hiſt. par.* LENTIBULAIRE.

2. UTRICULARIA nectario carinato. *fl. ſuec.* 25.

Lentibularia minor. *Bot. Par.*

Milleſolium paluſtre galericulatum minus, flore minore. *PLUKN.*

1. GRATIOLA. *Bauh. hiſt.* 3. 434. *hort. cliff.* 9.

Gratiola Centauroides. *Pin.* 279.

Digitalis minima, Gratiola dicta. *hiſt. ox. part.* 2. 479. GRATIOLE. HERBE A PAUVRE HOMME.

1. VERBENA foliis multifido-laciniatis, ſpicis filiformibus. *hort. cliff.* 11. *fl. ſuec.* 26. *fl. leyd. prodr.* 327.

Verbena communis, cæruleo flore. *Pin.* 269. VERVEINE.

*——ead. floribus albidis. *Pin.*

1. LYCOPUS foliis indiviſis. *fl. ſuec.* 27.

* Lycopus. *hort. cliff.* 11. *fl. leyd. prodr.* 326.

Lycopus paluſtris glaber. *I. R. H.* 191. PATTE DE LOUP.

*——paluſtris villoſus. *I. R. H.* 191.

1. SALVIA foliis ſerrato-ſinuatis, corollis calyce anguſtioribus *virid. cliff.* 4. *fl. leyd. prodr.* 309.

*——foliis pinnatim inciſis glabris. *hort. cliff.* 12.

Horminum Sylveſtre Lavandulæ flore. *Pin.* 239. HORMIN.

2. SALVIA foliis oblongo-cordatis, ſerrato-crenatis, floralibus calyce longioribus. *hort. cliff.* 12. *fl. leyd. prodr.* 309.

Salvia foliis cordato-ovatis obſcurè undulatis, foliolis floralibus lanceolato concavis. *obſ. pl.* 263.

Sclarea. *Tabern. Icon.* 373. ORVALE. TOUTE BONNE.

3. SALVIA foliis ovatis inciſo-crenatis, verticillis ſubnudis. *hort. cliff.* 12. *virid. cliff.* 5. *fl. ſuec.* 28. *fl. leyd. prodr.* 310.

Sclarea pratenſis, foliis ſerratis, flore cæruleo. *I. R. H.* 179.

*——ead. flore dilutè cæruleo, vel ſuave rubente, vel albo. *I. R. H.* 179.

a. Sclarea foliis profundè inciſis, quæ Orvala ſylveſtris, quarta ſpecies. *Dod.* 293. *ex hort. cliff.*

DIGYNIA.

1. ANTHOXANTHUM. *fl. ſuec.* 29.

*——floſculis Diandris. *hort. cliff.* 25.

Gramen pratenſe, ſpicâ flaveſcente. *Pin.* 3.

CLASSIS III.

TRIANDRIA, MONOGYNIA.

1. VALERIANA foliis omnibus pinnatis. *hort. cliff.* 15. *fl. ſuec.* 30. *fl. leyd. prodr.* 234.

Valeriana ſylveſtris major. *Pin.* 164. VALERIANE.

a. Valeriana ſylveſtris major altera, folio lucido. *hort. reg. par. ex. hort. cliff.*

2. VALERIANA dioica. *it. oel.* 46. *fl. ſuec.* 31.

*—foliis caulinis pinnatis, ſexu diſtincta. *hort. cliff.* 16.

*—foliis caulinis pinnatis, polygama. *virid. cliff.* 5. *fl. leyd. prodr.* 235.

Valeriana paluſtris minor. *Pin.* 164.

*—Aquatica minor, flore minore. *Rai. hiſt.* 386.

Species fœmina. *ex obſ. pl.* 128.

*—ead. flore albo.

3. VALERIANA foliis lanceolatis integerrimis, floribus monandris caudatis. *hort. cliff.* 15. *fl. leyd. prodr.* 235.

Valeriana rubra. PIN. 165.

*——ead. flore carneo.

4. VALERIANA caule dichotomo, foliis linearibus, floribus triandris. *fl. fuec.* 32.

*——caule dichotomo, foliis lanceolatis integris. *virid. cliff.* 5. (fructu simplici.) *hort. cliff.* 16. *fl. leyd. prodr.* 235.

Valerianella arvensis præcox humilis, semine compresso. *Mor. umb.* MACHE, ou PLANCHETTE.

a.——semine umbilicato nudo rotundo. *mor. umb. ex obs. pl.* 127.

b.——semine umbilicato nudo oblongo. *mor. umb. ex obs. pl.* 127.

5. VALERIANA caule dichotomo, foliis oblongis plerumque serratis, seminis coronâ tridentatâ.

Valerianella arvensis serotina altera, semine turgidiore. *mor. umb.*

*——arvensis serotina, foliis serratis. *I. R. H.*

1. IRIS foliis enſiformibus, corollis imberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus. *hort. cliff.* 19. *fl. ſuec.* 33. *fl. Leyd. prodr.* 18.

Iris paluſtris lutea. *Tabern. Icon.* 643. FLAMBE.

*—ead. Foliis glaucis brevibus. *hort. L. Bat.*

2. IRIS foliis enſiformibus, corollis imberbibus, petalis interioribus longitudine ſtigmatis. *hort. cliff.* 19. *fl. leyd. prodr.* 18.

Iris fœtidiſſima, ſeu Xyris. *I. R. H.* 360.

3. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro. *hort. cliff.* 18. *fl. leyd. prodr.* 17.

Iris hortenſis latifolia. *Pin.* 31.

1. SCHOENUS culmo tereti nudo, capitulo ovato, involucri diphylli valvulâ alterâ ſubulatâ longâ. *fl. ſuec.* 36.

*—floſculis ſpicatis. *hort. cliff.* 22. *fl. leyd. prodr.* 48.

Gramen ſpicatum, Junci facie, Lithospermi ſemine. *I. R. H.* 518.

Juncus lævis paniculâ glomeratâ nigricante. *Rai. hiſt.* 1305.

2. SCHOENUS culmo ſubtriquetro folioſo, floribus faſciculatis foliis ſetaceis. *fl. ſuec.* 34.

*—floſculis faſciculatis. *hort. cliff.* 22. *fl. leyd. prodr.* 48.

Juncus paluſtris glaber, floribus albis. *Bot. Par.* 110.

Gramen cyperoides paluſtre leucanthemum. *Rai. hiſt.* 1295.

3. SCHOENUS culmo tereti, foliis margine dorſoque aculeatis. *fl. ſuec.* 35.

Mariſcus *Hall. Helv.* 251.

Scirpus paluſtris altiſſimus, foliis & carinâ ſerratis. *I. R. H.* 528.

Pſeudo-cyperus paluſtris, foliis & carinâ ſerratis. *Scheuc.*

1. CYPERUS culmo triquetro folioſo, paniculâ folioſâ ſupra decompoſitâ, pedunculis nudis, ſpicis alternis. *fl. leyd. prodr.* 50.

Cyperus odoratus, radice longâ; ſive cyperus officin. *Pin.* 14. SOUCHET.

2. CYPERUS culmo triquetro nu-

do, paniculâ folioſâ ſupra decompoſitâ, ſpicis confertis diſtichè compreſſis.

Cyperus minimus, paniculâ ſparſâ flaveſcente. *I. R. H.* 527.

3. CYPERUS culmo triquetro nudo, paniculâ diphyllâ ſupra decompoſitâ, ſpicis ſtrigoſioribus confertis diſtichè compreſſis. *præced. n.* 2. *varietas videtur.*

Cyperus minimus, paniculâ ſparſâ nigricante. *I. R. H.* 527.

1. SCIRPUS culmo triquetro folioſo, paniculâ filioſâ, pedunculis nudis ſuprà decompoſitis, ſpicis confertis. *fl. ſuec.* 38.

Cyperus culmo triquetro, paniculâ folioſâ, pedunculis nudis ſuprà decompoſitis, ſpicis confertis. *fl. leyd. prodr.* 49.

Cyperus gramineus. *Bauh. hiſt.* 3. 504.

2. SCIRPUS culmo triquetro, paculâ conglobatâ foliaceâ, ſpicularum ſquamis trifidis, intermediâ ſubulatâ. *fl. ſuec.* 39.

Cyperus culmo triquetro, paniculâ foliaceâ, pedunculis ſimpliciſſi-

mis, ſpicis confertis. *fl. leyd. prodr.* 50.

Cyperus vulgatior, paniculâ ſparſâ. *I. R. H.* 527.

3. SCIRPUS culmo tereti nudo, ſpicis plurimis pedunculatis terminatricibus. *fl. ſuec.* 40.

*——ſpicis copioſis. *fl. leyd. prodr.* 48.

Scirpus paluſtris altiſſimus. *I. R. H.* 528.

a. Alga fluviatilis graminea, longiſſimo folio. *I. R. H.* 569. *ex hiſt. muſc.* 13. (Vid. Valliſneria in Claſſe XXII.)

4. SCIRPUS ſpicis pauciſſimis ſub apice culmi conglomeratis. *Hall. Helv.* 248.

Scirpus omnium minimus capitulo breviori. *I. R. H.* 528.

5. SCIRPUS culmo tereti nudo, ſpicis ſeſſilibus in medio culmo glomeratis.

Scirpus ſupinus minimus, capitulis conglobatis, foliis rotundo-teretibus. *I. R. H.* 528.

6. SCIRPUS culmo tereti nudo, ſpicâ ſubovatâ imbricatâ terminatrice. *fl. ſuec.* 41.

* Scirpus culmo nudo, ſpicâ terminatrice ſubovatâ *fl. leyd. prodr.* 48.

Scirpus Equiſeti capitulo majori. *I. R. H.* 528.

7. SCIRPUS caule aphyllo, ſpicâ imbricatâ ſubrotundâ, glumis obtuſis. *Hall. Helv.* 249. cui cæterum varietas præcedentis *n. 6. videtur.*

Scirpus Equiſeti capitulo rotundiori. *Bot. Par.* 179.

8. SCIRPUS culmo tereti nudo ſetæformi, ſpicâ ovatâ bivalvi terminatrice, ſeminibus nudis. *fl. ſuec.* 43.

*——magnitudine aciculæ. *fl. lapp.* 21.

Scirpus Equiſeti capitulo minori. *I. R. H.* 529.

Item. Scirpus omnium minimus, capitulo longiori. *I. R. H.*

9. SCIRPUS culmo ſtriato nudo, ſpicâ bivalvi terminatrice longitudine calycis, radicibus ſquamulâ interſtinctis *fl. ſuec.* 42.

*——folio culmi unico. *fl. lapp.* 20. *fl. leyd. prodr.* 49.

Scirpus, qui Gramen Junceum, foliis & ſpicâ Junci minus. *Pin.* 5.

10. SCIRPUS, foliis linearibus planis alternatim fasciculatis, spicâ terminatrice. *obs. pl.* 141.

Scirpus qui Gramen Junceum clavatum repens, foliis, & capitulis Psyllii. *hist. ox.* 3. *s.* 8. *t.* 10. *f.* 31.

1. ERIOPHORUM culmo folioso tereti, foliis planis *fl. suec.* 44.

*——spicis pendulis. *fl. lapp.* 22. *hort. cliff.* 22. *fl. Leyd. prodr.* 51.

Linagrostis paniculâ ampliore. *I. R. H.* 664.

a. Linagrostis paniculâ minore. *I. R. H.* 664.

2. ERIOPHORUM culmis teretibus vaginatis, spicâ membranaceâ. *fl. suec.* 45.

*——spicâ erectâ', caule tereti. *fl. lapp.* 23. *fl. Leyd. prodr.* 51.

Linagrostis spicâ singulari, alopecuroides. *Bot. Par.* 117.

Juncus capitulo lanuginoso, sive schoenolaguros. *Pin.* 12.

DIGYNIA.

1. NARDUS spicâ rectâ. *fl. suec.* 47.

Nardus ſpicâ lineari. *fl. lapp.* 40. *hort. cliff.* 22.

Gramen Loliaceum minimum, foliis Junceis, paniculâ unam partem ſpectante. *I. R. H.* 517.

2. NARDUS paniculâ ſpicatâ, floribus ſolitariis alternis. *obſ. pl.* 155.

Gramen paniculis elegantiſſimis, minimum. *I. R. H.* 522.

1. PHALARIS ſpicâ cylindricâ. *fl. ſuec.* 49.

Gramen Typhoides aſperum primum. *Pin.* 4.

Mrs Vaillant, & Linnæus. *hort. cliff.* 22. ont jugé cette Plante, variété du 2e. Phleum ci-après, & cependant le dernier lui donne la dénomination ci-deſſus. *fl. ſuec.* 49.

2. PHALARIS paniculâ oblongâ. *fl. ſuec.* 48.

* Arundo foliis planis, paniculâ ſpicatâ ſpiculis confertis. *hort. cliff.* 26. *fl. leyd. prodr.* 66.

Gramen Arundinaceum, aceroſâ glumâ noſtras. *Park. theatr.* 1273.

3. PHALARIS radice annuâ. *hort. cliff.* 23. *fl. leyd. prodr.* 63.

Phalaris major, semine albo. *Pin.* 28. ALPIS.

* Gramen spicatum, semine miliaceo albo. *I. R. H.* 518.

1. PHLEUM spicâ ovali cylindraceâ. *fl. lapp.* 25. *fl. suec.* 51.

Gramen spicatum spicâ cylindraceâ longioribus villis donatâ. *I. R. H.* 520.

2. PHLEUM spicâ cylindraceâ longissimâ. *fl. lapp.* 26. *hort. cliff.* 22. *fl. suec.* 50. *fl. leyd. prodr.* 53.

Gramen Typhoides maximum, spicâ longissimâ. *Pin.* 4.

a Gramen Typhoides asperum primum. *Pin.* 4. *ex. hort. cliff. & ipso Vaill.*

b. Gramen nodosum, spicâ parvâ, sive nodosum tertium. *Prodr.* 3. *ex ipso Vaill.*

1. ALOPECURUS culmo infracto. *fl. suec.* 53.

*—aristis glumâ longioribus. *fl. lapp.* 27.

*—culmo infracto, aristis glumâ

longioribus. *fl. leyd. prodr.* 54.

Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum. *Pin* 5.

2. ALOPECURUS culmo erecto. *fl. leyd. prodr.* 54. *fl. ſuec.* 52.

Gramen cum caudâ muris purpuraſcente. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 473.

a. Gramen cum caudâ muris vireſcente.

1. PANICUM floribus conglomerato-ſpicatis lævibus ariſtâ dimidio brevioribus. *fl. ſuec.* 54.

*—ſpicâ compoſitâ, ariſtis ſpicâ longioribus. *Virid. cliff.* 7. *fl. leyd. prodr.* 55.

*—ſpiculis ſpicatis ſcabritie adhærentibus. *hort. cliff.* 27. *act. ſtock.* 1741. *p.* 183.

Panicum vulgare ſpicâ ſimplici & aſperâ. *I. R. H.* 515. PANIS.

a. Panicum vulgare, ſpicâ ſimplici veſtibus non adhærente. *ex. fl. ſuec. & obſ. pl.* 157.

b. Panicum vulgare, ſpicâ ſimplici & molliori. *I. R. H. ex fl. ſuec. & obſ. Pl.* 157.

2. PANICUM ſpicâ anguſtâ & interruptâ. *Bot. Par.*

3. PANICUM ſpicis alternis remotis declinatis compoſitis. *Virid. cliff.* 7. *fl. leyd. prodr.* 55.

*—ſpicis alternis remotis laxis. *hort. cliff.* 27.

Panicum vulgare, ſpicâ multiplici aſperiuſculâ. *I. R. H.* 515.

*—idem ſpicâ multiplici longis ariſtis circumvallatâ. *I. R. H.* 515.

5. PANICUM ſpicis alternis oppoſitis-ve linearibus patentiſſimis, muticis, floſculis alternatim binis, alterutro pedunculato. *fl. leyd. prodr.* 55.

Gramen dactylon folio latiore. *Pin.* 8.

*—idem ſpicis nigris disjunctis.

6. PANICUM paniculâ laxâ flaccidâ, foliorum vaginis pubeſcentibus. *hort. cliff.* 27. *fl. leyd. prodr.* 55.

Milium ſemine luteo. *Pin.* 26. MILLET.

*—idem ſemine albo. *Pin.* 26.

*—idem ſemine ſubluteo, locuſtis phœniceis.

* Milium semine nigro. *Pin.* 26.

1. MILIUM floribus disperſis. *fl. ſuec.* 55.

*——glumis diphyllis. *hort. cliff.* 27.

Gramen ſylvaticum, paniculâ miliaceâ ſparsâ. *Pin.* 8.

1. MELICA petalis imberbibus. *fl. ſuec.* 57.

*——floribus ſub culmo pendulis. *fl. lapp.* 36. *fl. Leyd. prodr.* 57.

Gramen Avenaceum locuſtis rariboribus. *Pin.* 10.

1. AGROSTIS culmo repente foliis radicalibus breviore, folii ſupremi vaginâ ventricosâ. *fl. ſuec.* 61.

*——culmo repente, vaginâ ſupremi folii ventricosâ. *fl. leyd. prodr.* 59.

Gramen caninum ſupinum minus. *Pin.* 1.

*——caninum ſupinum paniculatum, folio varians. *Pin.* 1.

*——Paluſtre, paniculâ ſpeciosâ. *Pin.*

2. AGROSTIS paniculâ compreſsâ, calycibus ſubulatis æqualibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. *fl. leyd. prodr.* 59. *fl. ſuec.* 62.

Agroſtis Paniculâ tenuiſſimâ. *fl. lap.* 45.

Gramen montanum, paniculâ ſpadiceâ delicatiore. *Pin.* 3.

*—Idem ſoboliferum.

3. AGROSTIS paniculâ parte florente patentiſſimâ, petalo exteriore glabro terminato ariſtâ tortili incurvâ. *fl. ſuec.* 60.

*—paniculâ infernè verticillatim laxâ, ſupernè contractâ. *fl. lapp.* 46.

Gramen ſerotinum arvenſe, ſpicâ laxâ pyramidali. *Rai. hiſt.* 2. 1288. nº. 25.

* Panicum ſerotinum arvenſe, ſpicâ pyramidatâ. *I. R. H.* 515.

4. AGROSTIS petalo exteriore ariſtam rectam ſtrictam & longiſſimam exſerente. *fl. leyd. prodr.* 59. *fl. ſuec.* 58. *obſ. pl.* 177.

Gramen capillatum, paniculis rubentibus *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 462.

*—capillatum paniculis viridantibus. *Bauh. hiſt.* 2.

a. Gramen capillatum, paniculis interruptis anguſtioribus. *Bot. Par.* 88. *ex obſ. pl.*

5. AIRA

1. AIRA foliis pubeſcentibus, paniculâ contractâ, floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſtâ uncinatâ calyce breviore. *fl. ſuec.* 67.

*—floſculo maſculo ariſtato, fœmineo mutico. *hort. cliff.* 27. *fl. leyd. prodr.* 66. *act. ſtock.* 1741. 183.

Gramen pratenſe paniculatum molle. *Pin.* 2.

*—idem album.

2. AIRA foliis planis, floribus trifloris ariſtatis, floſculo intermedio mutico Diandro. *fl. ſuec.* 70. *obſ. pl.* 175.

Gramen caninum paniculatum molle. *Rai. hiſt.* 1285. *I. R. H.* 522.

3. AIRA foliis ſetaceis, folio ſummo ſpathaceo paniculam infernè obvolvente. *fl. ſuec.* 72.

*—foliis ſubulatis, folio florali ſpathaceo paniculam inferiorem involvente. *fl. leyd. prodr.* 60.

*—foliis ſetaceis, ariſtis ex baſi glumarum calycem æquantibus. *hort. cliff.* 495.

Gramen junceum Dalechampii. *lugd. hiſt.* 425.

4. AIRA foliis ſubulatis, ariſtis è baſi floſculorum tortilibus, floſculo altero pedunculato. *fl. leyd. prodr.* 60.

Gramen paniculatum minimum molle. *bot. monſp.*

5. AIRA foliis ſetaceis, culmis ſubnudis, paniculâ divaricatâ, pedunculis flexuoſis. *fl. ſuec.* 64. (pedunculis ſexfloris.) *obſ. pl.* 173.

*—paniculâ rarâ, calycibus albis. *fl. lapp.* 48.

Gramen nemoroſum, paniculis albis, capillaceo folio. *Pin.* 7.

6. AIRA foliis planis, paniculâ patente, floribus muticis lævibus calyce longioribus. *fl. ſuec.* 66.

*—culmo inferiore repente, floſculis muticis calyce longioribus, altero pedunculato. *fl. leyd. prodr.* 60.

Gramen paniculatum aquaticum miliaceum. *I. R. H.* 521.

7. AIRA foliis planis, paniculâ coarctatâ, floribus pedunculatis muticis convoluto-ſubulatis. *fl. ſuec.* 71.

* Poa ſpiculis ſubulatis, paniculâ ra-

râ contractâ. *fl. lapp.* 29. *fl. leyd. prodr.* 61.

Gramen paniculatum autumnale, paniculâ anguſtiore ex viridi nigricante. *I. R. H.* 521.

*—idem paniculâ ampliore. *I. R. H.*

8. AIRA paniculâ ſpicatâ, floribus muticis pedunculo longioribus, glumis acuminatis inæqualibus. *fl. leyd. prodr.* 61.

Gramen ſpicatum, ſpicâ purpuro-argenteâ molli. *I. R. H.* 519.

9. AIRA quæ gramen parvum præcox, ſpicâ laxâ caneſcente. *Rai. catal. angl.* 150.

* Gramen montanum minimum ſpicatum & ariſtatum. *I. R. H.* 519.

1. POA paniculâ diffusâ, ſpiculis trifloris glabris, culmo erecto tereti. *fl. ſuec.* 76.

*—ſpiculis ovatis compreſſis muticis. *fl. lapp.* 51. *hort. cliff.* 27. *fl. leyd. prodr.* 61.

Gramen pratenſe paniculatum majus, latiore folio, Poa Theophraſti. *Pin.* 2.

2. POA paniculâ diffusâ ramosissimâ, spiculis sexfloris cordatis. *fl. suec.* 79.

Gramen pratense paniculatum altissimum, locustis parvis splendentibus non aristis. *I. R. H.* 524.

3. POA paniculâ diffusâ, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. *fl. suec.* 77.

*—spiculis ovato-oblongis, foliis subulatis. *fl. lapp.* 52.

Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. *Pin.* 3.

4. POA paniculâ diffusâ, angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *fl. suec.* 75.

Gramen pratense paniculatum minus album. *Pin.* 3.

*—pratense paniculatum minus rubrum. *Pin.* 3.

5. POA paniculâ subdiffusâ, spiculis quinquefloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. *fl. suec.* 78.

Gramen pratense paniculatum medium. *Pin.* 2.

6. POA paniculâ secundâ coarctatâ, culmo obliquo compresso. *fl. suec.* 74.

* Poa ſpiculis ovatis compreſſis muticis, paniculâ ſecundâ contractâ. *act. ſtock.* 1741. 184.

Gramen paniculatum radice repente, culmo compreſſo. *bot. par.* 91. *tab.* 18. *fig.* 5.

Gramen caninum vineale. *Pin.* 1.

7. POA culmorum baſi tuberosâ. *obſ. pl.* 168.

Gramen xerampelinum, miliaceâ prætenui ramosâque ſparsâ paniculâ, ſive xerampelino congener arvenſe æſtivum, Gramen minutiſſimo ſemine. *Lob. illuſtr.*

a. Gramen arvenſe, paniculâ criſpâ. *Pin.* 3. *ex obſ. pl.*

8. POA paniculâ diffusâ, ſpiculis ſexfloris linearibus. *fl. ſuec.* 73.

*—paniculâ diffusâ, ſpiculis ſexfloris linearibus muticis compreſſis. *act. ſtock.* 1741. 185.

*—paniculâ contractâ, ſpiculis ovatis teretiuſculis. *hort. cliff.* 496. *fl. leyd. prodr.* 61.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Pin.* 3.

9. POA paniculâ lanceolatâ vix ramosâ, floribus alternis antrorſum verſis. *fl. leyd. prodr.* 62. *obſ. pl.* 167.

Gramen minus vulgare paniculâ rigidâ. *I. R. H.* 522.

*—filiceum rigidiuſculum. *bot. par.* 92. *tab.* 18. *f.* 4.

1. BRIZA ſpiculis ovatis, calyce floſculis breviore. *hort. cliff.* 23. *fl. leyd. prodr.* 63. *fl. ſuec.* 80.

Gramen tremulum majus, paniculâ ſpadiceâ. *Pin.* 2.

*—tremulum majus. *Pin.* 2.

2. BRIZA ſpicis triangularibus; calyce floſculis longiore. *hort. cliff.* 23. *fl. leyd. prodr.* 63.

Gramen tremulum minus, paniculâ parvâ. *Pin.* 2.

3. BRIZA paniculâ ſpicatâ, ſpiculis lanceolatis. *obſ. pl.* 163.

Gramen paniculis elegantiſſimis, ſive eragroſtis majus. *Pin.* 2.

1. CYNOSURUS bracteis pennatifidis. *hort. cliff.* 495. *fl. leyd. prodr.* 64. *fl. ſuec.* 81.

Gramen ſpicatum, glumis criſtatis. *I. R. H.* 519.

2. CYNOSURUS bracteis integris. *hort. cliff.* 495. *fl. leyd. prodr.* 64. *fl. ſuec.* 82.

Gramen ſpicatum, glumis variis. *I. R. H.* 519.

3. CYNOSURUS ſpicis quaternis terminatricibus horizontalibus. *lf. leyd. prodr.* 64. *obſ. pl.* 165.

Gramen dactylon, radice repente, ſive officinarum. *I. R. H.* 520. PIED DE COQ.

4. CYNOSURUS paniculâ fecundâ glomeratâ. *fl. ſuec.* 83.

Gramen ſpicatum, folio aſpero. *Pin.* 3.

*—idem ſpicâ albâ.

1. BROMUS culmo indiviſo, ſpicis alternis ſubſeſſilibus teretibus. *fl. ſuec.* 89.

* Feſtuca culmo alternatim ſpicato, ſpicis teretibus. *fl. lapp.* 29. *fl. leyd. prodr.* 67.

Gramen loliaceum corniculatum, ſpicis glabris. *I. R. H.* 518.

a. Gramen loliaceum corniculatum ; ſpicis villoſis. *I. R. H.* 518. *ex Hall. Helv.* 208.

2. BROMUS paniculâ nutante ; ſpiculis ovato-oblongis. *fl. ſuec.* 85. *—Culmo paniculato, ſpicis compreſſis. *fl. lapp.* 27. *hort. cliff.* 25. *fl. leyd. prodr.* 67.

Gramen quod feſtuca avenacea ſterilis elatior. *Pin.* 9.

3. BROMUS paniculâ nutante ; ſpiculis linearibus. *fl. ſuec.* 86.

Gramen quod feſtuca avenacea ſterilis humilior. *Pin.* 9.

* Feſtuca graminea, glumis vacuis. *Pin.* 9.

4. BROMUS paniculâ diffusâ ; ſpiculis teretibus. *obſ. pl.* 186.

Gramen avenaceum dumetorum ſpaniculâ ſparsâ. *Rai. hiſt.* 1289.

5. BROMUS paniculæ ramis conjugato-binatis. *fl. ſuec.* 88.

* Feſtuca foliis digiti ferè latitudine longiſſimis, paniculâ laxâ. *fl. leyd. prodr.* 69.

Gramen avenaceum glabrum, pa-

niculâ è ſpicis ſtrigoſis compoſitâ, ariſtis tenuiſſimis. *Rai. hiſt.* 1909.

6. BROMUS paniculâ coarctatâ, ſpiculis complanatis. *obſ. pl.* 185.

Gramen quod feſtuca pratenſis lanuginoſa. *Pin.* 10.

*—idem foliis latioribus, vel glabris.

7. BROMUS paniculâ patente, ſpiculis ovatis. *fl. ſuec.* 84.

* Feſtuca culmo paniculato, ſpicis compreſſo-ovatis. *fl. lapp.* 28. *fl. leyd. prodr.* 67.

Gramen gros Montbelgardenſium. *Bauh. hiſt.* 2. 438.

8. BROMUS paniculâ erectâ coarctatâ. *fl. ſuec.* 87.

Gramen avenaceum, locuſtis villoſis craſſioribus. *I. R. H.* 526.

9. BROMUS qui gramen avenaceum locuſtis amplioribus candicantibus glabris & ariſtatis. *I. R. H.* 525.

1. FESTUCA ariſtis paniculæ circiter longitudine plumoſis. *fl. leyd. prodr.* 68.

Gramen ſpicatum ariſtis pennatis. *I. R. H.* 518.

2. FESTUCA paniculâ erectâ, ſpiculis ſubovatis muticis, calyce floſculis majore. *fl. ſuec.* 92.

Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non ariſtatis. *Rai. hiſt.* 1288.

3. FESTUCA paniculâ ſecundâ erectâ, ſpiculis ſubariſtatis exterioribus teretibus. *fl. ſuec.* 91.

*——paniculâ ſpicatâ, ſpiculis unoverſu inclinatis ſubmuticis. *fl. leyd. prodr.* 68.

Gramen paniculatum elatius, ſpicis longis muticis ſquamoſis. *Rai. hiſt.* 1286.

4. FESTUCA paniculâ ramosâ erectâ, ſpiculis ſubſeſſilibus teretibus muticis. *fl. ſuec.* 90.

*——Poa ſpiculis oblongis erectis. *hort. cliff.* 28. *fl. leyd. prodr.* 62.

Gramen paniculatum aquaticum fluitans. *I. R. R.* 521.

5. FESTUCA paniculâ ſecundâ coarctatâ ariſtatâ, culmo tetragono nudiuſculo, foliis ſetaceis. *fl. ſuec.* 95.

* Poa foliis ſetaceis compreſſis, caulino latiore, paniculâ contractâ ſecundâ, corollis acuminatis ariſtatis. *act. ſtock.* 1741. *p.* 184.

* Poa foliis ſetaceis, paniculâ ramosâ, floribus petiolatis antrorſum ſpectantibus, glumis ſubulatis. *fl. leyd. prodr.* 62.

Gramen capillatum locuſtis pennatis non ariſtatis. *Rai. ſyn.* 260.

6. FESTUCA foliis inferioribus ſetaceis, ſuperioribus latioribus. *obſ. pl.* 179.

Gramen avenaceum minus, foliis inferioribus capillaceis, ſuperioribus verò latioribus. *I. R. H.* 525.

7. FESTUCA foliis ſetaceis, radicalibus m[illegible]noribus, paniculâ infernè ramosâ nu[illegible]nte, ſpicis adſcendentibus hiſpidis. *fl. leyd. prodr.* 68.

Gramen pratenſe, paniculâ duriore laxâ unam præcipuè partem ſpectante. *Rai. hiſt.* 1284.

8. FESTUCA ſpicis erectis ad unum latus, paleâ alterâ calycinâ minimâ, alterâ acuminatâ. *fl. leyd. prodr.* 68.

Gramen paniculatum Bromoides minus, paniculis ariſtatis unam partem ſpectantibus. *Rai. hiſt.* 1287.

9. FESTUCA paniculâ ſpicatâ nutante, calycibus minutiſſimis muticis, floribus ſcabris. *fl. leyd. prodr.* 68.

Gramen murorum, ſpicâ longiſſimâ. *Rai. hiſt.* 1286.

10. FESTUCA quæ gramen Bromoides ſegetum, latiore paniculâ. *Park.* 1149.

* Feſtuca graminea, effusâ jubâ. *Bauh. prodr.* 19.

1. AVENA calicibus diſpermis, ſeminibus lævibus. *hort. cliff.* 25. *fl. leyd. prodr.* 65.

Avena vulgaris ſive alba. *Pin.* 28. AVOINE.

a. Avena nigra. *Pin.* 28. *ex hort. cliff.*

2. AVENA paniculâ patente, floſculis baſi piloſis. *fl. ſuec.* 97.

*——Seminibus baſi hirſutis. *fl. lapp.* 30. *fl. leyd. prodr.* 65.

Avena ſylveſtris piloſa, ariſtis recurvis. *hiſt. ox.* 3. 209. HAVERON.

3. AVENA paniculâ laxâ, caly-

cibus trifloris brevibus, floribus omnibus ariſtatis. *fl. leyd. prodr.* 66.

Gramen avenaceum pratenſe elatius, paniculâ flaveſcente, locuſtis parvis. *Rai. hiſt.* 1284.

4. AVENA calycibus bifloris, paniculâ laxè ſpicatâ, pedunculis prioribus faſciculatis. *obſ. pl.* 182.

Gramen avenaceum elatius, jubâ longâ ſplendente. *Rai. hiſt. bot. par.* 89.

5. AVENA calycibus bifloris, floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſtato. *fl. ſuec.* 98.

* Avena paniculâ nutante, calycibus bifloris, altero floſculo ariſtato. *fl. leyd. prodr.* 66.

Gramen nodoſum, avenaceâ paniculâ. *Pin.* 2.

6. AVENA ſpicis erectis, calyce ſpiculis breviore. *fl. lapp.* 31. *fl. ſuec.* 96. *fl. leyd. prodr.* 65.

Gramen avenaceum glabrum, paniculâ purpuro argenteâ ſplendente. *Rai. ſyn.* 192.

a. Gramen avenaceum, paniculâ purpuro-argenteâ ſplendente. *Rai. hiſt.*

hirſutum eſt. *ex fl. ſuec. & fl. leyd.*

b. Gramen avenaceum locuſtis ſplendentibus & bicornibus. *bot. par. tab.* 18. *fig.* 1. *ex Hall. Helv.* 226.

7. AVENA paniculâ ſpicatâ, ſpiculis cylindraceis culmo appreſſis. *obſ. pl.* 182.

Gramen avenaceum montanum, ſpicâ ſimplici, ariſtis recurvis. *Rai. ſynops.* 262.

1. ARUNDO paniculâ laxâ, floſculis quinis. *fl. ſuec.* 99.

*——paniculâ laxâ, calycibus quinquefloris. *fl. leyd. prodr.* 66.

Arundo vulgaris paluſtris. *Bauh. hiſt.* 2. 485.

*——vulgaris ſive phragmites dioſcoridis & theophraſti. *Pin.* 17. ROSEAU.

2. ARUNDO culmo ramoſo. *fl. lapp.* 42. *fl. ſuec.* 100. *fl. leyd. prodr.* 66.

Arundo vulgaris, ſive Calamagroſtis. *Dioſcor.*

* Gramen dumetorum paniculâ acerosâ ſemine pappoſo. *Rai. hiſt.* 1287.

* Gramen arundinaceum, paniculâ molli ſpadiceâ, majus. *Pin.* 7. LESCHE.

1. LOLIUM ſpicis ariſtatis, radice annuâ. *hort. cliff.* 23. *act. ſtock.* 1741. *p.* 186. *fl. ſuec.* 103. *fl. leyd. prodr.* 69.

Gramen loliaceum, ſpicâ longiore, ariſtas habens. *Pin.* 9. YVROYE.

*—idem ſine ariſtis. *Pin.* 9.

2. LOLIUM ſpicis muticis, radice perenni. *hort. cliff.* 24. *fl. ſuec.* 104. *fl. leyd. prodr.* 69.

*—foliis compreſſis, radice perenni. *fl. lapp.* 32.

Gramen loliaceum, anguſtiore folio & ſpica. *Pin.* 9.

*—idem ariſtis donatum. *I. R. H.* 516.

*—loliaceum majus, ſpicis longiùs diſtantibus. *I. R. H.* 516.

*—loliaceum ſpicis brevibus & latioribus compreſſis. *hiſt. ox.* 3. 182.

*—loliaceum, paniculâ multiplici & ſpicatâ. *I. R. H.* 516.

3. LOLIUM quod Gramen lolia-

ceum, foliis & ſpicâ tenuiſſimis. *hiſt. ox.*

4. LOLIUM quod Gramen minimum Dalechampii. *Lugd.* 424.

1. TRITICUM radice annuâ, ſpicâ muticâ. *hort. cliff.* 24. *fl. leyd. prodr.* 70.

TRITICUM hybernum ariſtis carens. *Pin.* 21. FROMENT.

* Triticum ſpicâ & granis albis. *Rai. ſyn.*

a. Triticum ariſtis carens, glumis pubeſcentibus.

b. Triticum ſpicâ & granis rubentibus. *Rai. hiſt.* 1237.

2. TRITICUM radice annuâ, ſpicâ aſperâ ariſtatâ.

Triticum ariſtis longioribus, ſpicâ albâ. *Pin.* 21.

a. Triticum ariſtis circumvallatum, granis & ſpicâ rubentibus & ſplendentibus. *Rai. ſyn.* 244.

b. Triticum ſpicâ villosâ quadratâ longiore, ariſtis munitum. *hiſt. ox.*

3. TRITICUM radice annuâ, glumis villoſis. *hort. cliff.* 24. *fl. leyd. prodr.* 70.

Triticum ſpicâ villosâ quadratâ breviore & turgidiore. *hiſt. ox.*

a. Triticum ſpicâ multiplici. *Pin.* 21; *ex hort. cliff.*

4. TRITICUM radice annuâ, ſpicâ glabrâ ariſtatâ. *hort. cliff.* 24. *fl. leyd. prodr.* 70.

Triticum æſtivum. *Pin.* 21. BLED DE TROIS MOIS.

5. TRITICUM radice repente, foliis viridibus. *hort. cliff.* 24. *fl. lapp.* 33. *fl. ſuec.* 105. *fl. leyd. prodr.* 70.

Gramen loliaceum radice repente, ſive Gramen officinarum. *I. R. H.* 516. CHIENDENT.

*—idem ariſtis longioribus donatum. *I. R. H.* 516.

a. Gramen anguſtifolium, ſpicâ tritici muticæ ſimili. *Pin.*

*—idem ariſtis longioribus donatum.

6. TRITICUM quod Gramen loliaceum, fibrosâ radice, ariſtis donatum. *I. R. H.*

1. SECALE ~~radice annuâ~~ *glumarum ciliis glabris. Hort. Upſ. 22.*

* Secale. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 416. *hort. cliff.* 25. *fl. leyd. prodr.* 58.

Secale hybernum vel majus. *Pin.*

1. HORDEUM floſculis lateralibus maſculis muticis. *hort. cliff.* 24. *fl. leyd. prodr.* 70.

Hordeum diſtichum. *Bauh. hiſt.* 2. 429. ORGE.

2. HORDEUM diſtichum, ſpicâ breviore & latiore, granis confertis. *Rai. hiſt.* 1243.

3. HORDEUM floſculis omnibus hermaphroditis. *hort. cliff.* 24. *fl. leyd. prodr.* 69.

Hordeum polyſtichum. *Bauh. hiſt.* 429. ESPEAUTE.

4. HORDEUM hexaſtichum pulchrum. *Bauh. hiſt.* 2. 429.

5. HORDEUM floſculis lateralibus maſculis ariſtatis. *hort. cliff.* 24. *fl. ſuec.* 107. *fl. leyd. prodr.* 70.

Gramen ſpicatum vulgare ſecalinum. *I. R. H.* 517.

a. Gramen ſpicatum ſecalinum minus. *I. R. H.* 518. *ex hort. cliff.*

6. HORDEUM quod Gramen ſpicâ ſecalinâ. *Pin.* 9.

TRIGYNIA.

1. MONTIA. *fl. lapp.* 57. *fl. suec.* 108. *fl. leyd. prodr.* 199.

Alsinoides annua verna. *bot. par.* 3. *f.* 4.

Alsineformis paludosa tricarpos; floseulis albis inapertis. *Pluk. Phitogr. tab.* 7. *fig.* 5.

1. TILLÆA. *Linn. gen. pl.* 83.

* Crassula foliis sessilibus connatis, floribus aggregatis in foliorum alis. *obs. pl.* 97.

Sedum quod Polygonum minimum muscosum. *Bocc.*

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

1. GLOBULARIA caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis integerrimis. *act. stock.* 1741. 287. *fl. suec.* 109.

*—Caule folioso, foliis ovatis integerrimis. *hort. cliff.* 490. *fl. leyd. prodr.* 190.

Globularia vulgaris. *I. R. H.* 467. GLOBULAIRE.

1. DIPSACUS capitulis florum conicis. *hort. cliff.* 29. *fl. leyd. prodr.* 188.

Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major. *Pin.* 385. CHARDON A BONNETIER. CUVE DE VENUS.

2. DIPSACUS capitulis florum subglobosis. *hort. cliff.* 30. *fl. leyd. prodr.* 188.

Scabiosa quæ dipsacus sylvestris, capitulo minore, vel Virga pastoris minor. *Pin.* 385.

1. SCABIOSA corollulis quadrifidis, corollis radiatis, caule hispido. *hort. cliff.* 31. *fl. suec.* 110. *fl. leyd. prodr.* 188.

*—caule & foliis hirsutis, imis ovatis, superioribus semipinnatis. *Hall. Helv.* 669.

Scabiosa pratensis hirsuta, quæ of-

1. DIPSACUS foliis connato-perfoliatis. Hort. Upsl. 25.

* ——— etc.

2. DIPSACUS foliis petiolatis appendiculatis. Hort. Upsl. 25.

ficinarum. *Pin.* 269. SCABIEUSE.
*——ead. calice ampliſſimo nervoſo & dentato.
*——ead. major communior, folio non laciniato. *Bauh. hiſt.*
*——vulgaris flore pleno. *Rai. catal. angl.*
*——pratenſis hirſuta prolifera.

2. SCABIOSA corollulis quinquefidis: foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis ſetaceis. *hort. cliff.* 31. *fl. leyd. prodr.* 139. *fl. ſuec.* 111.

* Aſterocephalus foliis ad terram ovalibus ſerratis ad caulem pinnatis anguſtiſſimis. *Hall. Helv.* 668.

Scabioſa capitulo globoſo minor. *Pin.* 270. Flore cæruleo.
*——ead. flore purpureo.
*——minor vulgaris, floribus carneis. *hiſt. ox.*
*——ead. floribus candidis.
*——minor vulgaris prolifera.
a. Scabioſa minor. 1. 2. 3. *tab. icon.* 160. & 161. *ex Hall. Helv.* 668.

3. SCABIOSA corollulis quadri-

fidis, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *hort. cliff.* 30. *fl. ſuec.* 112. *fl. leyd. prodr.* 188.

Scabioſa folio integro hirſuto. *I. R. H.* 466.

*—folio integro glabro, flore cæruleo. *I. R. H.* 466. MORS DU DIABLE ou REMORS.

*—ead. flore albo. *I. R. H.* 466.

*—foliis imis integris, cauleſcentibus inciſis.

1. SHERARDIA. *Dill. gen.* 96. *hort. cliff.* 33. *fl. ſuec.* 113. *fl. leyd. prodr.* 257.

Aparine ſupina pumila, flore cæruleo. *I. R. H.* 114.

* Aſperula exaphyllos purpurea. *Pin.* 334.

1. ASPERULA foliis octonis lanceolatis, floribus faſciculatis pedunculatis. *fl. ſuec.* 114.

*—foliis pluribus, floribus pedunculo elevatis. *hort. cliff.* 33.

Aparine latifolia humilior montana. *I. R. H.* 114.

2. ASPERULA foliis pluribus, floribus ſeſſilibus. *hort. cliff.* 33. *fl. leyd. prodr.* 255.

Gallium arvenſe, flore cæruleo. *I. R. H.* 115.

* Aſperula cærulea arvenſis. *Pin.* 334.

3. ASPERULA foliis quaternis, linearibus, floribus trifidis. *fl. ſuec.* 115.

*—foliis linearibus quaternis, ſummis oppoſitis. *fl. leyd. prodr.* 255. *act. ſtock.* 1742. *p.* 20.

Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpuraſcentibus. *I. R. H.* 130.

*—ead. floribus albis. *I. R. H.* 130.

1. GALIUM foliis pluribus acutis, caule flaccido, ramis patentiſſimis. *fl. ſuec.* 117. *hort. cliff.* 34. *fl. leyd. prodr.* 257.

Gallium album vulgare. *I. R. H.* 105. CAILLELAIT.

*— idem incanum & villoſum.

*—idem, flore luteolo vel flaveſcente.

2. GALIUM foliis ſenis & novenis ſubaſperis ſpinulâ terminatis. *Hall. Helv.* 460.

Gallium album minus. *bot. par.* 78.

Mollugo montana minor, Gallio albo ſimilis. *Rai. hiſt.* 1. 482.

3. GALIUM foliis plurimis linearibus, ramis floriferis brevibus. *hort. cliff.* 34. *fl. ſuec.* 116. *fl. leyd. prodr.* 256.

*—caule erecto, foliis plurimis verticillatis linearibus. *fl. lapp.* 61.

Gallium luteum. *Pin.* 335.

~~4. GALIUM foliis quaternis, floribus in alis confertis. *hort. cliff.* 34. *fl. leyd. prodr.* 257.~~ *Hall.*

~~Cruciata hirſuta. *Pin.* 335. GROISETTE.~~

5. GALIUM foliis quaternis obversè-ovatis inæqualibus, caulibus diffuſis. *fl. ſuec.* 119.

*—caulibus diffuſis, foliis quaternis verticillatis. *fl. lapp.* 59. *fl. leyd. prodr.* 257.

Cruciata paluſtris alba. *I. R. H.* 115. *a.* Cru-

a. Cruciata glauca anguſtifolia. *Bot. Par.*

6. GALIUM caule erecto, foliis quaternis lanceolatis trinerviis. *fl. lapp.* 60. *hort. cliff.* 34. *fl. leyd. prodr.* 257. *fl. ſuec.* 118.

Cruciata quæ Rubia erecta quadrifolia. *Bauh. hiſt.* 3. 717.

7. GALIUM quod cruciata minima. *I. R. H.* 115. Gallium

8. GALIUM quod album tripetalon. *hort. R. Bleſ.* 267.

1. APARINE foliis lanceolatis acuminatis ſcaberrimis, corollis fructu minoribus. *fl. leyd. prodr.* 455. *fl. ſuec.* 120.

*——foliis lanceolatis. *hort. cliff.* 34.

Aparine vulgaris. *Pin.* 334. GRATTERON.

a. Aparine vulgaris, ſemine minori. *I. R. H.* 114.

b. Aparine ſemine lævi. *Hort. Reg. Par. & Park.*

2. APARINE foliis lineari-lanceolatis acuminatis rigidis, corollis fructu majoribus. *fl. leyd. prodr.* 255. *fl. ſuec.* 121.

Aparine paluſtris minor Pariſienſis, flore albo. *I. R. H.* 114.

3. APARINE foliis lineari-lanceolatis acuminatis flaccidis, corollis fructu minoribus. *fl. leyd. prodr.* 255.

Aparine minima. *Bot. Monſp.*

1. RUBIA foliis ſenis. *hort. cliff.* 35. *fl. leyd. prodr.* 254.

Rubia ſylveſtris Monſpeſſulana major. *Bauh. hiſt.*

a. Rubia tinctorum ſativa. *Pin.* 333. GARANCE. *ex hort. cliff.*

1. PLANTAGO foliis ovatis glabris. *hort. cliff.* 36. *fl. ſuec.* 122. *fl. leyd. prodr.* 401. *Hall. Helv.* 470.

Plantago latifolia ſinuata. *Pin.* 189. PLANTAIN.

*——quinquenervia latifolia, thyrſo folioſo. *Ambroſ. Phytol.* 430. *fig.*

2. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus. *hort. cliff.* 36. *fl. ſuec.* 123. *fl. leyd. prodr.* 401.

Plantago latifolia incana. *Pin.* 189.

*——ead. ſpicâ albâ. *hort. Edimb.*

3. PLANTAGO foliis lanceolatis, ſpicâ ſubovatâ. *virid. cliff.* 9. *hort.*

cliff. 36. *fl. ſuec.* 124. *fl. leyd. prodr.* 401.

Plantago anguſtifolia major. *Pin.* 189.

*——ead. ſpicâ multiplici.

*——anguſtifolia minor. *tab. icon.* 732. *a.* Plantago paluſtris lanceolata trinervia. *Bot. par.*

4. PLANTAGO ſcapo unifloro. *fl. lapp.* 640. *fl. ſuec.* 128.

Plantago paluſtris gramineo folio, monanthos Pariſienſis. *I. R. H.*

5. PLANTAGO foliis linearibus pinnato-dentatis. *hort. cliff.* 37. *fl. ſuec.* 126. *fl. leyd. prodr.* 37.

Coronopus hortenſis. *Pin.* 190. CORNE DE CERF.

6. PLANTAGO annua, foliis integerrimis, caule ramoſo erecto. *hort. cliff.* 37.

Pſyllium majus erectum. *Pin.* HERBE AUX PUCES.

1. SANGUISORBA ſpicis ovatis. *hort. cliff.* 39. *fl. ſuec.* 130. *act. ſtock.* 1741. *p.* 187. *fl. leyd. prodr.* 240.

Pimpinella ſanguiſorba major. *Pin.* 160. PIMPRENELLE.

1. CENTUNCULUS foliis alternis ovatis. *fl. ſuec.* 129.

Anagallis paludoſa minima, foliis rotundis alternatis. *bot. par.* 12. *t.* 4. *f.* 2.

Alſine paluſtris minima, floſculis albis, fructu coriandri exiguo. *Mentz. pug. tab.* 7.

1. CORNUS umbellis involucrum æquantibus. *hort. cliff.* 38. *fl. leyd. prodr.* 249.

Cornus hortenſis mas. *Pin.* 447. CORNOUILLER.

2. CORNUS umbellis involucro multotiès longioribus. *hort. cliff.* 38. *fl. ſuec.* 131. *fl. leyd. prodr.* 249.

Cornus fœmina. *Pin.* 447. SANGUEN.

1. EVONYMUS foliis oblongo-ovatis. *hort. cliff.* 38. *fl. ſuec.* 133. *fl. leyd. prodr.* 436.

Evonymus vulgaris, granis rubentibus. *Pin.* 428. FUSAIN.

1. TRAPA petiolis foliorum natantium ventricoſis. *hort. cliff.* 483. *fl. ſuec.* 134.

Tribuloides vulgare aquis innascens. *I. R. H.* 655. MACRE, ou CHATAIGNE D'EAU.

1. ISNARDIA. *linn. gen. pl.* 118.

* Dantia foliis subovatis pediculatis, floribus in foliorum alis sessilibus. *obs. pl.* 115.

Dantia. PETIT. *gen,* 49.

DIGYNIA.

1. APHANES. *fl. suec.* 137. *hort. cliff.* 39. *act. Stock.* 1741. *p.* 181. *fl. Virgin.* 17. *fl. leyd. prodr.* 231.

Alchimilla montana minima. *Col.* 1. 146. PERCEPIER.

* Percepier anglorum quibusdam. *Bauh. hist.* 2. 74.

1. CUSCUTA nuda repens, filiformis *fl. suec.* 138.

Cuscuta major. *Pin.* 219. CUSCUTE.

a. Cuscuta minor. *I. R. H,* 652. *ex fl. suec.*

b. Cuscuta minor, viticulis aureis, flore albo. *bot. par.* 43. *ex fl. suec.*

TETRAGYNIA.

1. ILEX foliis ovatis acutis dentatis. *hort. cliff.* 40. *fl. leyd. prodr.* 400.

Aquifolium ſive agrifolium vulgò. *Bauh. hiſt.* 1. 114. Houx.

1. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *hort. cliff.* 40. *fl. ſuec.* 139.

*—foliis oblongo-ovatis natantibus. *fl. lapp.* 48.

Potamogeton rotundifolium. *Pin.* 193. EPI D'EAU.

2. POTAMOGETON foliis cordatis amplexicaulibus. *fl. lapp.* 69. *fl. ſuec.* 140. *fl. leyd. prodr.* 212.

Potamogeton perfoliatum. *Rai. hiſt.* 188.

*—foliis latis ſplendentibus. *Pin.*

3. POTAMOGETON foliis lanceolatis in petiolos deſinentibus. *hort. cliff.* 40. *fl. ſuec.* 141. *fl. leyd. prodr.* 212.

Potamogeton alpinum, Plantaginis folio. *I. R. H.* 233.

* Potamogeton aquis immerſum, folio pellucido lato oblongo acuto. *Rai. hiſt.* 2. 188.

4. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis obscurè undulatis, caulibus longe ramosis. *obs. pl.* 102.

Potamogeton longo serrato folio. *Pin.* 193.

5. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppositis acuminatis. *fl. leyd. prodr.* 213.

Potamogeton ramosum angustifolium. *Pin.* 193.

6. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis undulatis. *fl. leyd. prodr.* 212. *fl. suec.* 142.

Potamogeton foliis angustis & undulatis. *I. R. H.* 233.

7. POTAMOGETON foliis linearibus obtusis, caule compresso. *hort. cliff.* 40. *fl. suec.* 143. *fl. leyd. prodr.* 213.

Potamogeton caule compresso, folio graminis canini. *Rai. hist.* 1. 189.

8. POTAMOGETON foliis setaceis parallelis approximatis distichis. *fl. suec.* 145.

*—foliis linearibus acutis longiffi-

mis alternis confertis. *fl. leyd. prodr.* 213.

Potamogeton ramosum, foliis gramineis. *bot. par.* 164.

*——millefolium, seu foliis gramineis ramosum. *Rai. hist.* 189.

9. POTAMOGETON foliis linearibus oppositis, alternisque distantibus basi patentibus, caule tereti. *fl. suec.* 147.

*——foliis linearibus alternis remotis. *fl. leyd. prodr.* 213.

Potamogeton pusillum gramineo folio caule rotundo. *Rai. hist.* 1. 190.

1. SAGINA scapis unifloris. *obs. pl.* 276.

Alsine verna glabra. *bot. monsp. desc.* 14.

2. SAGINA ramis procumbentibus. *fl. suec.* 148. *fl. lapp.* 157. *fl. leyd. prodr.* 452.

*——caulibus & ramis unifloris. *obs. pl.* 277.

Alsine minima flore fugaci. *I. R. H.* 243.

CLASSIS V.

PENTANDRIA,

MONOGYNIA.

1. HELIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis, ſpicis conjunctis. *hort. cliff.* 45. *fl. leyd. prodr.* 404.

Heliotropium majus, Dioſcoridis. *Pin.* 253. HELIOTROPE. HERBE AUX VERRUES.

a. Heliotropium majus autumnale, jaſmini odore. *I. R. H. ex Hall. Helv.* 521.

1. MYOSOTIS ſeminibus aculeis triglochidibus. *fl. ſuec.* 150.

* Lithoſpermum ſeminibus echinatis. *hort. cliff.* 46. *fl. leyd. prodr.* 405.

*—Cynogloſſum foliis lanceolatis, floribus in foliorum alis ſingularibus ferè ſeſſilibus. *obſ. pl.* 92.

Bugloſſum anguſtifolium, ſemine echinato. *I. R. H.* 134.

2. MYOSOTIS foliorum apicibus callosis. *Virid. cliff.* 12. *fl. suec.* 149. *fl. leyd. prodr.* 404.

*—foliis hirsutis. *hort. cliff.* 45.

Lithospermum arvense minus. *I. R. H.* 137.

*—arvense minus floribus luteis, vel luteo-cæruleis. *I. R. H.* 137.

3. MYOSOTIS foliis glabris. *hort. cliff.* 46.

Lithospermum palustre minus flore cæruleo. *I. R. H.* 137. Varietas præcedentis. nº. 2. *ex fl. suec.*

*—idem, flore albo cæruleſcente.

*—idem, flore rubello & cæruleo in ead. plantâ.

a. Lithospermum arvense medium. *hot. par.* 119. *ex Hall. Helv.* 520.

* Alsine myosotis sive auricula muris. *lobel. ic.* 461.

1. LITHOSPERMUM seminibus lævibus, corollis vix calycem superantibus. *hort. cliff.* 46. *fl. suec.* 151. *fl. leyd. prodr.* 405.

Lithospermum majus erectum. *Pin.* 258. GREMIL. HERBE AUX PERLES.

2. LITHOSPERMUM seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. *hort. cliff.* 46. *fl. suec.* 152. *fl. leyd. prodr.* 405.

Buglossum arvense annuum, lithospermi folio. *I. R. H.* 134.

*—idem flore cæruleo purpurascente.

1. ANCHUSA foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *hort. cliff.* 46. *fl. suec.* 153. *fl. leyd. prodr.* 464.

Buglossum anguſtifolium majus. *Pin.* 256. BUGLOSE ou LANGUE DE BEUF.

1. CYNOGLOSSUM foliis lanceolato-ovatis, corollis calycem æquantibus. *fl. leyd. prodr.* 406. *fl. suec.* 154.

*—foliis ovato-lanceolatis. *hort. cliff.* 47.

Cynoglossum majus vulgare. *Pin.* 257. CYNOGLOSSE. LANGUE DE CHIEN.

*—idem flore albo. *Pin.* 257.

(x) a. ~~Cynoglossum~~ creticum latifolium fœtidum. *Pin.* 257.

3. SYMPHYTUM foliis ovato-

(x) 2. CYNOGLOSSUM

lanceolatis. *hort. cliff.* 47. *fl. fuec.* 155. *fl. leyd. prodr.* 407.

Symphytum conſolida major, flore purpureo, quæ mas. *Pin.* 259. CONSOUDE OU OREILLE D'ASNE.

*—idem flore purpuro-cæruleo. *Pin.*

*—idem flore albo, vel pallidè luteo, quæ fœmina. *Pin.*

*—idem flore luteo. *Pin.*

*—idem flore variegato. *hort. Lugd. Bat.*

1. PULMONARIA foliis radicalibus ovato-cordatis. *hort. cliff.* 44. *fl. fuec.* 156. *fl. leyd. prodr.* 403.

Pulmonaria, folio non maculoſo. *cluſ. hiſt.* 169. PULMONAIRE.

2. PULMONARIA foliis radicalibus lanceolatis. *hort. cliff.* 44. *fl. leyd. prodr.* 404.

Pulmonaria foliis echii. *lob. icon.* 586. rubente cæruleo flore.

*—ead. flore albo. *I. R. H.* 136.

*—ead. flore rubro. *Bauh. hiſt.* 3. 597.

* Pulmonaria anguſtifolia cæruleo flore. *Bauh. hiſt.* 3. 596.

* Pulmonaria anguſtifolia non ma-

culosa, flore cæruleo. *bot. par.* 165.

1. BORRAGO calycibus patentibus. *hort. cliff.* 44. *fl. leyd. prodr.* 403.

Borrago floribus cæruleis. *I. R. H.* 133. BOURACHE.

1. LYCOPSIS foliis lanceolatis, calycibus florum erectis. *fl. lapp.* 77. *hort. cliff.* 44. *fl. suec.* 157. *fl. leyd. prodr.* 404.

Buglossum sylvestre minus. *Pin.* 256.

*—sylvestre minus, flore albo.

1. ECHIUM caule simplici, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. *fl. leyd. prodr.* 407. *hort. cliff.* 43. *fl. suec.* 158.

Echium vulgare. *Pin.* 254. VIPERINE.

*—flore ex purpura rubente. *Pin.*

*—flore albo. *hort. Edimb.*

*—platicaulon. *Pin.*

*—paniculâ crispâ. *bot. par.*

1. ASPERUGO. *fl. lapp.* 76. *hort. cliff.* 44. *fl. suec.* 179. *fl. leyd. prodr.* 404.

Asperugo vulgaris. *I. R. H.* 135. RAPETTE.

1. PRIMULA foliis rugosis hirsutis, scapo unifloro. *Hall. Helv.* 482.

Primula veris pallido flore humilis. *clus. hist.* 302. PRIMEVERE.

2. PRIMULA foliis denticulatis rugosis. *hort. cliff.* 51. *fl. suec.* 161. *fl. leyd. prodr.* 415.

Primula veris odorata, flore luteo simplici *Bauh. hist.* 3. 495. BOUILLON ODORIFERANT.

a. Primula veris pallido flore elatior. *clus. hist.* 1. 301. BOUILLON SANS ODEUR. *ex hort. cliff. & fl. suec.*

1. MENYANTHES foliis ternatis. *fl. lapp.* 80. *hort. cliff.* 52. *fl. suec.* 163. *fl. leyd. prodr.* 430.

Menyanthes palustre latifolium & triphyllum. *I. R. H.* 117. MENIANTE, ou TREFLE D'EAU.

*—palustre angustifolium & triphyllum. *I. R. H.* 117.

2. MENYANTHES foliis orbiculatis, corollis margine laceris. *hort.*

cliff. 53. *fl. leyd. prodr.* 430.

Nymphoides aquis innatans. *I. R. H.* 153.

*——ead. foliis maculatis.

1. HOTTONIA. *Boerh. Lugdb.* 207. *hort. cliff.* 51. *fl. ſuec.* 164. *fl. leyd. prodr.* 41.

Stratiotes fluviatilis. *geſn. hort.* 283.

* Millefolium aquaticum, ſeu viola aquatica, caule nudo. *Pin.* 141. flore purpuraſcente. PLUME D'EAU.

*——ead. flore albo.

1. LYSIMACHIA foliis lanceolatis, racemo compoſito terminatrice. *virid. cliff.* 415. *fl. ſuec.* 166. *fl. leyd. prodr.* 416.

*——foliis lanceolatis, corymbo terminatrice. *hort. cliff.* 51.

Lyſimachia lutea major, quæ Dioſcoridis. *Pin.* 245. CORNEILLE. CHASSEBOSSE.

*——ead. foliis ternis, quaternis, quinis. *Pin.*

2. LYSIMACHIA foliis ovato-acutis, floribus ſolitariis, caule pro-

cumbente. *hort. cliff.* 52. *fl. leyd. prodr.* 416.

Lyſimachia humifuſa, folio ſubrotundo acuminato, flore luteo. *I. R. H.* 242.

3. LYSIMACHIA foliis ſubrotundis, floribus ſolitariis, caule repente. *virid. cliff.* 13. *hort. cliff.* 52. *fl. ſuec.* 168. *fl. leyd. prodr.* 416.

Lyſimachia humifuſa, folio rotundiore, flore luteo. *I. R. H.* 242. NUMMULAIRE. HERBE A CENT MALADIES.

4. LYSIMACHIA foliis ſubrotundis, floribus ſolitariis longè pedunculatis. *obſ. pl.* 119.

Lyſimachia humifuſa, folio rotundiore, flore purpuraſcente. *I. R. H.* 242.

* Nummularia minor purpuraſcente flore. *Pin.* 309.

1. ANAGALLIS foliis indiviſis. *fl. leyd. prodr.* 416. *fl. ſuec.* 169.

*—foliis ovatis. *hort. cliff.* 52. *act. ſtock.* 1741. 188.

Anagallis phœniceo flore. *Pin.* 252. MOURON.

*—ead. foliis ternis.

*—ead. foliis quaternis.

*—ead. flore pleno phœniceo.

a. Anagallis cæruleo flore. *Pin.* 252. *ex hort. cliff.*

1. CONVOLVULUS foliis sagittatis posticè truncatis. *hort. cliff.* 66. (pedunculis simplicibus unifloris.) *fl. leyd. prodr.* 427. *fl. suec.* 174.

*—foliis sagittatis posticè truncatis, involucris cordatis. *virid. cliff.* 18.

Convolvulus major albus. *Pin.* 294. LISERON.

2. CONVOLVULUS foliis sagittatis utrinque acutis. *hort. cliff.* 66. *fl. leyd. prodr.* 427. (pedunculis unifloris.) *fl. suec.* 173.

Convolvulus minor arvensis, flore roseo. *Pin.* 294.

*—idem flore purpureo radiis albis picto. *Pin.*

*—idem flore candido. *Pin.*

*—idem flore albo cum umbilico purpureo. *Pin.*

*—idem flore albo punicantibus lineis aspersо. *Pin.*

*—idem flore albo multifido.

1. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *fl. lapp.* 83. *hort. cliff.* 65. *fl. ſuec.* 176. *fl. leyd. prodr.* 247.

Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Pin.* 93. CAMPANULE.

*—ead. flore cinereo.

*—ead. flore albo. *Pin.*

2. CAMPANULA foliis cordato-lanceolatis caule ramoſo, floribus fecundis ſparſis. *virid. cliff.* 17. *fl. leyd. prodr.* 246.

*—foliis ovatis crenatis, floribus per caulem uno verſu ſparſis. *hort. cliff.* 64.

Campanula hortenſis Rapunculi radice. *Pin.* 93.

3. CAMPANULA caule angulato, calycibus pedunculatis ſimplicibus, laciniis ciliatis. *virid. cliff.* 16. *fl. ſuec.* 181. *fl. leyd. prodr.* 245.

*—foliis radicalibus cordatis, calycibus ciliatis. *hort. cliff.* 64.

Campanula vulgatior, foliis urticæ, vel major & aſperior. *Pin.* 94.

*—ead. flore dilutè purpureo. *Pin.* 94.

*—ead. flore candido. *Pin.* 94.

4. CAMPANULA caule angulato, floribus sessilibus, capitulis terminatricibus. *virid. cliff.* 16. *fl. suec.* 182. *fl. leyd. prodr.* 245.

*—foliis lanceolato-ovatis crenatis; ramis capitulo florali terminatis. *hort. cliff.* 64.

Campanula pratensis, flore conglomerato. *Pin.* 94.

*—ead. flore albo. *hort. par.*

*—pratensis, floribus singularibus per caulem sparsis. *Pin.* 94.

5. CAMPANULA foliis radicalibus obversè-ovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. *fl. suec.* 179.

*—foliis linearì-lanceolatis crenatis, caule longissimo simplici, floribus raris. *hort. cliff.* 65. *virid. cliff.* 17. *fl. leyd. prodr.* 246.

Campanula Persicæ folio. *clus. hist.* 171.

*—ead. flore albo. *hort. eyst.*

6. CAMPANULA foliis radicalibus lanceolato-ovalibus, caule ramosissimo patulo. *hort. cliff.* 65. *fl. leyd. prodr.* 246.

Campanula radice esculentâ, flore cæruleo. *hort. lugd. bat.* CAMPANULE. RAIPONCE.

*——ead. flore candicante. *hort. lugd. bat.*

7. CAMPANULA calycibus corollam superantibus, capsulis columnaribus. *virid. cliff.* 17. *fl. leyd. prodr.* 247.

*——caule ramoso, foliis ovatis oblongis crenatis. *hort. cliff.* 65.

Campanula arvensis erecta. *hort. lugd. bat.* DOUCETTE.

*——ead. flore ianthino dilutiore. GRIS DE LIN.

*——ead. flore albo. *hort. lugd. bat.*

a. Campanula arvensis procumbens. *I. R. H.* 112. *ex hort. cliff.*

*——arvensis minor, siliquâ ampliori. *I. R. H.* 112.

*——ead. flore ianthino dilutiore.

8. CAMPANULA caule procum-

bente, foliis cordatis quinquelobis.

Campanula cymbalariæ foliis, vel folio hederaceo. *Pin.* 93.

1. PHYTEUMA foliis cordato-lanceolatis, ſpicâ oblongâ. *obſ. pl.* 34.

Rapunculus ſpicatus albus. *Pin.* 92. RAIPONCE.

*——ſpicatus, flore flaveſcente. *I. R. H.*

2. PHYTEUMA foliis oblongis, ſpicâ orbiculari. *obſ. pl.* 34.

Rapunculus folio oblongo, ſpicâ orbiculari. *Pin.* 92.

1. SAMOLUS. *hort. cliff.* 51; *fl. ſuec.* 165; *fl. leyd. prodr.* 249.

Samolus valerandi. *Bauh. hiſt.* 3. 791.

1. LONICERA floribus capitatis terminatricibus, foliis omnibus diſtinctis. *hort. cliff.* 58; *fl. ſuec.* 191; *fl. leyd. prodr.* 237.

Caprifolium Germanicum. *Dod.* 411. CHEVREFEUILLE.

*——non perfoliatum, foliis ſinuatis. *I. R. H.* 608.

2. LONICERA pedunculis biflo-ris, baccis diſtinctis, foliis integer-rimis. *fl. ſuec.* 192. *fl. leyd. prodr.* 238.

*—pedunculis bifloris, foliis ovatis obtusis integris. *hort. cliff.* 58.

Chamœceraſus dumetorum, fructu gemino rubro. *Pin.* 451.

1. DATURA pericarpiis erectis ovatis. *hort. cliff.* 55. *fl. ſuec.* 185. *fl. leyd. prodr.* 422.

Stramonium fructu ſpinoſo oblongo, flore albo. *I. R. H.* 119.

1 HYOSCYAMUS foliis amplexi caulibus. *hort. cliff.* 56. *fl. ſuec.* 184. *fl. leyd. prodr.* 422.

Hyoſcyamus vulgaris vel niger. *Pin.* 169. JUSQUIAME, ou HANNEBANE.

1. ATROPA. *hort. cliff.* 57. *fl. leyd. prodr.* 423.

Belladona. *Cluſ. Pann.* 508.

1. VERBASCUM foliis utrinque tomentoſis decurrentibus. *virid. cliff.* 13. *fl. ſuec.* 186. *fl. leyd. prodr.* 421.

*—caule ſimplici, ſupernè floribus ſeſſilibus clavato, foliis utrinque lanigeris. *hort. cliff.* 55.

Verbaſcum mas latifolium luteum. *Pin* 239. MOLENE. BOUILLON-BLANC.

a. Verbaſcum fœmina, flore albo. *Pin.* 239. *ex hort. cliff.*

b. Verbaſcum fœmina, flore luteo magno. *Pin.* 239. *ex hort. cliff.*

2. VERBASCUM foliis ovatis crenatis, ſubtùs tomentoſis, caule angulato. *virid. cliff.* 13. *fl. ſuec.* 187. *fl. leyd. prodr.* 421.

*—foliis ovatis ſubtùs incanis crenatis, ſpicâ laxâ rariùs ramoſâ. *hort. cliff.* 54.

Verbaſcum nigrum, flore ex luteo purpuraſente. *Pin.* 240. MOLENE, ou BOUILLON NOIR.

3. VERBASCUM ramoſum, radice perenni, foliis caulinis obverſè ovatis cum acumine, floralibus lanceolatis.

Verbaſcum ramoſum perenne Pariſienſium. *I. R. H.* 147.

4. VERBASCUM foliis ovato-acutis ſubtùs villoſis crenatis, ſpicis laxis lateralibus & terminatricibus. *hort. cliff.* 54. *fl. leyd. prodr.* 421.

Verbaſcum lychnitis, flore albo parvo. *Pin.* 240.

a. Verbaſcum pulverulentum, flore

luteo parvo. *Bauh. hist.* 3. 872. *ex obs. pl. p.* 112.

5. VERBASCUM foliis glabris serato dentatis, radicalibus sinuatis. *fl. leyd. prodr.* 421.

*——annuum, foliis oblongis sinuatis obtusis glabris. *hort. cliff.* 55.

Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Pin.* 240. BLATTAIRE, ou HERBE AUX MITES.

a. Blattaria alba. *Pin.* 241. *ex hort. cliff.*

1. RHAMNUS ramis spinâ terminatis, floribus quadrifidis dicœcis. *hort. cliff.* 70. *fl. suec.* 193. *fl. leyd. prodr.* 224.

Rhamnus catharticus. *Pin.* 478. NERPRUN.

2. RHAMNUS inermis, floribus monogynis hermaphroditis. *hort. cliff.* 70. *fl. suec.* 194. *fl. leyd. prodr.* 224.

*——inermis foliis annuis. *fl. lapp.* 60.

Frangula. *Dod. pempt.* 784. BOURGENE.

1. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis angulatis. *Virid. cliff.* 15. *hort. cliff.* 60. *fl. suec.* 188. *fl. leyd. prodr.* 423. Sola-

Solanum officinarum, acinis nigricantibus. *Pin.* 166. MORELLE.

*—idem foliis ex albo & viridi variegatis.

a.—id. acinis puniceis. *Pin.* } *ex hort.*
b.—id. acinis luteis. *Pin.* } *cliff.*

2. SOLANUM caule inermi perenni flexuoso, foliis superioribus hastatis. *hort. cliff.* 60. *fl. suec.* 189. *fl. leyd. prodr.* 424.

Solanum scandens seu Dulcamara. *Pin.* 166. MORELLE GRIMPANTE, OU VIGNE DE JUDE'E.

*—idem flore albo. *Pin.*

3. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis. *virid. cliff.* 15. *fl. leyd. prodr.* 423.

*—caule inermi annuo, foliis pinnatis, pinnis integris. *hort. cliff.* 60.

Solanum tuberosum esculentum. *Pin.* 166. TRUFFE ROUGE.

1. PHYSALIS caule simplici annuo, foliis integris ad articulos geminatis, floribus solitariis. *hort. cliff.* 62.

*—radice perenni, foliis lanceolato-

cordatis. *Virid cliff.* 16. *fl. leyd. prodr.* 426.

Alkekengi officinarum. *I. R. H.* 151. COQUERET.

*——idem foliis variegatis. *I. R. H.*

1. HEDERA foliis ovatis lobatisque. *fl. lapp.* 91. *hort. cliff.* 74. *fl. ſuec.* 190. *fl. leyd. prodr.* 223.

Hedera arborea. *Pin.* 305. LIERRE.

*——major ſterilis. *Pin.*

1. VITIS foliis palmato-angulatis. *hort. cliff.* 74. *fl. leyd. prodr.* 222.

Vitis ſylveſtris, labruſca. *Pin.* 299. VIGNE.

α. Vitis vinifera. *Pin.* 299. *ex hort. cliff.*

1. RIBES ramis aculeatis erectis, fructu glabro. *hort. cliff.* 82. ubi *Pentandr. Digyn. fl. ſuec.* 195. ubi *Pentandr. Monogyn. fl. leyd. prodr.* 270.

Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylveſtris. *Pin.* 455. GROSEILLER EPINEUX.

2. RIBES inerme floribus oblongis. *hort. cliff.* 82. *fl. ſuec.* 196. *fl. leyd. prodr.* 269.

Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro majore. *Pin.* 455.

3. RIBES inerme, floribus planiuſculis, racemis pendulis. *hort. cliff.* 82. *fl. ſuec.* 197. *fl. leyd. prodr.* 270.

Groſſularia multiplici acino, ſive non ſpinoſa hortenſis rubra, ſive Ribes officinarum. *Pin.* 455. GROSEILLER A GRAPPES.

1. THESIUM. *hort. cliff.* 41. *Hall. Helv.* 183.

Alchimilla linariæ folio, calice florum albo. *I. R. H.* 509.

a. Alchimilla linariæ folio, calice florum ſubluteo. *I. R. H.* 509. *ex Hall. Helv.*

1. VINCA foliis ovatis. *hort. cliff.* 77. *fl. leyd. prodr.* 412.

Pervinca vulgaris anguſtifolia, flore cæruleo. *I. R. H.* 120. PERVENCHE.

a. Pervinca vulgaris latifolia, flore cæruleo. *I. R. H.* 119.

*—vulgaris latifolia flore albo. *I. R. H.* 119.

DIGYNIA.

1. ASCLEPIAS caule erecto simpliciſſimo herbaceo, foliis cordato-lanceolatis, racemis conglomeratis alternis. *fl. ſuec.* 200.

*——caule erecto annuo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis. *hort. cliff.* 78. *fl. leyd. prodr.* 410.

Aſclepias, albo flore. *Pin.* 303. DOMPTE VENIN.

*——albo flore, foliis variegatis.

a. Aſclepias anguſtifolia, flore flaveſcente. *hort. R. par. ex hort. cliff.*

b. Aſclepias non ſcriptum, foliis nigris in ſummo hiſpidis. *corn.* 220.

1. HERNIARIA calycibus bracteâ nudis. *hort. cliff.* 41. *fl. ſuec.* 207. *fl. leyd. prodr.* 215.

Herniaria glabra. *Bauh. hiſt.* 3. 378. HERNIOLE. TURQUETTE.

a. Herniaria hirſuta. *Bauh. hiſt.* 3. 379. *ex hort. cliff.*

1. ILLECEBRUM caulibus procumbentibus. *fl. leyd. prodr.* 214.

* Illecebrum. *hort. cliff.* 492.

Paronychia ſerpillifolia paluſtris. *bot. par.* 157.

* Polygonum parvum, flore albo verticillato. *Bauh. hiſt. Rai. hiſt.* 214.

1. CHENOPODIUM foliis ovatis integerrimis, caule decumbente. *virid. cliff.* 21. *fl. ſuec.* 217. *fl. leyd. prodr.* 218.

Chenopodium Betæ folio. *I. R. H.* 506. PATE D'OYE.

2. CHENOPODIUM foliis rhombeo-ovatis integerrimis. *fl. ſuec.* 216.

*—foliis triangulari-ovatis. *hort. cliff.* 84. *fl. leyd. prodr.* 218.

Chenopodium fœtidum. *I. R. H.* 506.

3. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis ſimplicibus glomeratis ſolitariis. *fl. ſuec.* 215.

*—foliis ovato-oblongis repando-ſinuatis, florum racemis glomeratis ex alâ ſolitariis. *hort. cliff.* 85. *virid. cliff.* 22. *fl. leyd. prodr.* 219.

Chenopodium anguſtifolium laciniatum minus. *I. R. H.* 506.

4. CHENOPODIUM foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subnudis caule brevioribus. *fl. suec.* 210.

*——erectum, foliis subtriangularibus anticè sinuato dentatis, racemis erectis folioſis lateralibus. *hort. cliff.* 85. *fl. leyd. prodr.* 219. *virid. cliff.* 22.

Chenopodium sylvestre alterum, folio sinuato candicante. *I. R. H.* 506.

*——idem comâ purpurascente. *Vaill.* Chenopodium folio laciniato, comâ purpurascente. *I. R. H.* 506.

5. CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato sinuatis, racemis ramosis subnudis. *fl. suec.* 213.

*——folio subtùs farinoso rhomboideo, multis & minoribus dentibus serrato. *Hall. Helv.* 175.

Chenopodium sylvestre opuli folio. *bot. par.* 36. *t.* 7. *f.* 1.

6. CHENOPODIUM foliis lanceolatis dentato sinuatis acutis, floribus spicatis.

Chenopodium spicatum, folio

triangulari dentato. *bot. par.* 36.

7. CHENOPODIUM erectum ramoſiſſimum, foliis ovato-acuminatis dentatis, racemis confertis caulem ſuperantibus. *obſ. pl.* 12.

Chenopodium pes anſerinus primus. *tab. icon.* 427.

8. CHENOPODIUM foliis ovatis acutis dentatis, racemis ramoſis nudis. *fl. ſuec.* 211.

*——erectum ramoſiſſimum, foliis triangularibus dentatis, racemis ramoſis caulem ſuperantibus. *hort. cliff.* 85. *fl. leyd. prodr.* 219.

Chenopodium pes anſerinus ſecundus. *tab. icon.* 427.

9. CHENOPODIUM foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramoſis nudis. *fl. ſuec.* 214.

*——foliis triangulari-ſagittatis infra medium ſinuato-dentatis, racemis longiſſimis. *hort. cliff.* 84. *fl. leyd. prodr.* 219.

Chenopodium ſtramonii folio. *bot. par.* 36.

10. CHENOPODIUM foliis trian-

gulari-ſagittatis integerrimis. *hort. cliff.* 84. *fl. ſuec.* 208. *fl. leyd. prodr.* 218.

Chenopodium folio triangulo. *I. R. H.* 506. BON HENRI.

11. CHENOPODIUM foliis rhomboideo-triangulis eroſis poſticè integris ſummis oblongis, racemis erectis. *fl. ſuec.* 212.

*—foliis inferioribus ovatis acutis antrorſum dentatis, ſummis lanceolatis. *hort. cliff.* 85. *fl. leyd. prodr.* 219. *fl. virg.* 145.

Chenopodium folio ſinuato candicante. *I. R. H.* 506.

1. SALSOLA caule repente, foliis & ſtipulis ſeſſilibus ſubulatis cartilagineis.

Chenopodium annuum humifuſum, folio breviori & capillaceo. *I. R. H.* 506. *Les fleurs de cette Plante n'ont ſouvent que trois étamines.*

1. GENTIANA floribus confertis terminatricibus, corollis quadrifidis imberbibus interjecto denticulo. *hort. cliff.* 81. *fl. leyd. prodr.* 432.

Gentiana cruciata. *Pin.* 188. GENTIANE.

2. GENTIANA floribus terminatricibus raris, corollis erectis plicatis, foliis linearibus. *hort. cliff.* 80. *fl. ſuec.* 202. *fl. leyd. prodr.* 432.

Gentiana anguſtifolia autumnalis major. *Pin.* 188.

3. GENTIANA corollis hypocrateriformibus, fauce barbatis. *hort. cliff.* 81. *fl. ſuec.* 203. *fl. leyd. prodr.* 432.

Gentiana pratenſis, flore lanuginoſo. *Pin.* 188.

4. GENTIANA floribus confertis, faucibus membranâ laciniatâ clauſis, foliis ovato-acuminatis. *obſ. pl.* 302.

Gentiana alpina pumila, centaurii minoris folio. *I. R. H.* 81.

5. GENTIANA foliis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, corollis infundibuliformibus quinquefidis. *hort. cliff.* 81. *fl. ſuec.* 205. (ſtylis ſimplicibus.) *fl. leyd. prodr.* 433.

Centaurium minus. *Pin.* 278. PETITE CENTAURE'E.

*—idem flore dilutè purpurascente.
*—idem flore albo. *Pin.*
a. Centaurium purpureum minimum. *H. R. Blef.* 248.
b. Centaurium minus paluſtre ramoſiſſimum, flore purpureo. *Vaill. ex Hall. Helv.* 475.
*—idem flore purpurascente.
*—idem flore albo.
c. Centaurium paluſtre minimum, flore inaperto. *bot. par.* 32. *t.* 6. *f.* 2. *ex fl. ſuec.*
6. GENTIANA caule dichotomo, foliis lineari-lanceolatis, floribus infundibuliformibus quadrifidis longiſſimè pedunculatis. *obſ. pl.* 305.
Centaurium paluſtre luteum minimum. *Rai. hiſt.* 1092. Varietas præcedentis. n°. 5. *ex fl. ſuec.*
7. GENTIANA caule dichotomo, foliis connatis, corollis octofidis. *hort. cliff.* 81. *fl. leyd. prodr.* 433.
Centaurium luteum perfoliatum. *Pin.* 278.
1. ULMUS fructu membranaceo. *hort. cliff.* 83. *fl. leyd. prodr.* 223. *fl. ſuec.* 219.

Ulmus campestris & Theophrasti. *Pin.* 426. ORME.

a. Ulmus minor folio angusto scabro. *Ger. emac. ex hort. cliff.*

b. Ulmus folio glabro. *Ger. emac.* 1481. *ex hort. cliff.*

c. Ulmus folio latissimo scabro. *Ger. emac.* IPREAU. *ex hort. cliff.*

d. Ulmus pumila, foliis parvis, glabra, cortice fungoso. *Pluk. almag.* 293.

1. ERYNGIUM foliis radicalibus pinnatim tripartito-divisis. *hort. cliff.* 87. *fl. leyd. prodr.* 93.

Eryngium vulgare. *Pin.* 386. PANICAUT.

1. HYDROCOTYLE foliis peltatis orbiculatis undique emarginatis. *hort. cliff.* 88. *fl. suec.* 221. *fl. leyd. prodr.* 93.

Hydrocotyle vulgaris. *I. R. H.* 328. ECUELLE D'EAU.

1. SANICULA foliis radicalibus simplicibus, floseulis omnibus sessilibus. *fl. suec.* 222.

Sanicula officinarum. *Pin.* 319. SANICLE.

1. TORDYLIUM umbellâ confertâ, foliolis lanceolatis inciso-serratis. *hort. cliff.* 90. *fl. leyd. prodr.* 94.

Tordylium maximum. *I. R. H.* 320.

2. TORDYLIUM umbellâ confertâ, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *hort. cliff.* 90. *fl. suec.* 224. *fl. leyd. prodr.* 94.

Daucus annuus minor floribus albis, vel rubentibus. *I. R. H.* 308. *a.* Daucus segetum humilior & ramosior. *bot. par.* 46. *ex hort. cliff.*

* Caucalis segetum minor arthritico hispido similis. *Rai. hist.* 468.

1. CAUCALIS involucro universali pinnatifido, partialibus indivisis, umbellâ multifidâ. *fl. suec.* 225.

*—involucris singulis pentaphyllis, foliolo unico duplo majore. *hort. cliff.* 91. *fl. leyd. prodr.* 95.

Caucalis arvensis echinata, magno flore. *Pin.* 152. HERISSONE'E.

2. CAUCALIS umbellâ universali trifidâ, partialibus pentaspermis,

foliis pinnatis, pinnis ſerratis. *hort. cliff.* 91. *fl. leyd. prodr.* 95.

Caucalis arvenſis echinata latifolia. *I. R. H.* 323.

*—ead. flore albo. *I. R. H.*

3. CAUCALIS ſeminum filamentis ter aut quater uncinatis, pilis verticillatis hiſpidis. *obſ. pl.* 80.

*—involucro generali nullo, laciniis foliorum peranguſtis. *Hall. Helv.* 448.

Caucalis arvenſis echinata, parvo flore & fructu. *Pin.* 152.

4. CAUCALIS umbellulis ſeſſilibus. *hort. cliff.* 91. *fl. leyd. prodr.* 95.

Daucus annuus ad nodos floridus. *I. R. H.* 308.

1. DAUCUS ſeminibus hiſpidis. *hort. cliff.* 88. *fl. ſuec.* 223. *fl. leyd. prodr.* 97. *act. Stock.* 1741. 189.

Daucus vulgaris. *cluſ. hiſt.* 198. Carotte.

*—idem umbellâ rubente.

2. DAUCUS ſeminibus nudis. *hort. cliff.* 89. *fl. leyd. prodr.* 97.

Fœniculum annuum, umbellâ contractâ oblongâ. *I. R. H.* 311.

1. AMMI laciniis foliorum caulis lanceolatis. *hort. cliff.* 89. *fl. leyd. prodr.* 96.

Ammi majus. *Pin.* 159.

*—idem foliis plurimùm inciſis & non nihil criſpis. *Pin.* 159.

1. BUNIUM. *Dod. Belg.* 538. *hort. cliff.* 91. *fl. leyd. prodr.* 107.

Bulbocaſtanum majus, folio apii. *Pin.* 162. TERRE-NOIX.

1. CONIUM ſeminibus ſtriatis. *hort. cliff.* 92. *fl. leyd. prodr.* 107. *fl. ſuec.* 226.

Cicuta major. *Pin.* 160. CIGUE.

*—ead. caule non maculato, ſeminibus cinereis. *Rai. hiſt.* 3. 257.

1. SELINUM foliolis radicalibus ovatis inæqualiter ſerratis. *hort. cliff.* 92. *fl. leyd. prodr.* 106.

Oreoſelinum apii folio, majus. *I. R. H.* 318. PERSIL DE MONTAGNE.

2. SELINUM pinnis ad angulos obtuſos pinnatis, pinnulis inciſis non ſerratis. *Hall. Helv.* 444. *fl. ſuec.* 228.

*—foliis ovato-acutis acutè ſerratis & inciſis. *hort. cliff.* 92.

Oreoſelinum apii folio minus. *I. R. H.* 318.

3. SELINUM paluſtre leviſſimè lacteſcens. *fl. lapp.* 100. *hort. cliff.* 92. *fl. ſuec.* 227. *fl. leyd. prodr.* 106.

Thyſſelinum paluſtre. *I. R. H.* 319.

1. PEUCEDANUM foliis quinquiès tripartitis lineari-ſubulatis integerrimis, utrâque umbellâ breviori patente.

Peucedanum gallicum rarioribus & brevioribus foliis. *hort. reg. par.* Queue de Pourceau.

*—idem flore purpuraſcente. *I. R. H.*

2. PEUCEDANUM foliolis pinnatim diviſis, laciniis oppoſitis. *hort. cliff.* 94. *fl. leyd. prodr.* 98.

Angelica pratenſis, apii folio. *I. R. H.* 313.

3. PEUCEDANUM foliolis pinnatim diviſis, laciniis oblongis. *obſ. pl.* 72.

Angelica pratenſis, apii folio altera. *I. R. H.* 313.

1. LASERPITIUM foliolis cordatis inciſis. *hort. cliff.* 96. *fl. ſuec.* 230. *fl. leyd. prodr.* 101.

Laſerpitium foliis latioribus lobatis. *Mor. umb.* 29.

1. ANGELICA foliolis æqualibus ovato-lanceolatis ſerratis. *hort. cliff.* 97. *fl. ſuec.* 234. *fl. leyd. prodr.* 103.

Imperatoria pratenſis major. *I. R. H.* 317. IMPERATOIRE. ANGELIQUE SAUVAGE.

1. SIUM foliis pinnatis, umbellâ terminatrice. *hort. cliff.* 98. *fl. ſuec.* 235. *fl. leyd. prodr.* 104.

Sium latifolium. *Pin.* 154. BERLE. *a.* Sium ſive apium paluſtre, foliis oblongis. *Pin.* 154. *ex hort. cliff.*

2. SIUM foliis pinnatis, umbellis ex alis ſubſeſſilibus. *hort. cliff.* 98. *fl. leyd. prodr.* 105.

Sium geniculis umbellatis. *Hort. R. Par.* 166.

*—idem foliis laciniatis. *bot. par.*

ſive foliorum conjugationibus laciniatis. *I. R. H.* 308.

3. SIUM foliis ſubmerſis capillaribus, emerſis pinnatis. *fl. leyd. prodr.* 105.

Sium minimum. *Rai. hiſt.* 1. 444.

4. SIUM foliis linearibus, laciniis decurrentibus connatis. *hort. cliff.* 98. *fl. leyd. prodr.* 105.

Ammi perenne *Moris. umb.* 22.

AMMI.

1. SISON foliis pinnatis, umbellis erectis. *fl. leyd. prodr.* 105.

*—foliis pinnatis. *hort. cliff.* 98.

Sium aromaticum, ſiſon officinarum. *I. R. H.* 208.

2. SISON foliis pinnatis umbellis dependentibus. *fl. leyd. prodr.* 105.

*—varietas præcedentis. n. 1. *ex hort. cliff.*

Sium arvenſe ſive ſegetum. *I. R. H.* 308.

1. ŒNANTHE foliis caulinis inflato-fiſtuloſis teretibus. *hort. cliff.* 99. *fl. ſuec.* 236. *fl. leyd. prodr.* 108.

Oenanthe aquatica. *Pin.* 162.

a. Oenanthe ſive filipendula aquatica altera. *Bauh. hiſt. ex Hall. Helv.* 432.

2. ŒNANTHE foliis radicalibus inciſis ovatis, caulinis integris linearibus longiſſimis ſimplicioribus. *hort. cliff.* 99. *fl. leyd. prodr.* 108.

Œnanthe apii folio. *Pin.* 162.

3. ŒNANTHE foliis pinnatis, foliolis lineariter laciniatis.

Carvi foliis tenuiſſimis, aſphodeli radice. *I. R. H.* 306.

1. PHELLANDRIUM. *hort. cliff.* 100. *fl. ſuec.* 238. *fl. leyd. prodr.* 108.

Phellandrium. *dod. pempt.* 591. PHILANDRIE.

1. CORIANDRUM fructibus globoſis. *hort. cliff.* 100. *fl. leyd. prodr.* 109.

Coriandrum majus. *Pin.* 158. CORIANDRE.

1. ETHUSA. *hort. cliff.* 100. *fl. ſuec.* 240. *fl. leyd. prodr.* 109. *Hall. Helv.* 433.

Cicuta minor Petroſelino ſimilis. *Pin.* 160. PETITE CIGUE.

1. BUPLEVRUM foliis radicalibus pedunculatis, summo subrotundo, caulinis linearibus sessilibus. *obs. pl.* 59.

* Buplevrum foliis petiolatis, falcato-ellipticis acutis. *Hall. Helv.* 439.

Buplevrum folio subrotundo, sive vulgatissimum. *Pin.* 278.

2. BUPLEVRUM foliis linearibus acutis sessilibus. *hort. cliff.* 104. *fl. leyd. prodr.* 110.

Buplevrum angustissimo folio. *Pin.* 278.

3. BUPLEVRUM foliis ovatis perfoliatis. *hort. cliff.* 104. *fl. leyd. prodr.* 109.

Buplevrum perfoliatum rotundifolium annuum. *I. R. H.* 310. PERCEFEUILLE.

1. SCANDIX seminibus rostro longissimo extensis. *hort. cliff.* 101. *fl. leyd. prodr.* 111.

Scandix semine rostrato vulgaris. *Pin.* 152. AIGUILLE DES DAMES.

2. SCANDIX seminibus hispidis.

hort. cliff. 101. *fl. ſuec.* 241. *fl. leyd. prodr.* 111. *act. ſtock.* 1741. 189.

Chærophyllum ſylveſtre, ſeminibus brevibus-hirſutis. *I. R. H.* 314. CERFEUIL.

1. CHÆROPHYLLUM ſeminibus lævibus nitidis, petiolis ramiferis ſimplicibus. *hort. cliff.* 101. *fl. ſuec.* 245. *fl. leyd. prodr.* 112.

Chærophyllum ſylveſtre perenne, cicutæ folio. *I. R. R.* 314.

2. Chærophyllum articulis tumidis, umbellâ-univerſali trifidâ. *hort. cliff.* 102. *fl. leyd. prodr.* 112.

Chærophyllum ſylveſtre alterum, geniculis tumentibus. *hort. R. par.*

3. CHÆROPHYLLUM caule maculato, geniculis tumidis. *hort. cliff.* 102. *fl. ſuec.* 244. *fl. leyd. prodr.* 112.

Myrrhis annua, ſemine ſtriato lævi. *Mor. umb.* 44.

1. SESELI petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris. *hort. cliff.* 102. *fl. leyd. prodr.* 112.

Fœniculum ſylveſtre perenne, ſe-

tulæ folio breviori. *I. R. H.* 311.

2. SESELI petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliolis binatis & ternatis. *obſ. pl.* 64.

Fœniculum ſylveſtre elatius, ferulæ folio longiori. *I. R. H.* 311. *var. præced. n.* 1. *ex hort. cliff.*

3. SESELI petiolis ramiferis membranaceis ventricoſis emarginatis. *hort. cliff.* 103. *fl. leyd. prodr.* 112.

Fœniculum ſylveſtre annuum, Tragoſelini odore, umbellâ albâ. *bot. par. tab.* 9. *fig.* 4.

*—idem umbellâ rubente.

1. HERACLEUM foliis pinnatifidis. *hort. cliff.* 103. *fl. ſuec.* 203. *fl. leyd. prodr.* 113.

Sphondylium vulgare hirſutum. *Pin.* 157. BERCE.

*—idem flore rubente.

a. Sphondylium hirſutum, foliis anguſtioribus. *Pin.* 157. *ex hort. cliff. & fl. ſuec.*

*—hirſutum foliis anguſtioribus atro-purpureis. *hort. R. monſp.*

an.—criſpum. *Bauh. hiſt.* 3. *part.* 2. 163?

1. PASTINACA foliis ſimpliciter pinnatis. *hort. cliff.* 105. *fl. leyd. prodr.* 114.

Paſtinaca ſylveſtris latifolia. *Pin.* 155. PANAIS.

1. SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis. *hort. cliff.* 105. *fl. leyd. prodr.* 114.

Smyrnium. *Matth.* 773. MACERON.

1. ANETHUM fructu ovato. *hort. cliff.* 106. *fl. leyd. prodr.* 116.

Fœniculum vulgare germanicum. *Pin.* 147. FENOUIL.

2. ANETHUM quod fœniculum minimum patulum. *I. R. H.* 312.

1. CARUM. *Dod. pempt.* 299. *fl. lapp.* 105. *hort. cliff.* 106. *fl. ſuec.* 245. *fl. leyd. prodr.* 116.

Carvi. *Cæſalp.* 290. CARVI.

1. PIMPINELLA foliolis ſubrotundis. *fl. ſuec.* 246.

*——pimpinella. *hort. cliff.* 106. *fl. leyd. prodr.* 115.

Tragoſelinum alterum majus. *I. R. H.* 309. BOUCAGE.

a. Tragoſelinum majus umbellâ candidâ. *I. R. H.* 309. *ex hort. cliff.*

b. Tragoſelinum minus. *I. R. H.* 309. *ex fl. ſuec.*

*—idem flore rubente.

1. ÆGOPODIUM foliis caulinis ſummis ternatis. *fl. ſuec.* 247. *hort. cliff.* 107. *fl. leyd. prodr.* 115.

Angelica ſylveſtris minor, ſive erratica. *Pin.* 155. ANGELIQUE.

1. APIUM foliolis caulinis cuneiformibus. *hort. cliff.* 107. *fl. ſuec.* 248. *fl. leyd. prodr.* 115.

Apium paluſtre & apium officinarum. *Pin.* 154. ACHE.

TRIGYNIA.

1. VIBURNUM foliis cordatis acutè crenatis venoſis, ſubtùs tomentoſis. *virid. cliff.* 25. *fl. leyd. prodr.* 242.

*—*hort. cliff.* 109.

Viburnum. *Matth.* 217. VIORNE.

~~1. OPULUS~~. *Ruell.* 281. *hort. cliff.* 109. *fl. ſuec.* 249. *fl. leyd. prodr.* 243. *fl. virgin.* 149. OBIER.

2. VIBURNUM foliis trilobis dentatis. Hort. Upſ. 69.

1. SAMBUCUS caule arboreo ramoso, floribus umbellatis. *fl. leyd. prodr.* 243. *fl. suec.* 250.

*——caule perenni ramoso. *hort. cliff.* 109.

Sambucus fructu in umbellâ nigro. *Pin.* SUREAU.

2. SAMBUCUS caule herbaceo simplissimo. *hort. cliff.* 110. *virid. cliff.* 25. *fl. suec.* 251. *fl. leyd. prodr.* 243.

Sambucus humilis sive ebulus. *Pin.* IEBLE.

1. CORRIGIOLA caule florum fasciculis terminato. *hort. cliff.* 112. *fl. leyd. prodr.* 420.

Polygonifolia vulgaris. *bot. par.* 162.

Polygoni vel Linifolia per terram sparsa, flore scorpioidis. *Bauh. hist.*

TETRAGYNIA.

1. PARNASSIA. *fil. lapp.* 108. *hort. cliff.* 113. *fl. suec.* 252. *fl. leyd. prodr.* 420.

Parnassia palustris & vulgaris. *I. R. H.* 246.

TIN-

PENTAGYNIA.

1. STATICE caule nudo simplicissimo capitato. *hort. cliff.* 115. *fl. suec.* 253. *fl. leyd. prodr.* 191.

Statice. *Lugd. hist.* 1190.

1. LINUM ramis foliisque alternis lineari-lanceolatis, radice annuâ. *hort. cliff.* 114. *fl. leyd. prodr.* 433.

Linum sativum. *Pin.* 214. LIN.

*——arvense.

2. LINUM ramis alternis, foliisque linearibus. *obs. pl.* 106. *Pin.* 214.

Linum sylvestre angustifolium, floribus dilutè purpurascentibus vel carneis. *Pin.* 214.

3. LINUM caule dichotomo, foliis ovato-lanceolatis, corollis acutis. *hort. cliff.* 114. *fl. suec.* 255. *fl. leyd. prodr.* 434.

Linum pratense, flosculis exiguis. *Pin.* 214.

4. LINUM caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. *hort. cliff.* 114. *fl. suec.* 256. *fl. leyd. prodr.* 434.

Linum minimum, Polygonum minimum, ſive millegrana minima. *Pin.* 282.

1. DROSERA ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. *fl. lapp.* 109. *fl. ſuec.* 257. *fl. leyd. prodr.* 417.

Ros ſolis folio ſubrotundo. *Pin.* 357.

2. DROSERA ſcapis radicatis, foliis oblongis. *fl. lapp.* 110. *fl. ſuec.* 258. *fl. leyd. prodr.* 417.

Ros ſolis folio oblongo. *Pin.* 357.

1. CRASSULA caule dichotomo, foliis linearibus, floribus quadrifidis. *fl. ſuec.* 259.

*—floribus quadrifidis. *hort. cliff.* 497.

Sedum minimum annuum, flore roſeo tetrapetalo. *bot. par. tab.* 10. *fig.* 2.

1. MYOSURUS foliis integris. *hort. cliff.* 117. *fl. ſuec.* 261. *fl. leyd. prodr.* 493.

Myoſuros. *Bauh. hiſt.* 3. *l.* 31. *p.* 512. QUEUE DE SOURIS.

* Ranunculus gramineo folio, flore

caudato, seminibus in capitulum spicatum congestis. *I. R. H.* 293.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA,

MONOGYNIA.

1. GALANTHUS. *hort. cliff.* 134. *fl. leyd. prodr.* 35.

Narcisso-leucoium trifolium minus. *I. R. H.* 387. PERCE-NEIGE.

1. NARCISSUS foliis ensiformibus, florum nectario longitudine petalorum. *hort. cliff.* 134. *fl. leyd. prodr.* 35.

Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. *Pin.* 52. NARCISSE.

1. ALLIUM foliis lanceolatis, scapo nudo semicylindraceo, bulbo fetis obvallato. *act. stock.* 1741. 191. *fl. suec.* 263.

*—foliis radicalibus petiolatis, floribus umbellatis. *fl. leyd. prodr.* 39.

Allium sylvestre latifolium. *Pin.* 74. AIL.

2. ALLIUM foliis lanceolatis binis, umbellulâ laxâ. *hort. cliff.* 137.

*—foliis lanceolatis radicalibus sessilibus, floribus umbellatis. *fl. leyd. prodr.* 38.

Allium latifolium luteum. *I. R. H.* 384.

1. CEPA scapis foliis que subulatis teretibus æqualibus, spathis globosis. *it. oel. jun.* 2. *fl. suec.* 264.

*—scapo longitudine, figurâque foliorum, foliis subulatis filiformibus, spathis globosis. *hort. cliff.* 136.

Cepa montana, capite rotundo. *bot. par.* 32. OIGNON.

* Allium montanum, capite rotundo. *Pin.* 75.

2. Cepa capitulo bulboso prolifero, foliis semiteretibus novemangularibus scabris fistulosis. *fl. suec.* 265.

* Porrum radice solidâ, caule erecto, capitulo bulbifero. *fl. leyd. prodr.* 40.

*—capite bulbifero, staminibus alternè trifidis. *Hall. Helv.* 295.

Cepa sylvestris tenuifolia prolifera. *hist. par.* 413.

* Cepa juncifolia minor purpurascens. *I. R. H.* 383.

* Allium campestre juncifolium, capitatum purpurascens majus. *Pin.* 74.

2. CEPA capite bulbifero, vaginâ longissimè caudatâ. *Hall. Helv.* 296.

Cepa montana bicornis flore obsoletiore. *I. R. H.* 383.

3. CEPA scapis foliisque subulato-teretibus, spathis conicis apice bifidis.

Cepa montana bicornis, flore luteo. *bot. par.* 32.

* Allium juncifolium bicorne luteum. *Pin.* 75.

~~1. PORRUM capitulo bulboso erecto, foliis planis suberenatis, vaginis ancipitibus. *act. stock.* 1741. *p.* 191. *fl. suec.* 266.~~

~~Allium sylvestre amphicarpon, foliis porraceis, floribus & nucleis purpureis. *Rai. syn.* 230.~~

1. ANTHERICUM caulibus non ramosis, foliis planis. *obs. pl.* 128.

Phalangium parvo flore, non ramosum. *Pin.* 29.

pitibus. Hort. Ups. 77.
* Porrum capitulo bulboso erecto, foliis planis suberenatis, vaginis ancipitibus. fl. suec. 266.
Allium sylvestre amphicarpon, foliis porraceis, floribus et nucleis purpureis Rai. syn. 230.

2. ANTHERICUM foliis planis, corollis planis deciduis. *fl. ſuec.* 267.

*—foliis gramineis planis, corollis planis. *act. ſtock.* 1741. *p.* 191.

*—caulibus ramoſis, foliis planis. *obſ. pl.* 129.

Phalangium parvo flore ramoſum. *Pin.* 29.

1. SCILLA radice ſolidâ, foliis ſetaceis, floribus faſtigiatis, pedunculis arcuatis ex alâ tuberculi mammillaris. *obſ. pl.* 131.

Ornithogalum autumnale minus, floribus cæruleis. *I. R. H.* 381.

*—idem flore dilutè purpureo. *I. R. H.* 381.

*—idem flore albo.

1. ORNITHOGALUM ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus. *fl. ſuec.* 270.

*—ſcapo diphyllo, pedunculis ſimplicibus terminatricibus, filamentis ſubulatis. *hort. cliff.* 124. *fl. leyd. prodr.* 31.

Ornithogalum luteum. *Pin.* 71.

2. ORNITHOGALUM floribus

corymbosis, pedunculis scapum longè superantibus, filamentis alternis emarginatis. *hort. cliff.* 124. *fl. leyd. prodr.* 32.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium. *Pin.* 71.

3. ORNITHOGALUM spicâ longissimâ, filamentis triangularibus. *Hall. Helv.* 294.

Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. *Pin.* 71.

1. ASPARAGUS foliis setaceis, caule herbaceo. *fl. suec.* 272. *fl. leyd. prodr.* 28.

*—inermis, foliis setaceis, caule herbaceo. *hort. cliff.* 121.

Asparagus sativa. *Pin.* 489. ASPERGE.

a. Asparagus sylvestris tenuissimo folio. *Pin.* 490. *ex hort. cliff.*

1. CONVALLARIA scapo nudo. *fl. lapp.* 112. *hort. cliff.* 124. *fl. suec.* 273. *fl. leyd. prodr.* 26.

Lilium convallium album. *Pin.* 304. MUGUET.

*—anguſtifolium. *Rai. ſynops.* 148.

2. CONVALLARIA foliis cordatis. *fl. lapp.* 113. *hort. cliff.* 125. *fl. ſuec.* 276. *fl. leyd. prodr.* 26.

Lilium convallium minus. *Pin.* 304. unifolium. *Dod.*

* Smilax unifolia humillima. *I. R. H. app.* 654.

3. CONVALLARIA foliis alternis, floribus ex alis. *hort. cliff.* 124. *fl. ſuec.* 274. *fl. leyd. prodr.* 26.

Polygonatum latifolium vulgare. *Pin.* 303. SCEAU DE SALOMON.

*—idem cauliculis rubentibus. *hort. lugd. bat.*

a. Polygonatum latifolium maximum. *Pin.* 303. *ex hort. cliff. & fl. ſuec.*

b. Polygonatum latifolium, Ellebori albi foliis. *Pin.* 303. *hiſt. ox. ex hort. cliff.*

c. Polygonatum latifolium, flore majore odoro. *Pin.* 303. *ex fl. ſuec.*

*—latifolium, flore duplici odoro. *hort. r. par.*

1. HYACINTHUS corollis campanulatis ſexpartitis. *hort. cliff.* 125. *fl. leyd. prodr.* 27.

Hyacinthus oblongo flore, cæruleus major. *Pin.* 43. JACINTHE.

*——anglicus cinericius. *hort. eyst.*

*——non scriptus, flore candido. *Dod. pempt.* 215.

2. HYACINTHUS corollis globosis. *hort. cliff.* 126. *fl. leyd. prodr.* 28.

Muscari arvense anguſtifolium cæruleum minus. *I. R. H.* 348.

a. Muscari arvense latifolium purpurascens. *I. R. H.* 347. *ex obs. pl.* 130.

1. JUNCUS culmo nudo stricto, capitulo laterali. *fl. leyd. prodr.* 44. *fl. suec.* 278.

Juncus lævis, paniculâ non sparsâ. *Pin.* 12. JONC.

2. JUNCUS culmo nudo stricto, paniculâ laterali. *fl. leyd. prodr.* 44. *fl. suec.* 279.

*——culmo nudo acuminato ad basim squamato, floribus pedunculatis. *fl. lapp.* 117.

Juncus lævis paniculâ sparsâ major. *Pin.* 12.

a. Juncus acutus paniculâ ſparsâ. *Pin.* 12. *ex obſ. pl.* 135.
b. Juncus acumine reflexo major. *Pin.* 12. *ex Hall. Helv.* 253.

3. JUNCUS foliis mollioribus: carinatis, paniculâ multiplici & ramosâ. *Hall. Helv.* 254.

Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. *Bauh. hiſt.* 2. 522. quoad iconem.

4. JUNCUS culmo nudo, foliis ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis. *fl. ſuec.* 282.

*——foliis ſetaceis, culmo nudo, capitulis conglomeratis terminatricibus. *fl. leyd. prodr.* 44. *n°.* 10.

Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. *Bauh. hiſt.* 2. 522. quoad deſcriptionem.

5. JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *fl. leyd. prodr.* 43. *fl. ſuec.* 283.

Juncus paluſtris humilior erectus. *I. R. H.* 246.
a. Juncus paluſtris humilior repens. *I. R. H.* 246. *ex fl. ſuec.*

6. JUNCUS foliis linearibus canaliculo-concavis, capsulis obtusis. *fl. suec.* 284.

*—foliis angulatis, culmo subnudo, paniculâ terminatrice proliferâ, capsulis ovatis. *fl. leyd. prodr.* 43.

Juncus parvus repens, capsulis triangularibus. *bot. par.* 110.

* Gramen junceum minimum, capsulis triangulis. *hist. ox.* 3. *sect.* 8. *tab.* 9. *fig.* 3.

* Juncus parvus repens capitulis foliaceis. *bot. par.* 110.

7. JUNCUS foliis nodoso-articulatis. *fl. suec.* 285.

**Foliis articulosis, paniculâ inæquali, capitulis sessilibus, capsulis subulatis triquetris. *fl. leyd. prodr.* 43.

Juncus foliis articulosis, floribus umbellatis. *I. R. H.* 247.

*—idem cum utriculis. *I. R. H.* 247.

*—nemorosus, folio articuloso. *I. R. H.* 247.

8. JUNCUS foliis planis pilosis, corymbo ramoso. *fl. suec.* 287.

*—foliis planis pilosis, paniculâ dif-

fusâ, pedunculis proliferis, floſculis intermediis ſeſſilibus. *fl. leyd. prodr.* 43.

Juncus nemoroſus latifolius major. *I. R. H.* 246.

9. JUNCUS foliis planis, ſpicâ ſeſſili pedunculatâque. *fl. ſuec* 288.

*——foliis planis, paniculâ rarâ, ſpicis ſeſſilibus & pedunculatis. *hort. cliff.* 137. *fl. leyd. prodr.* 42.

Juncus villoſus, capitulis Pſyllii. *I. R. H.* 246.

a. Juncus foliis planis, culmo paniculato, ſpicis ovatis. *fl. lapp.* 127. *ex fl. ſuec.*

Juncus villoſus capitulis Pſyllii globoſis. *bot. par.* 110.

* Gramen hirſutum capitulis globoſis. *hiſt. ox.*

10. JUNCUS foliis planis, corymbo compacto. *obſ. pl.* 138.

Juncus villoſus paniculâ compactâ. *bot. par.* 110. *variet. præced. nº* 9. *ex Hall. Helv.* 256.

* Gramen hirſutum elatius, paniculâ junceâ compactâ. *Rai. ſynops.*

11. JUNCUS foliis planis latiſſimis, paniculâ ſparsâ duplicato-ramosâ. *Hall. Helv.* 257.

Juncus villoſus latifolius maximus. *bot. par.* 110.

* Gramen Luzulæ maximum. *Bauh. hiſt.* 2. *l.* 8. *p* 493.

12. JUNCUS foliis planis anguſtioribus, paniculâ umbellatâ foliis breviori, floribus longiſſimis albis. *Hall. Helv.* 257.

Juncus anguſtifolius villoſus, floribus albis paniculatis. *I. R. H.* 247.

13. JUNCUS foliatus minimus. *Bauh. hiſt.* 2. 523.

a. Juncus foliatus minor, floribus per ramos ſparſis. *bot. par.* 109.

1. BERBERIS ſpinis triplicibus. *hort. cliff.* 122. *fl. ſuec.* 290. *fl. leyd. prodr.* 438.

Berberis dumetorum. *Pin.* 458.

EPINE-VINETTE.

1. PEPLIS. *fl. lapp.* 128. *fl. ſuec.* 291.

Glaux paluſtris, flore ſtriato clauſo, foliis Portulacæ. *I. R. H.* 88.

*—altera ſubrotundo folio. *bocc. muſ. tab.* 84.

TRIGYNIA.

1. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongo-ſagittatis. *fl. ſuec.* 295. *virid. cliff.* 32. *fl. leyd. prodr.* 231.
*—foliis oblongo-ſagittatis. *hort. cliff.* 139. *fl. lapp.* 130.
Acetoſa pratenſis. *Pin.* 114. OZEILLE.
*—pratenſis flore albo. *hort. r. par.*
*—ſemine vidua. *hort. r. par.*
*—ſylvatica ſubincana & villoſa.
*—criſpa. *hiſt. ox.* 2. 582.

2. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-haſtatis. *fl. ſuec.* 296. *virid. cliff.* 32. *fl. leyd. prodr.* 231.
*—foliis lanceolatis haſtatis. *fl. lapp.* 131. *hort. cliff.* 139.
Acetoſa arvenſis lanceolata. *Pin.* 114. VINETTE.
*—ead. ſemine vidua.
*—arvenſis minima non lanceolata. *Pin.* 114.
*—ead. ſemine vidua.

*—minor erecta, lobis multifidis, *bocc. muſ.* 2. 164.
a. Acetoſa lanceolata anguſtifolia repens. *Pin.* 114. *ex fl. ſuec.*
3. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis planis, *hort. cliff.* 138. (foliis cordato-lanceolatis.) *fl. ſuec.* 292.
*—foliis cordato-oblongis acuminatis integris. *fl. lapp.* 129.
Lapathum folio acuto criſpo. *Pin.* 115. PATIENCE ou PARELLE.
a. Lapathum aquaticum folio cubitali. *Pin.* 115. *ex hort. cliff.* & *fl. ſuec.*
b. Lapathum hortenſe, folio oblongo, ſive ſecundum Dioſcoridis. *Pin.* 114. *ex hort. cliff.*
4. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis dentatis granulo incumbente notatis. *hort. cliff.* 138. *fl. ſuec.* 293. *fl. leyd. prodr.* 229.
Lapathum folio acuto plano. *Pin.* 114.
*—minimum. *Pin.* 115.
5. RUMEX qui Lapatum invo-

lucro feminis dentato, foliis obtusis, orâ crispulâ. *Hall. Helv.* 172.

Lapathum folio minùs acuto. *Pin.* 115.

6. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis lyratis. *obs. pl.* 7.

pandurae formibus

* Lapatum involucro feminis dentato, foliis supra petiolum emarginatis. *Hall. Helv.* 172.

Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum. *Bauh. hist.* 2. 989.

7. RUMEX qui lapathum anthoxanthon. *Bauh. hist.* 2. *l.* 23. 987.

1. TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus linearibus. *act. stock.* 1742. 147. *fl. suec.* 298.

*—fructu tenui. *fl. lapp.* 134. *fl. leyd. prodr.* 44.

Juncago palustris & vulgaris. *I. R. H.* 266.

1. COLCHICUM foliis planis erectis. *hort. cliff.* 140. *fl. leyd. prodr.* 41.

β Colchicum commune. *Pin.* 67.

COLCHIQUE.

POLYGINIA.

1. ALISMA fructu ſexcorni. *hort. cliff.* 141. *fl. leyd. prodr.* 46.
Damaſonium ſtellatum. *lugd. hiſt.* 1059. FLUTE DE BERGER.

2. ALISMA fructu obtuſo trigono. *fl. lapp.* 138. *hort. cliff.* 141. *fl. ſuec.* 300. *fl. leyd. prodr.* 46.
Damaſonium ampliore folio paniculatum. *bot. par.* 46.
*—lato Plantaginis folio. *act. Acad. R. Sc.* 1719.
a. Damaſonium paniculatum anguſtiore folio. *bot. par.* 46. *ex fl. ſuec.*
*—anguſto Plantaginis folio. *act. Acad. R. Sc.* 1719.

3. ALISMA fructu globoſo undique echinato. *hort. cliff.* 141. *fl. ſuec.* 301. *fl. leyd. prodr.* 46.
Damaſonium umbellatum anguſtiſſimo folio. *bot. par.* 46.
*—anguſtiſſimo Plantaginis folio. *act. Acad. R. Sc.* 1719.

4. ALISMA quod Damaſonium radiculas emittens ex geniculis. *bot. par.*

Damasonium repens, Potamogetonis rotundi folii folio. *act. Acad. R. Sc.* 1719.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA,

MONOGYNIA.

1. ESCULUS. *hort. cliff.* 142. *fl. leyd. prodr.* 463.

Hippocastanum vulgare. *I. R. H.* 611. MARONNIER D'INDE.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

1. ACER foliis tripartito-palmatis, laciniis utrinque emarginatis obtusis, cortice sulcato. *hort. cliff.* 144. *fl. leyd. prodr.* 459.

Acer campestre & minus. *Pin.* 431. ERABLE.

*——idem fructu rubente. *bot. par.* 1.

*—idem mas seu sterile.

2. ACER foliis palmatis obtusè serratis, floribus ferè apetalis oppositè racemosis. *hort. cliff.* 143.

*—foliis palmato-angulatis obtusè serratis, floribus fermè apetalis oppositè racemosis. *virid. cliff.* 33. *fl. leyd. prodr.* 459.

Acer montanum candidum. *Pin.* 430. ERABLE-SICOMORE.

*—idem fructu rubente.

3. ACER foliis quinquelobis acuminatis acutèque dentatis. *fl. suec.* 303.

*—foliis palmatis acutè dentatis, floribus corollâ speciosis corymbosis. *hort. cliff.* 143. *fl. leyd. prodr.* 459.

Acer platanoides. *Munting. hist.* 55.

1. RUTA foliis decompositis. *hort. cliff.* 145. *fl. leyd. prodr.* 461.

Ruta hortensis latifolia. *Pin.* 336. RUE.

*—sylvestris major. *Pin.*

1. EPILOBIUM foliis lanceolatis serratis. *hort. cliff.* 145. *fl. suec.* 305. *fl. leyd. prod.* 251. *fl. virg.* 154.

Chamænerion villosum, magno flore purpureo. *I. R. H.* 303.

a. Chamænerion villosum majus, parvo flore. *I. R. H.* 303. *ex hort. cliff.*

2. EPILOBIUM foliis ovatis dentatis. *fl. lapp.* 147. *hort. cliff.* 145. *fl. suec.* 306. *fl. leyd. prodr.* 251.

Chamænerion glabrum majus. *I. R. H* 303.

*—idem foliis ternis.

a. Chamænerion glabrum minus. *I. R. H.* 303. *ex Hall. Helv.* 409.

3. EPILOBIUM floribus difformibus, pistillo declinato. *fl. suec.* 304.

*—foliis lanceolatis integerrimis. *fl. lapp.* 146. *hort. cliff.* 145. *fl. leyd. prodr.* 250.

Chamænerion latifolium vulgare. *I. R. H.* 302.

1. ERICA foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris erectis, corollis inæqualibus calyce brevioribus. *hort. cliff.* 147. *fl. suec.* 309. *fl. leyd. prodr.* 442.

Erica vulgaris glabra. *Pin.* 485. BRUIERE.

*—ead. fl. albo. *Pin.*

a. Erica myricæ folio hirsuta. *Pin.* 485. *ex bot. par.*

2. ERICA foliis linearibus ternis oppositis floribus globoso-oblongis laxè spicatis. *obs. pl.* 111.

Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore. *Pin.* 486.

*——ead. arbuti flore xanthino dilutiore

*——ead. arbuti flore albo. *hort. R. par.*

*——ead. arbuti flore carneo dilutiore.

*——ead. Amaranthoides, flore vidua.

3. ERICA foliis subulatis ciliatis quaternis oppositis, corollis globoso-ovatis terminatricibus confertis. *hort. cliff.* 148. *fl. suec.* 310. *fl. leyd. prodr.* 442.

Erica Brabantica, folio Coris hirsuto quaterno. *Bauh. hist.* 1. 358.

*——ead. flore albo. *Bauh. hist.*

4. ERICA foliis linearibus, floribus ex apice ramorum confertis, corollis campanulatis subrotundis, foliis brevioribus. *hort. cliff.* 148.

Erica major scoparia foliis deciduis. *Pin.* 485.

1. DAPHNE floribus racemosis

lateralibus, foliis lanceolatis integris. *hort. cliff.* 147. *fl. leyd. prodr.* 208.

Thymelæa lauri folio, semper vivens, seu laureola mas. *I. R. H.* 595. LAUREOLE.

2. DAPHNE floribus sessilibus infrà folia Elliptico-lanceolata. *fl. lapp.* 140. *hort. cliff.* 147. *fl. suec.* 311. *fl. leyd. prodr.* 208.

Thymelæa laurifolio deciduo, sive Laureola fœmina. *I. R. H.* 595. BOIS-GENTI.

1. PASSERINA foliis linearibus, floribus laxè spicatis alternis in foliorum binorum alis sessilibus. *obs. pl.* 25.

Thymelæa Linariæ folio vulgaris. *I. R. H.* 594. GAROU.

1. VACCINIUM ramis filiformibus, foliis ovatis perennantibus, pedunculis simplicibus, stipulâ duplici. *fl. suec.* 315.

*——ramis filiformibus repentibus, foliis ovatis perennantibus. *fl. lapp.* 145. *fl. leyd. prodr.* 239. *hort. cliff.* 148.

Oxycoccus ſive Vaccinia paluſtris. *Bauh. hiſt.* 227. CANNEBERGE.

2. VACCINIUM caule angulato foliis ovatis ſerratis deciduis. *fl. lapp.* 143. *hort. cliff.* 148. *fl. ſuec.* 313. *fl. leyd. prodr.* 239.

Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Pin.* 470. AIRELLE, ou RAISIN DE BOIS.

TRIGYNIA.

1. PERSICARIA floribus hexandris Digynis. *fl. ſuec.* 319.

*—florum ſtaminibus ſenis, ſtylo duplici. *hort. cliff.* 42. *fl. leyd. prodr.* 216. *fl. virg.* 157.

Perſicaria mitis non maculoſa. *Pin.* 101. PERSICAIRE.

*—ead. flore roſeo.

*—mitis maculoſa. *Pin.* 101.

*—mitis floribus candidis. *Pin.* 101.

*—mitis cum maculis ferrum equinum referentibus. *I. R. H.* 509.

2. PERSICARIA foliis non ſerratis ſubtùs tomentoſis. *Hall. Helv.* 181.

Persicaria folio subtùs incano. *I. R. H.* 510.

*——ead. flore candido.

*——folio subrotundo obtuso subtùs incano.

3. PERSICARIA foliis angustissimis penè glabris, spicis interruptis rarissimis, vaginis ciliaribus. *Hall. Helv.* 181.

Persicaria angustifolia. *Pin.* 101. *a.* Persicaria minor. *Pin.* 101. *ex Hall. Helv.*

4. PERSICARIA florum staminibus quinis, stylo bifido, corollâ regulari, æqualibus. *hort. cliff.* 42. *fl. leyd. prodr.* 216.

Persicaria major, Lapathi foliis, calyce floris purpureo. *I. R. H.* 510.

*——ead. flore albo.

5. PERSICARIA floribus pentandris digynis, corollâ staminibus breviore. *fl. suec.* 318.

*——florum staminibus quinis corollam superantibus stylo bifido. *hort. cliff.* 41. *fl. leyd. prodr* 216.

Persicaria salicis folio, Potamogeton

ton anguſtifolium dicta. *Rai. hiſt.* 1. 184.

6. PERSICARIA floribus hexandris ſemidigynis. *fl. ſuec.* 320.

*—florum ſtaminibus ſenis, ſtylo bifido. *hort. cliff.* 42. *fl. leyd. prodr.* 216.

Perſicaria urens, ſeu hydropiper. *Pin.* 101. CURAGE.

1. POLYGONUM. *Cæſalp. ſyſt.* 168. *hort. cliff.* 150 *fl. ſuec.* 322. *fl. leyd. prodr.* 215. *fl. virg.* 44.

Polygonum latifolium. *Pin.* 281. RENOUE'E.

*—idem flore candido vel rubente. *Pin.* 281.

*—brevi anguſtoque folio. *Pin.* 281. *a.* Polygonum oblongo anguſtoque folio. *Pin.* 281. *ex hort. cliff. & fl. ſuec.*

1. HELXINE caule erecto inermi, foliis cordato-ſagittatis. *hort. cliff.* 151. *fl. ſuec.* 324. *fl. leyd. prodr.* 217.

Fagopyrum vulgare erectum. *I. R. H.* 511. SARRASIN.

*—idem flore rubente.

2. HELXINE caule volubili. *fl. lapp.* 154. *hort. cliff.* 150. *fl. leyd. prodr.* 217. *fl. virg.* 157.

Fagopyrum vulgare ſcandens. *I. R. H.* 511.

TETRAGYNIA.

1. PARIS foliis quaternis. *fl. lapp.* 155. *hort. cliff.* 153. *fl. ſuec.* 325. *fl. leyd. prodr.* 461.

Herba Paris. *Dod. pempt.* 444. RAISIN DE RENARD.

1. ADOXA. *hort. cliff.* 153. *fl. ſuec.* 326. *fl. leyd. prodr.* 252.

Moſchatellina foliis fumariæ bulboſæ. *Bauh. hiſt.* 3. 206.

1. ELATINE foliis ſtellatis. *fl. leyd. prodr.* 452.

Alſinaſtrum Gallii folio. *I. R. H.* 244.

*—Gratiolæ folio. *I. R. H.*

2. ELATINE foliis oppoſitis. *fl. ſuec.* 327. *fl. lapp.* 156. *fl. leyd. prodr.* 452.

Alſinaſtrum ſerpillifolium, flore

albo tetrapetalo. *bot. par.* 5.

a. Alsinastrum serpillifolium, flore roseo tripetalo. *bot. par.* 5. *ex obs. pl.*

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA,

HEXAGYNIA.

1. BUTOMUS. *Cæsalp.* 553. *fl. lapp.* 159. *hort. cliff.* 155. *fl. suec.* 328. *fl. leyd. prodr.* 45. JONC FLEURI.

*—flore albo. *I. R. H.* 271.

CLASSIS X.

DECANDRIA,

MONOGYNIA.

1. MONOTROPA floribus lateralibus octandris, terminatrici decandro. *fl. suec.* 329.

Orobanchoides nostras, flore oblongo flavescente *act. Acad. R. Sc.* 1706.

1. PYROLA ſtaminibus adſcendentibus, piſtillis declinatis. *fl. ſuec.* 330.

*—foliis integerrimis. *virid. cliff.* 37. *fl. leyd. prodr.* 440.

*—foliis ſubrotundis, ſcapo racemoſo. *hort. cliff.* 162.

*—ſtaminibus & piſtillo declinatis. *fl. lapp.* 169.

Pyrola rotundifolia major. *Pin.* 191. PIROLE.

DIGYNIA.

1. DIANTHUS floribus aggregatis, ſquamis calycinis lanceolatis, corollis crenatis. *obſ. pl.* 284.

Caryophyllus montanus. 1. *Tab. icon.* 287. OEILLET.

*—ſylveſtris vulgaris latifolius. *Pin.* 209.

*—montanus, flore incarnato.

*—montanus albus. *tab. icon.* 288.

*—ſylveſtris vulgaris anguſtifolius. *Pin.* 209.

2. DIANTHUS floribus ſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis, corol-

lis crenatis. *hort. cliff.* 164. *fl. ſuec.* 342. *fl. leyd. prodr.* 443.

Caryophyllus ſimplex ſupinus latifolius. *Pin.* 208.

*—idem flore rubro dilutiori.

3. DIANTHUS floribus compoſitis in capitulum ovatum, ſquamis calycinis ovatis obtuſis maximis. *hort. cliff.* 165. *fl. leyd. prodr.* 444.

Caryophyllus ſylveſtris prolifer. *Pin.* 209.

*—idem flore albo. *I. R. H.* 333.

4. DIANTHUS floribus aggregatis, ſquamis calycinis lanceolatis longitudine tubi. *hort. cliff.* 165. *act. ſtock.* 1741. 192. *fl. ſuec.* 345. *fl. leyd. prodr.* 443.

Caryophyllus barbatus ſylveſtris. *Pin.* 209.

1. SAPONARIA foliis ovato-lanceolatis, calycibus cylindraceis. *hort. cliff.* 165. *fl. leyd. prodr.* 444.

Lychnis ſylveſtris, quæ Saponaria vulgò. *I. R. H.* 336. SAVONNIERE.

*—ead. flore albo.

*—ead. flore pleno. *I. R. H.*

2. SAPONARIA calycibus pentaphyllis, corollis crenato-emarginatis, foliis subulatis. *fl. succ.* 347.

*—foliis linearibus. *fl. lapp.* 171.

Lychnis annua minima, flore carneo lineis purpureis distincto. *I. R. H.* 338.

3. SAPONARIA foliis ovatis acuminatis sessilibus, calycibus pyramidatis angulosis. *hort. cliff.* 166. *fl. leyd. prodr.* 444.

Lychnis segetum rubra, foliis perfoliatæ. *Pin.* 204.

*—segetum, foliis perfoliatæ, flore albo. *hort.* JONCQ.

1. SCLERANTHUS calycibus fructûs clausis. *fl. suec.* 349.

Alchimilla gramineo folio, majore flore. *I. R. H.* 508. *variet. sequent. n.* 2. *ex hort. cliff.*

2. SCLERANTHUS calycibus fructûs patulis. *fl. suec.* 348.

* Scleranthus. *hort. cliff.* 166. *fl. leyd. prodr.* 215.

Alchimilla supina gramineo folio, minore flore. *I. R. H.* 508.

*—erecta gramineo folio, minore flore. *I. R. H.* 508. Knawel germanorum.

1. SAXIFRAGA foliis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulosâ. *hort. cliff.* 167. *fl. suec.* 350. *fl. leyd. prodr.* 453.

Saxifraga rotundifolia alba. *Pin.* 309. SAXIFRAGE.

2. SAXIFRAGA foliis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. *fl. suec.* 353.

*—foliis trilobis basi angustis, caule erecto. *fl. lapp.* 173. *hort. cliff.* 168. *fl. leyd. prodr.* 457.

Saxifraga verna annua humilior. *I. R. H.* 252.

TRIGYNIA.

1. CUCUBALUS caule ramoso, floribus trigynis, fructu colorato globoso. *hort. cliff.* 170. *fl. leyd. prodr.* 448.

Cucubalus Plinii. *lugd. hist.* 1429.

2. CUCUBALUS floribus hermaphroditis pentagynis, capsulis unilo-

cularibus, calycibus angulatis. *hort. cliff.* 170. *fl. suec.* 362. *fl. leyd. prodr.* 448.

Lychnis sylvestris alba simplex. *Pin.* 204.

*——ead. semine vidua.

*——ead. petalis dissectis.

3. CUCUBALUS calycibus subovatis glabris reticulato venosis, capsulis trilocularibus. *fl. suec.* 360.

*——floribus trigynis, calycibus glabris, capsulis trilocularibus. *hort. cliff.* 170. *fl. leyd. prodr.* 448.

*——calycibus ovatis, hermaphroditus. *fl. lapp.* 180.

Lychnis sylvestris quæ Behem album vulgò. *Pin.* 205.

*——ead. foliis angustioribus & acutioribus. *Pin.*

*——ead. flore pleno. *I. R. H.*

a.——ead. foliis hirsutis. *hort. Edimb. ex hort. cliff.*

4. CUCUBALUS calycibus conicis striatis. *hort. cliff.* 171. *fl. leyd. prodr.* 448.

Lychnis sylvestris latifolia, cali-

culis turgidis ſtriatis. *Pin.* 205.
*—ead. anguſtifolia. *Pin.* 204.

1. SILENE foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus, calyce ſtriato, corollâ involutâ. *hort. cliff.* 171. *fl. ſuec.* 366. *fl. leyd. prodr.* 446.

Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. *Pin.* 205.

2. SILENE floribus dioicis, petalis ſetaceis ſimpliciſſimis. *hort. cliff.* 272. *fl. leyd. prodr.* 445. *ex Hall. Helv.* 375.

*—floribus dioicis, foliis lineari-lanceolatis. *obſ. pl.* 294.

Lychnis viſcoſa, flore muſcoſo minor. *hort. reg. par.*

*—ead. ſemine vidua.

α. Lychnis viſcoſa flore muſcoſo. *Pin.* 206. *ex Hall. Helv.* 375.

3. SILENE hirſuta, foliis ſeſſilibus oblongo-cuneiformibus obtuſis, calycibus ſtriatis, fructibus erectis alternis.

Lychnis ſylveſtris hirſuta annua, flore minore carneo. *hiſt. ox.* 2. 541.

*——ead. flore albo.

4. SILENE floribus pentagynis, capsulis quinquelocularibus. *hort. cliff.* 172. *fl. suec.* 364. *fl. leyd. prodr.* 445.

Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia. *Pin.* 205.

1. ALSINE foliis cordatis, floribus pentagynis. *fl. suec.* 370.

Alsine altissima nemorum. *Pin.* 250. MORGELINE. *variet. subsequent. n.* 5. *ex hort. cliff. & fl. lapp.*

*——maxima solanifolia. *mentz. pug. tab.* 2.

2. ALSINE foliis ex ellipticis acuminatis, petalis bipartitis. *Hall. Helv.* 385.

Alsine hyperici folio. *Vaill. I. R. H.* 242.

3. ALSINE foliis lanceolatis serrulatis. *fl. suec.* 371. *hort. cliff.* 172. *fl. leyd. prodr.* 449.

Alsine pratensis, gramineo folio ampliore. *I. R. H.* 243.

4. ALSINE foliis linearibus integerrimis. *fl. suec.* 372. *hort. cliff.*

172. *fl. lapp.* 187. *fl. leyd. prodr.* 449.

Alsine pratensis gramineo folio angustiore. *I. R. H.* 243.

*——eadem florifera & non fructifera. *Vaill.*

a. Alsine qui Caryophyllus holostius arvensis medius. *Rai. syn.* 207. *ex fl. suec.*

5. ALSINE foliis ovato-cordatis, floribus trigynis. *fl. suec.* 369. *hort. cliff.* 173. *fl. lapp.* 186. *fl. leyd. prodr.* 449.

Alsine media. *Pin.* 250.

*——ead. acutiori minori folio crispo. *hort. cath.*

1. ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *fl. suec.* 374. *hort. cliff.* 173. *fl. leyd. prodr.* 451.

Alsine Plantaginis folio. *Bauh. hist.* 3. 363.

2. ARENARIA foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. *fl. suec.* 373.

*——foliis subovatis acutis sessilibus. *hort. cliff.* 173. *fl. leyd. prodr.* 451.

Alsine minor multicaulis. *Pin.* 250.

3. ARENARIA foliis subulatis, calycinis laciniis membranâ ipsis angustiori auctis acutissimis. *obs. pl.* 282.

Alsine tenuifolia. *Bauh. hist.* 3. 364.

a. Alsine tenuifolia, pediculis florum longissimis. *bot. par.* 8.

4. ARENARIA foliis subulatis, calycinis laciniis membranâ ipsis latiori auctis, obtusis. *obs. pl.* 281.

Alsine saxatilis & multiflora, capillaceo folio. *I. R. H.* 243.

5. ARENARIA foliis lineari-lanceolatis sessilibus, corollis calyce longioribus.

Alsine saxatilis, Juniperi folio. *bot. par.*

* Lychnis saxatilis pumila, juniperi folio. *I. R. H.* 339.

6. ARENARIA foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *fl. suec.* 376.

——foliis linearibus longitudine in-

vernodiorum. *hort. cliff.* 173. *fl. leyd. prodr.* 451.

Alsine Spergulæ facie, minor. *Pin.* 251.

PENTAGYNIA.

1. SPERGULA foliis oppositis, pedunculis simplicibus. *fl. suec.* 378. *hort. cliff.* 173. *obs. pl.* 298.

Alsine arenaria dicta. *Cat. hort. Amst.* 16.

2. SPERGULA foliis verticillatis, pedunculis dichotomis. *fl. suec.* 377.

*—foliis stellatis, pedunculis dichotomis. *hort. cliff.* 173. *fl. leyd. prodr.* 451.

*—fructu pendulo. *fl. lapp.* 190.

Alsine Spergula dicta major. *Pin.* 251.

3. SPERGULA foliis filiformibus, unum latus spectantibus, stipulis membranaceis vaginantibus, pedunculis umbellatis. *obs. pl.* 299.

Alsine segetalis gramineis foliis unum latus spectantibus. *bot. par. tab.* 3. *fig.* 3.

4. SPERGULA foliis oppositis, pedunculis umbellatis *obs. pl.* 298.

Alsine verna glabra, floribus umbellatis albis. *I. R. H.* 242.

5. SPERGULA quæ Alsine Spergulæ facie minima, seminibus marginatis. *I. R. H.* 244.

1. CERASTIUM foliis linearilanceolatis obtusis, corollis calyce majoribus. *fl. suec.* 381.

*——foliis calycibusque hirsutis. *hort. cliff.* 174. *fl. leyd. prodr.* 450.

Myosotis arvensis hirsuta, flore majore. *I. R. H.* 245. OREILLE DE SOURIS.

2. CERASTIUM perenne procumbens. *hort. cliff.* 174.

Myosotis arvensis, Polygoni folio. *I. R. H.* 245.

3. CERASTIUM erectum villoso-viscosum. *hort. cliff.* 174. *fl. suec.* 379. *fl. leyd. prodr.* 450.

*——corollâ calyci æquali. *fl. lapp.* 193.

Myosotis hirsuta altera viscosa. *I. R. H.* 245.

a. Myosotis hirsuta minor. *I. R. H.* 245. *ex bot. par.* 142.

4. CERASTIUM floribus pentandris, petalis emarginatis. *hort. cliff.* 173. *fl. suec.* 382. *fl. leyd. prodr.* 450.

*——corollâ calyce breviore. *fl. lapp.* 193.

Myosotis arvensis hirsuta, parvo flore. *I. R. H.* 245.

1. AGROSTEMA. *hort. cliff.* 175. *fl. suec.* 383. *fl. leyd. prodr.* 449.

Lychnis segetum major. *Pin.* 204. Nielle des Bleds.

*——ead. flore dilutiore, vel albo.

1. LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu subrotundo. *hort. cliff.* 174. *fl. suec.* 384. *fl. leyd. prodr.* 449.

Lychnis pratensis, flore laciniato simplici. *hist. ox.* 2. 537.

*——ead. flore laciniato simplici suave rubente. *I. R. H.* 336.

*——ead. flore laciniato simplici albo. *I. R. H.* 336.

*——ead. flore laciniato pleno, amplo purpureo. *I. R. H.* 336.

1. OXALIS scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamoso-articulatâ.

hort. cliff. 175. *fl. fuec.* 385. *fl. leyd. prodr.* 458.

Oxys flore albo. *I. R. H.* 88. ALLELUIA.

1. SEDUM foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, paniculâ ramosâ. *hort. cliff.* 177. *fl. fuec.* 387. *fl. leyd. prodr.* 457.

Sedum minus teretifolium album. *Pin.* 283. JOUBARBE.

a. Sedum arvense, flore rubente. *Pin.* 283. *ex obs. pl.* 100.

2. SEDUM foliis planis, caule & pedunculo ramosis, floribus lateralibus. *fl. leyd. prodr.* 456.

*——foliis planis caule ramoso, floribus ex alis, pedunculo ramoso. *hort. cliff.* 176.

Sedum cepæa dictum. *hort. lugd. bat.*

3. SEDUM foliis subulatis oppositis confertis adnatis, basi membranaceâ solutâ, umbellâ racemosâ. *hort. cliff.* 176. *fl. leyd. prodr.* 456.

Sedum minus luteum, folio acuto. *Pin.* 283. TRIQUE-MADAME ou TRIPE-MADAME.

3. Sedum minus luteum, ramulis inflexis. *Pin.* 283. *ex hort. cliff.*

4. SEDUM foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, racemo triplici. *hort. cliff.* 177. *fl. ſuec.* 389. *fl. leyd. prodr.* 456.

Sedum parvum acre, flore luteo. *Bauh. hiſt.* 3. 694. VERMICULAIRE.

5. SEDUM foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis verticillatis, racemo florifero triplici. *obſ. pl.* 99.

Sedum minimum luteum non acre. *Bauh. hiſt.* 3. 695.

*——minus lato & craſſo caule, Portlandicum Belgarum. *hort. reg. par.*

6. SEDUM foliis planiuſculis patentibus ſerratis, corymbo terminatrice. *fl. ſuec.* 386. *hort. cliff.* 176. *fl. leyd. prodr.* 456.

Anacampſeros purpurea. *Bauh. hiſt.* 3. 682. ORPIN.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

1. ASARUM foliis ſubcordatis petiolatis. *hort. cliff.* 178. *fl. ſuec.* 392. *fl. leyd. prodr.* 207.

Aſarum. *Dod. pempt.* 358. *Pin.* 197. CABARET.

1. LYTHRUM foliis oppoſitis. *hort. cliff.* 178. *fl. ſuec.* 393. *fl. leyd. prodr.* 458.

*—foliis oblongis acutis, floribus verticillatis. *fl. lapp.* 197.

Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. *I. R. H.* 253. SALICAIRE.

*—ead. foliis ternis.

*—ead. foliis alternatim diſpoſitis.

2. LYTHRUM foliis alternis. *hort. cliff.* 178. *fl. leyd. prodr.* 458.

Salicaria hyſſopi folio latiore. *I. R. H.* 253.

*—ead. folio anguſtiore. *I. R. H.* 253.

DIGYNIA.

1. AGRIMONIA foliis omnibus pinnatis, fructibus hiſpidis. *fl. ſuec.* 394. *hort. cliff.* 179. *fl. leyd. prodr.* 240.

Agrimonia officinarum. *I. R. H.* 301. AIGREMOINE.

a. Agrimonia odorata. *cam. hort. ex hort. cliff.*

POLYGYNIA.

1. SEMPERVIVUM foliis radicalibus carnoſis, caulinis imbricatis membranaceis, corymbo cacemoſo reflexo. *hort. cliff.* 179. *fl. ſuec.* 395. *fl. leyd. prodr.* 457.

Sedum majus vulgare. *Pin.* 283. GRANDE JOUBARBE.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

1. PRUNUS ſpinoſa, foliis lanceo-

latis. *hort. cliff.* 186. *fl. ſuec.* 397. *fl. leyd. prodr.* 368.

Prunus ſylveſtris. *Pin.* 444. PRUNELLIER.

*——eadem foliis ex albo & viridi variegatis.

*——ead. glaucophyllos.

2. PRUNUS inermis, foliis lanceolato-ovatis. *hort. cliff.* 186. *fl. leyd. prodr.* 268.

Prunus ſylveſtris, fructu majore. *bot. par.* 165. PRUNIER.

a. Prunus ſylveſtris, fructu rotundo albo majore. *bot. par.* 165. *ex hort. cliff.*

1. CERASUS foliis ovatis. *virid. cliff.* 43. *fl. leyd. prodr.* 268.

Ceraſus ſylveſtris amara Mahaleb putata. *Bauh. hiſt.* 1. 227. CERISIER MAHALEB.

2. CERASUS foliis ovato-lanceolatis. *virid. cliff.* 43. *fl. leyd. prodr.* 267.

Ceraſus ſativa, fructu rotundo rubro & acido. *I. R. H.* 625. CERISIER.

a. Cerasus sativa, fructu majori. *I. R. H.* 625. GRIOTTIER.

b.—sativa major, fructu magno cordato. *Rai. hist.* BIGAROTIER.

c—fructu aquoso. *I. R. H.* 626. GUINIER.

d.—sylvestris fructu nigro. *Bauh. hist.* 1. 220. MERISIER.

Omnes variet. *n.* 2. *ex hort. cliff.*

DIGYNIA.

1. CRATÆGUS foliis ovatis inæqualiter serratis. *hort. cliff.* 187. *fl. suec.* 398. *act. stock.* 1741. 193.

*—inermis, foliis ellipticis serratis transversaliter sinuatis subtùs villosis. *fl. lapp.* 199.

Cratægus folio subrotundo serrato. *I. R. H.* 633. ALISIER.

*—folio subrotundo serrato & laciniato.

2. CRATÆGUS foliis cordatis acutis, lacinulis acutis serratis. *hort. cliff.* 187. *fl. leyd. prod.* 271.

Cratægus folio laciniato. *I. R. H.* 633.

3. CRATÆGUS foliis obtusis bis trifidis. *hort. cliff.* 188. *fl. suec.* 399. *fl. leyd. prodr.* 272.

Mespilus apii folio sylvestris spinosa, sixe oxyacantha. *Pin.* 454. AUBESPINE ou EPINE BLANCHE.

*——ead. foliis eleganter & tenuiter laciniatis.

a. Mespilus sylvestris, foliis trifidis splendentibus. *bot. par. ex vaill. & Hall. Helv.* 355.

TRIGYNIA.

1. SORBUS foliis pinnatis. *hort. cliff.* 188. *fl. suec.* 400. *fl. leyd. prodr.* 272.

Sorbus aucuparia. *Bauh. hist.* 1. 62. SORBIER.

a. Sorbus sativa. *Pin.* 415. CORMIER. *ex hort. cliff.*

PENTAGYNIA.

1. MESPILUS foliis lanceolatis integerrimis, subtùs tomentosis, calycibus fructûs prominentibus. *virid. cliff.* 44. *fl. leyd. prodr.* 270.

*—foliis lanceolatis integerrimis subtùs tomentosis, calycibus acuminatis. *hort. cliff.* 189.

Mespilus germanica, folio laurino non serrato, sive Mespilus sylvestris. *Pin.* 453. NEFLIER.

*—italica, folio laurino non serrato. *Pin.*

2. MESPILUS inermis, foliis ovatis serratis acutis. *hort. cliff.* 189. *fl. leyd. prodr.* 271.

Mespilus folio rotundiori, fructu nigro subdulci. *I. R. H.* 642. Diospyros. *Bauh. hist.* AMELANCHIER.

* Cratægus fructu nigro. *bot. par.* 43.

1. PYRUS foliis serratis, pomis basi productis. *hort. cliff.* 190. *fl. suec.* 401. *fl. leyd. prodr.* 266.

Pyrus sylvestris. *Pin.* 439. POIRIER.

a. Pyrus sativa. *Pin.* 439.
b. Pyrus sativa, foliis tomentosis & incanis. } *ex hort. cliff.*

2. PYRUS foliis serratis, pomis basi concavis. *hort. cliff.* 189. *fl. suec.* 402. *fl. leyd. prodr.* 266.

Malus sylvestris, fructu valdè acerbo. *I. R. H.* 634. POMMIER.

a. Malus acido fructu, sylvestris. *hort. reg. par. ex hort. cliff.*

1. FILIPENDULA foliis pinnatis, foliolis uniformibus. *hort. cliff.* 191. *fl. suec.* 404. *fl. leyd. prodr.* 277.

Filipendula vulgaris, an Molon Plinii. *Pin.* 163. FILIPENDULE.

2. FILIPENDULA foliis pinnatis, foliolo impari trifido. *fl. suec.* 405.

*—foliolo impari majore trifido. *fl. lapp.* 201. *hort. cliff.* 191. *fl. leyd. prodr.* 277.

Ulmaria. *clus. hist.* 2. 198. REINE DES PRE'S.

POLIGYNIA.

1. ROSA caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis. *fl. suec.* 406.

Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. *Pin.* 483. ROSIER. EGLANTIER.

*—cad. flore albo.

2. ROSA

2. ROSA foliis subtùs rubiginosis & odoratis. *Hall. Helv.* 350.

Rosa sylvestris foliis odoratis. *Pin.* 483.

a. Rosa vulgaris sylvestris, folio subtùs villoso, flore albo. *bot. par. ex Vaill. & Hall.*

3. ROSA foliis & rotundo fructu lævibus, calicis foliis divisis, albo flore. *Hall. Helv.* 349.

Rosa sylvestris altera, flore albo, nostras. *Rai. hist.* 1471.

*——arvensis candida. *Pin.* 484.

4. ROSA caule petiolisque aculeatis, calycibus indivisis. *fl. suec.* 407.

* Rosa calicis foliolis indivisis, pomo globoso. *Hall. Helv.* 347.

Rosa campestris spinosissima, flore albo odoro. *Pin.* 483.

5. ROSA foliis utrinque villosis, fructu spinoso. *Hall. Helv.* 350.

Rosa sylvestris fructu hispido oblongo rubro. *bot. par.*

6. ROSA sylvestris, foliis carinatis, subtùs scabris; an Rosa campes-

tris repens alba ? *Pin.* 484.

7. ROSA lutea ſimplex. *Pin.* 483.

8. ROSA alba vulgaris major. *Pin.* 482.

1. RUBUS foliis quinato-digitatis ternatiſque, caule petioliſque aculeatis. *fl. ſuec.* 409.

*——caule aculeato, foliis ternatis ac quinatis. *hort. cliff.* 192. *fl. leyd. prodr.* 273. *fl. virg.* 163.

Rubus vulgaris ſive Rubus fructu nigro. *Pin.* 479. RONCE.

*——idem flore albo. *hort. reg. monſp.*

*——idem flore albo ſemipleno.

*——montanus repens, ſarmentis rotundis ſpinis minutiſſimis munitis, foliis rotundis utrinque lanatis ſupernè cinereis infernè candicantibus, flore albo, fructu nigro parvo. *Mich. pl. fl.*

2. RUBUS caule aculeato, foliis ternatis. *hort. cliff.* 192. *fl. ſuec.* 410. *fl. leyd. prodr.* 273. *fl. virg.* 163.

*——caule aculeato reflexo perenni,

foliis ternatis. *fl. lapp.* 205.

Rubus repens, fructu cæsio. *Pin.* 479.

3. RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule hispido. *fl. suec.* 408.

*—caule erecto hispido, foliis ternatis. *fl. lapp.* 204. *hort. cliff.* 192. *fl. leyd. prodr.* 273.

Rubus idæus spinosus. *Pin.* 479. FRAMBOISIER.

1. FRAGARIA flagellis reptans. *hort. cliff.* 192. *fl. suec.* 414. *fl. leyd. prodr.* 274.

Fragaria vulgaris. *Pin.* 326. FRAISIER.

*—ead. fructu albo. *Pin.* 326.

a. Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine. *Pin.* 326. CAPITONT. *ex hort. cliff.* & *fl. suec.*

2. FRAGARIA caule decumbente repente. *fl. leyd. prodr.* 274.

Fragaria sterilis. *Pin.* 326.

a. Fragaria sterilis amplissimo folio & flore, petalis cordatis. *bot. par.*

3. FRAGARIA sterilis foliis sub-

tus incanis, magno flore albo. *bot. ar.* 55.

*—sterilis incana. *hort. reg. par.*

1. POTENTILLA foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris. *fl. suec.* 418.

*—foliis digitatis, longitudinaliter patenti-serratis, caule repente. *hort. cliff.* 194. *fl. virg.* 163. *fl. leyd. prodr.* 275.

Quinquefolium majus repens. *Pin.* 325. QUINTEFEUILLE.

2. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acutè incisis, caulinis ternatis, caule declinato. *fl. suec.* 419.

*—foliis quinatis incisis, caule declinato. *virid. cliff.* 45. *fl. leyd. prodr.* 276.

*—foliis quinatis incisis, caule assurgente. *fl. lapp.* 212. *hort. cliff.* 194.

Quinquefolium minus repens luteum. *Pin.* 335.

3. POTENTILLA foliis digitatis, caule erecto corymboso. *fl. suec.* 417.

*—foliis digitatis inciso-serratis, caule recto. *hort. cliff.* 193. *fl. leyd. prodr.* 275.

Quinquefolium folio argenteo. *Pin.* 325.

a. Quinquefolium rectum luteum. *Pin.* 325. *ex hort. cliff. & fl. leyd.*

4. POTENTILLA foliis pinnatis oppositis, caule dichotomo. *hort. cliff.* 193. *fl. leyd. prodr.* 275.

Pentaphylloides supinum. *Bauh. hist.* 2. 398.

5. POTENTILLA foliis pinnatis, caule repente. *fl. lapp.* 210. *hort. cliff.* 193. *fl. suec.* 415. *fl. leyd. prodr.* 275.

Pentaphylloides argenteum alatum, seu potentilla. *I. R. H.* 298. ARGENTINE.

*—viride alatum, seu potentilla.

1. TORMENTILLA. *Cæsalp. syst.* 556. *fl. lapp.* 215. *hort. cliff.* 194. *fl. suec.* 421. *fl. leyd. prodr.* 276.

Tormentilla sylvestris. *Pin.* 326. TORMENTILLE.

1. COMARUM. *fl. lapp.* 214.

hort. cliff. 195. *fl. suec.* 422. *fl. leyd. prodr.* 276.

Pentaphylloides paluſtre rubrum. *I. R. H.* 298.

1. GEUM floribus erectis, fructu globoſo, ſeminum caudâ uncinatâ nudâ. *hort. cliff.* 195. *fl. ſuec.* 423. *fl. leyd. prodr.* 276.

Caryophyllata vulgaris. *Pin.* 321. BENÒITE.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

1. NYMPHÆA calyce tetraphyllo, corollâ multiplici. *fl. lapp.* 219. *hort. cliff.* 203. *fl. ſuec.* 427. *fl. leyd. prodr.* 480.

Nymphæa alba major. *Pin.* 195. NENUPHAR.

2. NYMPHÆA calyce magno pentaphyllo. *fl. lapp.* 218. *hort. cliff.* 203. *fl. ſuec.* 426. *fl. leyd. prodr.* 480.

Nymphæa lutea major. *Pin.* 195.

1. PAPAVER foliis pinnatifidis hiſpidis, fructu ovato. *hort. cliff.* 201. *fl. ſuec.* 428. *fl. leyd. prodr.* 479.

*—foliis pinnatifidis, fructu ovato, capitello à decem uſque ad ſexdecim radiis donato. *obſ. pl.* 273.

Papaver erraticum majus Rhæas Dioſcoridi, Theophr. & Plinio. *Pin.* 171. PAVOT. COQUELICOC.

*—idem flore albo vel carneo. *Pin. a.* Papaver erraticum majus, floribus minoribus abſque maculis. *Rai. hiſt.* 855. *ex obſ. pl.*

2. PAPAVER foliis pinnatifidis, fructu conico, capitello à ſex uſque ad novem radiis donato. *obſ. pl.* 273.

Papaver erraticum, capitulo longiſſimo glabro. *I. R. H.* 238.

3. PAPAVER foliis pinnatifidis, fructu oblongo capitello ab octo uſque ad decem radiis donato. *obſ. pl.* 274.

Papaver erraticum, capite oblongo hiſpido. *I. R. H.* 238.

4. PAPAVER capsulis hispidis oblongo-turbinatis sulcatis. *fl. suec.* 429.

*——foliis ternato-pinnatifidis, fructu angulato. *hort. cliff.* 201. *fl. leyd. prodr.* 479.

*——foliis pinnatifidis, fructu conico, capitello radiis sex donato. *obs. pl.* 274.

Papaver erraticum capite longiore hispido. *I. R. H.* 238.

1. CHELIDONIUM pedunculis multifloris. *hort. cliff.* 201. *fl. suec.* 430. *fl. leyd. prodr.* 478.

Chelidonium majus vulgare. *Pin.* 144. CHE'LIDOINE, ou ECLAIRE.

a. Chelidonium majus foliis quernis. *Pin.* 144. *ex hort. cliff.*

2. CHELIDONIUM pedunculis unifloris. *hort. cliff.* 201. *fl. leyd. prodr.* 478.

Glaucium flore luteo. *I. R. H.* 254. PAVOT CORNU.

1. ACTÆA. *hort. cliff.* 202. *fl. suec.* 431. *fl. leyd. prodr.* 480.

*——caule inermi. *fl. lapp.* 217.

Chriſtophoriana vulgaris noſtras racemoſa & ramoſa. *hiſt. ox.* 2. 8. HERBE DE SAINT CHRISTOFLE.

1. TILIA. *Cæſalp. ſyſt.* 40. *Dod. pempt.* 838. *hort. cliff.* 204. *fl. ſuec.* 432. *fl. leyd. prodr.* 477.

Tilia fœmina, folio majore. *Pin.* 426. TILLEUL.

a. Tilia fœmina, folio minore. *Pin.* 426.

1. EUPHORBIA inermis, foliis lanceolatis, umbellâ univerſali multifidâ: partialibus dichotomis: involucris ſemibifidis perfoliatis. *hort. cliff.* 199. *fl. leyd. prodr.* 197.

Tithymalus ſylvaticus, lunato flore. *Pin.* 290. TITIMALE.

*——idem foliis ex albo & viridi variegatis.

*——idem foliis punctis croceis notatis.

2. EUPHORBIA foliis lanceolatis, umbellâ univerſali multifidâ polyphyllâ, partialibus trifidis triphyllis, propriis dichotomis. *hort. cliff.* 200. *fl. ſuec.* 438. *fl. leyd. prodr.* 198.

Tithymalus paluſtris fruticoſus. *Pin.* 290.

3. EUPHORBIA quæ Tithymalus Lithoſpermi majoris folio. *bot. monſp. app.*

*——characias, radice repente. *hort. reg. par.*

4. EUPHORBIA quæ Tithymalus foliis ad caulem ſubhirſutis ellipticis brevibus, ſub floribus binis cordatis, capſularum mediâ parte verrucosâ. *Hall. Helv.* 190.

Tithymalus montanus non acris. *Pin.* 292.

5. EUPHORBIA inermis, foliis linearibus, umbellâ univerſali trifidâ triphyllâ, partialibus trifidis, propriis dichotomis diphyllis, foliolis ſubrotundis. *obſ. pl.* 263.

Tithymalus myrſinites, fructu verrucæ ſimili. *Pin.* 291.

6. EUPHORBIA inermis, foliis ſeſſilibus oblongo-ovatis, umbellâ univerſali trifidâ triphyllâ, partialibus & propriis dichotomis diphyllis, foliolis ovatis.

Tithymalus amygdaloides latifolius. *tab. icon.* 590.

7. EUPHORBIA inermis, foliis confertis linearibus, umbellâ universali multifidâ, partialibus dichotomis, foliolis subrotundis. *hort. cliff.* 199. *fl. leyd. prodr.* 597.

Tithymalus amygdaloides angustifolius. *tab. icon.* 590.

8. EUPHORBIA inermis, foliis linearibus, umbellâ universali multifidâ, partialibus dichotomis, foliolis subrotundis. *obs. pl.* 262.

Tithymalus Cypariſſias. *Pin.* 291.

*—idem capitulo rubente. *Pin.* 291.

*—idem foliis punctis croceis notatis, major. *Pin.*

*—idem foliis punctis croceis notatis, minor. *Pin.*

9. EUPHORBIA inermis, foliis oppoſitis lanceolatis, umbellâ universali trifidâ polyphyllâ, partialibus triphyllis, reliquis diphyllis. *hort. cliff.* 198. *fl. leyd. prodr.* 196.

Tithymalus latifolius cataputia dictus. *hort. l. bat.* EPURGE.

10. EUPHORBIA inermis, foliis lanceolatis, umbellâ universali partialiumque primâ quinquefidis, secundâ triphyllâ, reliquis bifidis. *fl. leyd. prodr.* 198.

Tithymalus arvensis latifolius germanicus. *Pin.* 291.

*——salicis folio tenuissimè serrato & villoso. *I. R. H.* 86.

11. EUPHORBIA foliis crenatis, umbellâ universali quinquefidâ pentaphyllâ, partialibus trifidis, propriis triphyllis. *hort. cliff.* 198.

*——inermis, foliis subrotundis crenatis. *fl. lapp.* 220.

Tithymalus helioscopius. *Pin.* 291. RE'VEILLE-MATIN.

12. EUPHORBIA foliis obversè ovatis integerrimis, umbellâ universali trifidâ triphyllâ: partialibus dichotomis diphyllis. *hort. cliff.* 199. *fl. leyd. prodr.* 197. *fl. suec.* 437.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis. *hort. l. bat.*

13. EUPHORBIA inermis, foliis sessilibus alternis linearibus, umbellâ

universali trifidâ triphyllâ: partialibus dichotomis diphyllis. *hort. cliff.* 199. *fl. leyd. prodr.* 197.

Tithymalus sive Esula exigua. *Pin.* 291.

*—idem foliis obtusis. *Pin.* 291.

*—exiguus saxatilis. *Pin.* 291.

1. CISTUS stipulis quaternis, foliis oblongis utrinque nudis, caule procumbente. *hort. cliff.* 206. *fl. suec.* 433. *fl. leyd. prodr.* 476.

* Helianthemum foliis oblongis, stipulis quaternis. *obs. pl.* 182.

Helianthemum vulgare, flore luteo. *Bauh. hist.* 2. 15. HE'LIANTEME.

*—vulgare, flore dilutiore. *I. R. H.* 248.

*—vulgare, flore albo.

a. Helianthemum foliis majoribus, flore albo. *Bauh. hist.* 2. 16. *ex obs. pl.*

2. CISTUS qui Helianthemum majoranæ folio, capitulis valdè hirsutis. *hot. par.* 96.

3. CISTUS caule procumbente, foliis alternis. *fl. suec.* 435.

*Helianthemum foliis linearibus ſæpiùs alternis non ſtipulatis, pedunculis unifloris, caule lignoſo. *obſ. pl.* 180.

Helianthemum tenuifolium glabrum, luteo flore, per humum ſparſum. *Bauh. hiſt.* 2. 18.

4. CISTUS foliis oblongo-acuminatis non ſtipulatis, caule florali racemoſo, *obſ. pl.* 181.

Helianthemum flore maculoſo. *Col. part.* 2. 77.

5. CISTUS foliis linearibus non ſtipulatis, caule florali umbellato lignoſo. *obſ. pl.* 180.

Helianthemum foliis Thymi, floribus umbellatis. *I. R. H.* 250.

1. PORTULACA foliis cuneiformibus ſeſſilibus. *fl. leyd. prodr.* 473.

*——foliis cuneiformibus verticillatis ſeſſilibus, floribus ſeſſilibus. *hort. cliff.* 207.

Portulaca anguſtifolia, ſive ſylveſtris. *Pin.* 288. POURPIER.

TRIGYNIA.

1. RESEDA foliis omnibus trifidis : inferioribus laciniatis. *hort. cliff.* 212. *fl. leyd. prodr.* 483.

Reseda vulgaris. *Pin.* 100. HERBE MAURE.

*—crispa gallica. *Bocc. Rar. pl.* 76.

2. RESEDA foliis integris trilobisve, calycibus maximis. *hort. cliff.* 212. *fl. leyd. prodr.* 483.

Reseda minor vulgaris. *I. R. H.* 428.

3. RESEDA foliis simplicibus lanceolatis integris. *hort. cliff.* 212. *fl. suec.* 439. *fl. leyd. prodr.* 483.

Luteola herba salicis folio. *Pin.* 100. GAUDE.

1. DELPHINIUM caule subdiviso, nectariis monophyllis. *hort. cliff.* 212. *fl. suec.* 440. *fl. leyd. prodr.* 482.

Delphinium segetum, flore cæruleo. *I. R. H.* 426. PIE' D'ALOUETE.

*—segetum, flore albo.

*—segetum, flore dilutiùs rubente. *I. R. H.*

*—segetum elatius, flore pleno, variegatum Swert. 9.

1. PENTAGYNIA.

1. AQUILEGIA nectariis incurvis. *Hort. Upl. 152.*

* —— 1. AQUILEGIA. *hort. cliff.* 215. *fl. suec.* 443. *fl. leyd. prodr.* 182.

Aquilegia officinarum sylvestris. *Pin.* 144. ANCOLIE.

1. NIGELLA flore foliis nudo, pistillis corollam æquantibus. *hort. cliff.* 215. *fl. leyd. prodr.* 481.

Nigella arvensis cornuta. *Pin.* 145. NIELLE.

POLYGYNIA.

1. PULSATILLA foliis decompositis pinnatis, flore nutante, limbo erecto. *hort. cliff.* 223. *fl. suec.* 446. *fl. leyd. prodr.* 487.

Pulsatilla folio crassiore, & majore flore. *Pin.* 177. PULSATILLE. COQUELOURDE.

*—flore dilutiore.

*—flore violaceo duplici fimbriato *hort. reg. par.*

1. ANEMONE seminibus acutis; foliolis incisis, petalis subrotundis, caule sæpiùs bifloro. *hort. cliff.* 225. *fl. suec.* 451. *fl. leyd. prodr.* 488.

Ranunculus nemorosus luteus. *Pin.* 178. SYLVIE.

2. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro. *hort. cliff.* 224. *fl. suec.* 450. *fl. leyd. prodr.* 488.

Ranunculus phragmites albus vernus. *Bauh. hist.* 3. 412.

*—phragmites purpureus vernus. *Bauh. hist.* 3. 412.

3. ANEMONE foliolis ovatis integris serratis. *hort. cliff.* 224. *fl. leyd. prodr.* 488.

Ranunculus nemorosus trifolius. *hort. l. bat.*

1. CLEMATIS foliis pinnatis, foliolis cordatis inæqualiter incisoserratis. *hort. cliff.* 225. *fl. leyd. prodr.* 486.

Clematitis sylvestris latifolia. *Pin.*

300. HERBE AUX GUEUX.
*——ead. foliis non inciſis. *I. R. H.* 293.

1. THALICTRUM caule folioſo ſulcato, paniculâ multiplici erectâ. *hort. cliff.* 226. *fl. ſuec.* 453. *fl. leyd. prodr.* 485.

Thalictrum majus ſiliquâ angulosâ aut ſtriatâ. *Pin.* 336.

2. THALICTRUM caule folioſo ſulcato, foliolis linearibus carnoſis.

Thalictrum minus alterum Pariſienſium, foliis craſſioribus & lucidis. *hort. reg. par.*

3. THALICTRUM caule folioſo æquali, foliolis caulinis acutis, paniculâ ſimplici, floribus nutantibus. *fl. ſuec.* 454.

Thalictrum minus. *Pin.* 337.

*——montanum minus, foliis latioribus. *Rai. ſyn.*

1. ADONIS radice annuâ. *hort. cliff.* 231. *fl. leyd. prodr.* 488.

Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore phæniceo. *I. R. H.* 291.

a. Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore minore atro rubente. *I. R. H.* 291. *ex hort. cliff.*

b. Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli flore citrino. *I. R. H.* 291.

1. RANUNCULUS foliis lanceolato-linearibus ſeſſilibus, caule erecto. *hort. cliff.* 228. *fl. leyd. prodr.* 289.

Ranunculus montanus, folio gramineo. *Pin* 180. RENONCULE.

2. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto. *hort. cliff.* 228. *fl. ſuec.* 457. *fl. leyd. prodr.* 489.

Ranunculus longifolius paluſtris major. *Pin.* 180. GRANDE DOUVE.

3. RANUNCULUS foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *hort. cliff.* 228. *fl. ſuec.* 458. *fl. leyd. prodr.* 489.

*—foliis ovato-oblongis integerrimis, caule procumbente. *fl. lapp.* 235.

Ranunculus longifolius paluſtris minor. *Pin.* 180. PETITE DOUVE.

*—idem flore ſemipleno.

*——paluſtris ſerratus. *Pin.* 180.

4. RANUNCULUS foliis ovatis petiolatis, floribus ſeſſilibus. *hort. cliff.* 228.

Ranunculus Plantaginis folio, floſculis cauliculis adhærentibus. *bot. par.* 168.

5. RANUNCULUS calycibus paſulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis, ſummis linearibus. *fl. ſuec.* 466.

*——foliis peltatis quinquangularibus multipartitis, laciniis linearibus. *hort. cliff.* 231. (caule multifloro) *fl. leyd. prodr.* 492.

Ranunculus pratenſis erectis acris. *Pin.* 178.

*——idem maculatus. *Pin.* 179.

*——polyanthemos ſimplex. *lob. icon.* 666.

*——polyanthemos duplex.

*——montanus lanuginoſus, foliis Ranunculi pratenſis repentis. *Pin.* 182.

a. Ranunculus magnus valdè hirſutus flore luteo. *Bauh. hiſt.* 3. 417. *ex Hall. Helv.* 325.

6. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, ſtolonibus repentibus, foliis compoſitis. *fl. ſuec.* 468.

*—foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis inciſis, medio productiore, caule multifloro. *hort. cliff.* 230. *fl. leyd. prodr.* 491.

Ranunculus pratenſis repens hirſutus. *Pin.* 179.

*—idem flore ſemipleno.

*—idem foliis ex albo variis. *hort. reg. par.*

a. Ranunculus arvenſis parvus, folio trifido. *Pin.* 179. *ex hort. cliff.*

*—idem flore pleno.

b. Ranunculus rectus, foliis pallidioribus hirſutis. *Bauh. hiſt.* 3. 417. *ex hort. cliff.*

*—idem flore ſemipleno.

c. Ranunculus pratenſis erectus dulcis. *Pin.* 179. *ex hort. cliff.*

*—idem flore ſemipleno.

7. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis compoſitis. *fl. ſuec.* 469.

*—radice simplici subglobosâ. *hort. cliff.* 230. *fl. leyd. prodr.* 491.
*—bulbosus. *lob. hist.* 380. *fl. lapp.* 229.

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotundâ. *Pin.* 179. BACINET.
*—idem minor. *Pin.* 179.

8. RANUNCULUS calycibus retro flexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis compositis, radice granulosâ. *obs. pl.* 275.

Ranunculus Chærophyllos asphodeli radice. *Pin.* 181.

9. RANUNCULUS seminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. *hort. cliff.* 229. *act. stock.* 1741. *p.* 196. *fl. suec.* 470. *fl. leyd. prodr.* 491.

Ranunculus arvensis echinatus. *Pin.* 181.

10. RANUNCULUS fructu oblongo, foliis inferioribus palmatis, summis digitatis. *hort. cliff.* 230. *fl. suec.* 463. *fl. leyd. prodr.* 490.

Ranunculus palustris, apii folio, lævis. *Pin.* 180.

α. Ranunculus paluſtris, apii folio lanuginoſus. *Pin.* 180. *ex hort. cliff.*

11. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis inciſis, caulinis digitatis linearibus. *hort. cliff.* 229. *fl. ſuec.* 462. *fl. leyd. prodr.* 490.

Ranunculus nemoroſus vel ſylvaticus, folio rotundo. *Pin.* 178.

12. RANUNCULUS foliis cordatis angulatis petiolatis. *fl. ſuec.* 460.

*—foliis cordatis dentatis petiolatis. *hort. cliff.* 229. *fl. leyd. prodr.* 490.

Ranunculus vernus rotundifolius minor. *I. R. H.* 286. PETITE ECLAIRE, ou PETITE SCROPHULAIRE.

*—idem maculatus. *I. R. H.* 286.

*—idem bulbifer.

13. RANUNCULUS foliis ſubrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *hort. cliff.* 231. *fl. leyd. prodr.* 492.

Ranunculus aquaticus hederaceus,

flore albo parvo. *I. R. H.* 286. GRENOUILLETTE.

14. RANUNCULUS foliis omnibus capillaceis circumscriptione oblongis. *fl. leyd. prodr.* 492.

Ranunculus aquatilis albus fluitans, Peucedani foliis. *hort. lugd. bat.*

15. RANUNCULUS foliis submersis capillaceis. *fl. suec.* 472.

*—foliis omnibus capillaceis circumscriptione rotundis. *hort. cliff.* 231. *fl. leyd. prodr.* 492. *Hall. Helv.* 328.

Ranunculus albus, circinatis tenuissimè divisis foliis, floribus ex alis, longis pediculis innixis. *Pluk. Phytogr.*

a. Ranunculus foliis inferioribus capillaceis, superioribus peltatis. *fl. lapp.* 234. *fl. leyd. prodr.* 492. *ex fl. suec.*

Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo. *Pin.* 180.

*—idem flore pleno.

b. Ranunculus foliis capillaceis circumscriptione vagâ brevioribus. *Hall. Helv.* 328. *ex fl. suec.*

Ranunculus

Ranunculus aquatilis capillaceus. *Pin.* 180.

1. CALTHA. *fl. lapp.* 227. *hort. cliff.* 228. *fl. ſuec.* 473. *fl. leyd. prodr.* 484. *fl. virg.* 166.

Populago flore majore. *I. R. H.* 273. SOUCI DE MARAIS.

*——flore minore. *I. R. H.*

1. HELLEBORUS caule infernè anguſtato multifolio multifloro, foliis caule brevioribus. *hort. cliff.* 227. *fl. leyd. prodr.* 484.

Helleborus niger fœtidus. *Pin.* 185. ELLE'BORE NOIR.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

1. AJUGA tetragono-pyramidalis. *fl. ſuec.* 475.

Bugula ſylveſtris villoſa, flore cæruleo. *I. R. H.* 209.

*——ead. flore dilutè cæruleo.

*—ead. flore leucophæo.
*—ead. flore intensè purpureo.
*—ead. flore ſuaverubente. *I. R. H.* 209.
*—ead. carneo flore. *cluſ. hiſt.* 43.
*—ead. flore cinereo.
*—ead. flore albo. *I. R. H.* 209.

1. TEUCRIUM foliis obversè-ovatis crenatis, caule ſimpliciſſimo. Stolonibus reptatricibus. *hort. cliff.* 301. *fl. leyd. prodr.* 306.

Bugula. *Dod.* 135. flore violaceo. *Broſſ.* 38. BUGLE.
*—flore cæruleſcente.
*—flore albo. *Broſſ.* 38.
*—flore cinereo vel albo. *I. R. H.* 209.
*—flore ſuaverubente.
*—nervis foliorum luteis.

2. TEUCRIUM foliis ovatis inciſo-crenatis petiolatis, floribus laxè verticillatis. *hort. cliff.* 302. *fl. leyd. prodr.* 307.

Chamædris minor repens. *Pin.* 248. GERMANDRE'E ou PETIT CHESNE.
*—ead. flore albo & rubello in eadem plantâ.

*—ead. flore niveo. *Pin.* 248.

*—ead. flore purpureo pallido. *Bauh. hist.*

3. TEUCRIUM foliis aliquotiès trifidis, floribus verticillatis. *hort. cliff.* 301. *fl. leyd. prodr.* 306.

Chamædrys laciniatis foliis. *lob. icon.* 385.

*—ead. flore albo. *Corn.* 224.

4. TEUCRIUM foliis cordatis crenatis petiolatis, spicis laxis secundis. *hort. cliff.* 301. *fl. leyd. prodr.* 306.

Chamædris fruticosa sylvestris, Melissæ folio. *I. R. H.* 205.

5. TEUCRIUM foliis ovato-lanceolatis serrulatis sessilibus, floribus sæpiùs binatis. *fl. suec.* 476. *hort. cliff.* 302. *fl. leyd. prodr.* 306.

Chamædrys palustris canescens, seu Scordium officinarum. *I. R. H.* 205. GERMANDRE'E D'EAU; ou CHAMARRAS.

6. TEUCRIUM foliis simpliciter trifidis. *hort. cliff.* 301. *fl. leyd. prodr.* 306.

Chamæpytis lutea vulgaris, ſive folio trifido. *Pin.* 249. IVETTE.

7. TEUCRIUM foliis lanceolatis integerrimis petiolatis, ſpicis laxis ſubrotundis. *hort. cliff.* 302. *fl. leyd. prodr.* 305.

Polium Lavandulæ folio. *Pin.* 220.

1. THYMUS floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. *fl. ſuec.* 478.

*——caulibus vix ramoſis, foliis ovatis ſerratis acutis, pedunculis pluribus unifloris. *hort. cliff.* 306. *fl. leyd. prodr.* 325.

Clinopodium arvenſe Ocimi facie, foliis anguſtioribus hirſutiſſimis. *Pin.* 225.

*——idem flore carneo.

*——idem floribus albis. *Pin.* 225.

*——idem foliis anguſtioribus pœnè lævibus. *Pin.* 225.

*——arvenſe, ocimi facie, foliis latioribus. *Pin.* 225.

2. THYMUS floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis ob-

tusis basi ciliatis. *fl. suec.* 477. *obs. pl.* 252.

*—repens foliis planis, floribus verticillato-spicatis. *hort. cliff.* 306. *fl. leyd. prodr.* 325.

Serpillum vulgare minus. *Pin.* 220. SERPOLET.

*—idem floribus purpureis. *fl. bat.* 47.

*—idem floribus rubicundis.

*—idem flore roseo. *Pin.*

*—idem flore candido. *Pin.*

*—capitulis lanuginosis *Pin.*

a. Serpillum vulgare majus. *Pin.* 220. *ex hort. cliff.*

*—idem flore dilutè carneo.

*—idem flore albo.

*—idem flore minore.

*—idem foliis ex albo viridique colore eleganter variegatis. *hist. ox.* 3.

b. Serpillum latifolium hirsutum. *Pin.* 220. *ex obs. pl.*

*—idem flore albo.

c. Serpillum saxatile hirsutum thymifolium nanum, flore purpureo. *bocc. mus. ex obs. pl.*

*—idem flore rubello. *bocc. muſ.*
*—idem flore albo.
*—idem capitulis lanuginoſis.
d. Serpillum foliis Citri odore. *Pin.* 220. *ex hort. cliff.*

1. CLINOPODIUM foliis ovatis, capitulis verticillatis. *hort. cliff.* 305. *fl. ſuec.* 479. *fl. leyd. prodr.* 313.

Clinopodium Origano ſimile. *Pin.* 225.
*—idem flore albo. *Pin.* 225.

1. ORIGANUM foliis ovatis, ſpicis laxis erectis confertis paniculatis. *hort. cliff.* 305. *fl. ſuec.* 480. *fl. leyd. prodr.* 323. *fl. virg.* 65.

Origanum vulgare ſpontaneum. *Bauh. hiſt.* 3. 236. ORIGAN.
*—idem floribus excandido rubentibus.
*—ſylveſtre album. *Pin.* 223.

1. MELISSA floribus ex alis inferioribus ſubſeſſilibus. *hort. cliff.* 307. *fl. leyd. prodr.* 320.

Meliſſa hortenſis. *Pin.* 229. MELISSE.

2. MELISSA floribus ex alis ſu-

perioribus pedunculo communi confertis. *hort. cliff.* 307. *fl. leyd. prodr.* 320.

Calamintha magno flore, vulgaris. *Bauh. hist.* 3. 228. CALAMENT.

3. MELISSA quæ Calamintha vulgaris, exiguo flore. *Pin.* 229.

4. MELISSA floribus ex alis superioribus, pedunculo dichotomo, caule procumbente. *hort. cliff.* 308. *fl. leyd. prodr.* 321.

Calamintha Pulegii odore, sive nepetha. *Pin.* 228.

1. GLECHOMA foliis reniformibus crenatis. *hort. cliff.* 307. *fl. suec.* 483. *fl. leyd. prodr.* 320.

Calamintha humilior, folio rotundiore. *I. R. H.* 194. LIERRE TERRESTRE, ou TERRETTE.

*——ead. flore purpureo. *I. R. H.*

a. Calamintha humilior folio rotundiore, minor & elegantior. *I. R. H.* 194. *ex hort. cliff.*

*——ead. flore purpureo.

b. Calamintha major hirsutior. *bot. par. ex Hall. Helv.* 653.

* Hedera terreſtris montana. *Pin.* 306.

1. SIDERITIS foliis ovato-prælongis, ſupernè crenatis. *obſ. pl.* 235.

Sideritis hirſuta procumbens. *Pin.* 233. CRAPAUDINE.

2. SIDERITIS calycibus ſubinermibus hiſpidis. *fl. ſuec.* 488.

Sideritis quæ alſine Trixaginis folio. *Pin.* 233.

* Marrubiaſtrum vulgare. *I. R. H.* 190.

3. SIDERITIS foliis ovatis & lanceolatis inciſo-ſerratis. *hort. cliff.* 313.

Marrubiaſtrum Cardiacæ folio. *bocc. part.* 2. *t.* 98.

1. NEPETA floribus interruptè ſpicatis pedunculatis. *hort. cliff.* 310. *fl. ſuec.* 486. *fl. leyd. prodr.* 316. *fl. virg.* 65.

Cataria major & vulgaris. *I. R. H.* 202. CATAIRE. HERBE AUX CHATS.

1. BETONICA corollarum laciniâ intermidiâ labii inferioris emarginatâ. *fl. leyd. prodr.* 316. *fl. ſuec.* 487.

Betonica purpurea. *Pin.* 235. BETOINE.

*—flore incarnato. *Volk.* 69.

*—alba. *Pin.* 235.

1. MENTHA spicis confertis, foliis serratis sessilibus. *hort. cliff.* 306. *fl. leyd. prodr.* 325.

Mentha sylvestris rotundiore folio. *Pin.* 227. MENTHE. BAUME.

*—ead. purpureo flore. *bot. monsp.* a. Mentha sylvestris longiore folio. *Pin.* 227. *ex hort. cliff. & obs. pl.* 244.

b. Mentha sylvestris, longioribus nigrioribus & minùs incanis foliis. *Pin.* 227. c. Mentha

2. MENTHA spicis solitariis interruptis, foliis lanceolatis serratis sessilibus. *hort. cliff.* 306. *fl. leyd. prodr.* 325. ex Hort. Upsl.

Mentha angustifolia spicata. *Pin.* 227.

3. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis. *hort. cliff.* 306. *fl. suec.* 482. *fl. leyd. prodr.* 325.

* 1. MENTHA floribus spicatis, foliis oblongis serratis. Hort. Upsl. 168.

Mentha rotundi folia paluſtris, ſeu aquatica major. *Pin.* 227.

3. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutè ſerratis. *hort. cliff.* 307. *fl. ſuec.* 481. *fl. leyd. prodr.* 326.

Mentha arvenſis verticillata hirſuta. *Bauh. hiſt.* 3. 217.

*—ead. flore albo.

4. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis obtuſis vix crenatis. *hort. cliff.* 307. (obſoletè crenatis.) *fl. leyd. prodr.* 326.

Mentha aquatica, ſeu Pulegium vulgare. *I. R. H.* 189. POULIOT.

*—ead. flore carneo.

*—ead. flore albo. *I. R. H.*

1. MELITTIS. *hort. cliff.* 309. *fl. leyd. prodr.* 319.

Meliſſophyllon verum. *Fuchs. hiſt.* 498.

* Meliſſa humilis latifolia, maximo flore purpuraſcente. *I. R. H.* 193.

*—ead. flore albo.

1. LAMIUM foliis cordatis acu-

minatis serratis petiolatis. *hort. cliff.* 314. *fl. suec.* 493. *fl. leyd. prodr.* 319.

Lamium vulgare album, sive Archangelica flore albo. *Park. Theatr.* 604.

*——flore dilutè carneo.

2. LAMIUM foliis cordatis obtusis petiolatis. *hort. cliff.* 314. *fl. suec.* 494. *fl. leyd. prodr.* 319.

Lamium annuum vulgare rubrum. *hist. ox.* 3. 385.

*——annuum vulgare album.

a. Lamium rubrum minus, foliis profundè incisis. *Rai. syn.* 129. *ex hort. cliff.*

3. LAMIUM foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. *hort. cliff.* 314. *fl. suec.* 495. *fl. leyd. prodr.* 319.

Lamium folio caulem ambiente minus. *Pin.* 231.

1. STACHYS foliis oblongo-cordatis, floribus verticillatis. *hort. cliff.* 309. *fl. leyd. prodr.* 317.

Stachys major germanica. *Pin.* 236.

EPI FLEURI.

I. STACHYS verticillorum floscul. quadrangulo caule lanato. Hort. Upf. 170.

*—ead. foliis ternis.

*—ead. flore albo. *Pin.* 236.

* 2. STACHYS foliis lanceolato-ovatis basi emarginatis, verticillis tomentosis. *hort. cliff.* 310. *fl. leyd. prodr.* 317.

Stachys folio obscurè-virente, flore ferrugineo. *hist. ox.*

* Galeopsis alpina, Betonicæ folio, flore variegato. *I. R. H.* 185.

3. STACHYS foliis lanceolatis sessilibus basi attenuatis. *hort. cliff.* 310. *fl. leyd. prodr.* 317.

Sideritis arvensis latifolia glabra. *Pin.* 233.

* Betonica arvensis annua, flore ex albo flavescente. *I. R. H.* 203.

4. STACHYS verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. *fl. suec.* 489.

*—foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus laxè spicatis. *hort. cliff.* 309. *fl. leyd. prodr.* 317.

Galeopsis procerior fœtida spicata. *I. R. H.* 185.

5. STACHYS verticillis sexfloris,

* 2. STACHYS verticillorum floribus duodecim, caule viscoso. Hort. Upsa. 170

foliis lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus. *fl. suec.* 490.
*—foliis lineari-lanceolatis sessilibus basi emarginatis. *hort. cliff.* 309. *fl. leyd. prodr.* 317.
Galeopsis palustris, Betonicæ folio, flore variegato. *I. R. H.* 185.
*—ead. villosissima.
1. GALEOPSIS ramis summis strigosis. *hort. cliff.* 314. *fl. suec.* 491. *fl. leyd. prodr.* 319.
*—corollâ rubrâ aut albâ. *fl. lapp.* 237.
Galeopsis procerior, calyculis aculeatis, flore purpurascente. *I. R. H.* 185.
*—ead. flore variegato.
*—ead. floribus candidis. *I. R. H.* 185.
a. Galeopsis corollâ flavâ, labio inferiore maculato. *fl. lapp.* 237. *ex hort. cliff. & fl. suec.*
*—altera, caliculis aculeatis, flore flavescente. *I. R. H.* 185.
*—ead. flore purpurascente.
2. GALEOPSIS ramis summis

pubescentibus. *hort. cliff.* 314. *fl. suec.* 492. *fl. leyd. prodr.* 319.

Galeopsis patula segetum, flore purpurascente. *I. R. H.* 185.

*——ead. flore dilutissimè purpurascente.

1. BALLOTA foliis cordatis indivisis serratis. *fl. suec.* 484.

* Ballota. *hort. cliff.* 311. *fl. leyd. prodr.* 315.

BALLOTE. *Matth.* 825. MARRUBE NOIR.

*——flore albo. *I. R. H.* 185.

1. MARRUBIUM denticulis calycinis setaceis uncinatis. *hort. cliff.* 312. *fl. leyd. prodr.* 315.

Marrubium album vulgare. *Pin.* 230. MARRUBE.

*——album villosum.

1. LEONURUS foliis caulinis lanceolato-trilobis. *hort. cliff.* 313. *fl. suec.* 496. *fl. leyd. prodr.* 312.

Cardiaca. *Bauh. hist.* 2. 320. AGRIPAUME.

2. LEONURUS foliis ovatis serratis acutis. *hort. cliff.* 313. *fl. suec.*

497. *fl. leyd. prodr.* 312.

Galeopsis sive urtica iners, flore luteo. *Bauh. hist.* 3. 323. ORTIE MORTE.

*—lutea, amplioribus foliis maculatis. *I. R. H.* 186.

1. BRUNELLA bracteis cordatis. *hort. cliff.* 316. *fl. suec.* 498. *fl. leyd. prodr.* 314.

Brunella major, folio non dissecto. *Pin.* 260. BRUNELLE.

*—ead. flore purpurascente. *hort. reg. par.*

*—ead. flore carneo. *hist. ox.* 3. 363.

*—ead. flore albo. *Pin.* 261.

a. Brunella cæruleo magno flore. *Pin.* 261. *ex hort. cliff. & fl. suec.*

*—ead. foliis integris hirsutissimis. *Vaill.*

*—purpureo magno flore.

*—flore magno carneo. *hort. Edimb.*

b. Brunella laciniata, vel auriculatæ flore magno cæruleo. *Bauh. hist.* 3. 429. *ex hort. cliff.*

*—ead. flore magno purpureo.

*——ead. flore magno leucophæo.
*——ead. flore albo.
c. Brunella verbenulæ folio, flore cæruleo. *bot. par.* 22. *t.* 5. *f.* 1. *ex hort. cliff.*
*——ead. flore purpuraſcente.
d. Brunella folio laciniato, flore cæruleo. *Pin.* 261. *ex hort. cliff.*
*——ead. flore purpureo. *Pin.*
*——ead. flore roſeo. *hort. reg. par.*
*——ead. flore cinereo. *Pin.* 261.
*——ead. flore albo. *hort. reg. par.*

1. SCUTELLARIA folis cordato-lanceolatis crenatis. *fl. lapp.* 239. *hort. cliff.* 316. *fl. ſuec.* 499. *fl. leyd. prodr.* 310.

Caſſida paluſtris vulgatior, flore cæruleo. *I. R. H.* 182. TOQUE.
*——ead. flore albo. *I. R. H.* 182.
a. Caſſida paluſtris minima, flore purpuraſcente. *I. R. H.* 182. *ex hort. cliff.*

ANGIOSPERMIA.

1. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis petiolatis, calycibus longiſſi-

mis lateralibus. *hort. cliff.* 324. *virid. cliff.* 61. *fl. leyd. prodr.* 294.

Antirrhinum arvense majus. *Pin.* 212. MUFLE DE VEAU.

*—idem flore albo. *hort. reg. par.*

2. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis petiolatis, calycibus flore longè brevioribus. *hort. cliff.* 324.

*—foliis lanceolatis petiolatis, calycibus breviſſimis, racemo terminatrice. *fl. leyd. prodr.* 294.

Antirrhinum vulgare. *Bauh. hiſt.* 3. 462.

*—majus alterum, folio longiore. *Pin.* 211.

3. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminatricibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. *fl. leyd. prodr.* 297. *fl. ſuec.* 501.

*—foliis linearibus ſparſis. *hort. cliff.* 324.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Pin.* 212. LINAIRE.

*—vulgaris flore majore luteo pallido. *Pin.* 212.

*——vulgaris flore majore albo. *Pin.* 212.

4. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus ſparſis, calycinis laciniis capſulæ æqualibus. *obſ. pl.* 204.

Linaria minor repens & inodora. *hort. reg. par.*

*——ead. flore albo, foliis radiatis. *bot. par.*

a. Linaria erecta flore albido lineis purpureis ſtriato. *bot. par.* 118.

*——erecta flore majore odoro obſoletè cæruleo, rictu flaveſcente. *hort. reg. par.* 118.

5. ANTIRRHINUM foliis linearibus acuminatis alternis, floribus racemoſis, caule diffuſo. *fl. leyd. prodr.* 296.

Linaria pumila ſupina lutea. *Pin.* 213.

*——ead. pallidè lutea.

*——ead. flore albido. *hort. reg. par.* 118.

6. ANTIRRHINUM caulinis foliis lanceolato-linearibus ſparſis, ra-

dicalibus rotundis ternis. *obs. pl.* 204.

Linaria annua purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus. *bot. monsp.*

7. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis obtusis alternis, caule diffuso ramosissimo. *hort. cliff.* 324. *fl. suec.* 502. *fl. leyd. prodr.* 295.

Linaria pumila vulgatior arvensis. *I. R. H.* 169.

8. ANTIRRHINUM foliis alternis cordatis quinquelobis. *hort. cliff.* 323. *fl. leyd. prodr.* 295.

Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris. *I. R. H.* 169. CIMBALAIRE.

9. ANTIRRHINUM foliis alternis ovatis. *hort. cliff.* 323. *fl. leyd. prodr.* 295.

Linaria segetum Nummulariæ folio villoso. *I. R. H.* 169. VELVOTE.

10. ANTIRRHINUM foliis alternis hastatis. *hort. cliff.* 323. *fl. leyd. prodr.* 395.

Linaria segetum, Nummulariæ folio aurito & villoso, flore luteo. *I. R. H.* 169.

a. Linaria segetum Nummulariæ folio aurito & villoso, flore cæruleo. *I. R. H.* 169. *ex hort. cliff.*

1. RHINANTHUS corollarum labio superiore breviore. *fl. lapp.* 248. *hort. cliff.* 325. *fl. suec.* 503. *fl. leyd. prodr.* 298.

Pedicularis pratensis lutea, vel Crista galli. *Pin.* 136. PE'DICULAIRE. CRESTE DE COQ.

a. Pedicularis pratensis lutea erectior, calice floris hirsuto. *I. R. H.* 172. *ex fl. lapp. hort. cliff. & fl. suec.*

1. PEDICULARIS caule ramoso, floribus solitariis, calycibus quinquefidis crenatis. *fl. suec.* 504.

*——caule ramoso procumbente, floribus sparsis obtusis. *Hall. Helv.* 622.

*——caule ramoso, floribus solitariis remotis. *fl. lapp.* 241. *hort. cliff.* 326. *fl. leyd. prodr.* 298.

Pedicularis pratensis purpurea. *Pin.* 136.

*——pratensis, floribus carneis. *Pin.* 136.

*——pratensis, floribus candidis. *Pin.* 136.

2. PEDICULARIS caule ramoso erecto, calycibus bifidis crenatis. *Hall. Helv.* 621. *fl. suec.* 505.

Pedicularis palustris rubra elatior. *Rai. hist.* 700.

*—palustris alba elatior. *Rai. synops.* 162.

1. EUPHRASIA foliis ovatis acutè dentatis. *virid. cliff.* 61. *fl. lapp.* 247. *hort. cliff.* 325. *fl. leyd. prodr.* 299. *fl. suec.* 516.

Euphrasia officinarum. *Pin.* 233. EUFRAISE.

*—minor. *Bross.* 52.

a. Euphrasia major. *Bross.* 52. *ex hort. cliff.*

*—major; amplo flore albo.

2. EUPHRASIA foliis lanceolatis serratis. *hort. cliff.* 326. *fl. suec.* 517. *fl. leyd. prodr.* 299.

Pedicularis serotina, purpurascente flore. *I. R. H.* 172.

*—serotina, flore albo.

1. MELAMPYRUM spicis conicis laxis laceris. *act. stock.* 1741. 197. *fl. suec.* 511.

*—foliis laciniatis laxè ſpicatis. *fl. leyd. prodr.* 298.

Melampyrum purpuraſcente comâ. *Pin.* 234. BLED DE VACHE.

2. MELAMPYRUM florum conjugationibus remotis, corollis clauſis. *fl. ſuec.* 513.

*—foliis lanceolatis, florum paribus remotis. *fl. lapp.* 240. *fl. leyd. prodr.* 298.

Melampyrum luteum latifolium. *Pin.* 234.

*—idem flore albo, labio inferiori duobus maculis luteis diſtincto. *hort. reg. par.*

3. MELAMPYRUM ſpicis quadrangularibus compactis. obtuſis ciliatis. *fl. ſuec.* 510.

Melampyrum criſtatum, flore albo & purpureo. *Bauh. hiſt.* 3. 440.

1. OROBANCHE caule ſimpliſſimo. *virid. cliff.* 60. *hort. cliff.* 321. *fl. ſuec.* 519. *fl. leyd. prodr.* 299.

Orobanche major Caryophyllum olens. *Pin.* 87. OROBANCHE.

2. Orobanche major fœtidiſſima, ſyl-

væ Bononiensis. *I. R. H.* 176. *ex obs. pl.* 198.

2. OROBANCHE caule simplici cæruleo, foliis sub floribus brevibus. *Hall. Helv.* 610.

Orobanche majore flore. *Pin.* 88, subcæruleo.

*——majore flore flavescente.

3. OROBANCHE caule ramoso. *hort. cliff.* 321. *fl. leyd. prodr.* 299.

Orobanche ramosa, floribus purpurascentibus. *Pin.* 87.

*——ramosa, floribus cæruleis. *Pin.*

*——ramosa, floribus subalbidis. *Pin.*

1. LATHRÆA foliis cordatis, floribus fasciculatis. *obs. pl.* 454.

Clandestina flore subcæruleo. *I. R. H.* 652. GLANDESTINE, ou HERBE CACHE'E.

2. LATHRÆA caule simplicissimo, corollis nutantibus, labio inferiore trifido. *fl. suec.* 518.

Orobanche radice dentata major. *Pin.* 88.

* Anblatum. *cord. hist.* 89.

1. SCROPHULARIA foliis cor-

datis, racemo terminatrice. *hort. cliff.* 322. *fl. leyd. prodr.* 293. *fl. suec.* 520.

Scrophularia nodosa fœtida. *Pin.* 235. SCROFULAIRE.

*—ead. foliis ternis.

*—foliis utrinque acutis.

+ 2. SCROPHULARIA foliis cordatis, pediculorum alis in caulem decurrentibus. *obs. pl.* 201.

Scrophularia aquatica major. *Pin.* 235. HERBE DU SIEGE.

++ 1. DIGITALIS foliolis calycinis ovatis. *hort. cliff.* 318.

*—foliolis calycinis ovatis acuminatis. *fl. leyd. prodr.* 292.

Digitalis purpurea. *Bauh. hist.* 2. 812. DIGITALE.

*—flore dilute carneo. *hist. ox.* 2. 478.

*—flore magno candido. *Bauh. hist.* 2. 813.

++ 2. DIGITALIS foliolis calycinis subulatis, floribus imbricatis. *hort. cliff.* 318.

*—foliolis calycinis subulatis. *fl. leyd. prodr.* 293.

Digitalis major lutea vel pallida, parvo

+ 2. SCROPHULARIA foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule acutangulo, racemis terminalibus. Hort. Upsl. 177.

++ 1. DIGITALIS foliolis calycinis ovatis acutis, corollis obtusis, labio superiore integro. Hort. Upsl. 176

parvo flore. *Pin.* 244.

1. LIMOSELLA. *fl. lapp.* 349. *fl. suec.* 521. *Hall. Helv.* 629.

Plantaginella paluſtris. *Pin.* 190.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

1. MYAGRUM ſiliculis obverſè ovatis pedunculatis. *fl. ſuec.* 541.

*—ſiliculis obverſè ovatis, lateribus impreſſis. *hort. cliff.* 328. (depreſſis.) *fl. leyd. prodr.* 330.

Myagrum ſylveſtre. *Pin.* 109.

* Alyſſon ſegetum, foliis auriculatis acutis. *I. R. H.* 217.

* 2. MYAGRUM monoſpermum minus. *Pin.* 109.

Rapiſtrum folio glauco ſinuato, flore albo. *bot. par.* 171.

3. MYAGRUM ſiliculis globoſis compreſſis rugoſis. *hort. cliff.* 328. *fl. ſuec.* 542. *fl. leyd. prodr.* 330.

2. DIGITALIS foliis calycinis lanceolatis, corollis acutis, labio ſuperiore bifido. Hort. Upſ. 178.

Myagro similis siliquâ rotundâ. *Pin.* 109.

* Rapistrum arvense folio auriculato acuto. *I. R. H.* 211.

1. LEPIDIUM foliis ovato-lanceolatis integris serratis. *hort. cliff.* 331. *fl. suec.* 533. *fl. leyd. prodr.* 334.

Lepidium latifolium. *Pin.* 97. PASSERAGE.

2. LEPIDIUM foliis inferioribus lanceolatis serratis, superioribus linearibus integerrimis. *fl. leyd. prodr.* 334.

*——foliis lanceolato-linearibus serratis. *hort. cliff.* 331.

Lepidium gramineo folio, sive Iberis. *I. R. H.* 216.

* Iberis latiore folio. *Pin.* 97.

3. LEPIDIUM foliis pinnatis integerrimis, petalis calyce minoribus. *act. stock.* 1741. 198. *fl. suec.* 535.

Nasturtium pumilum vernum. *Pin.* 105.

4. LEPIDIUM foliis omnibus alternatim pinnatifidis.

Nasturtium pumilum supinum vernum. *bot. monsp.*

1. COCHLEARIA foliis pinnatifidis *hort. cliff.* 331. *fl. suec.* 539. *fl. leyd. prodr.* 335.

Nasturtium sylvestre, capsulis crispatis. *I. R. H.* 214. CRESSON.

1. IBERIS foliis sinuatis, caule nudo simplici. *hort. cliff.* 328. *fl. suec.* 536. *fl. leyd. prodr.* 336.

Nasturtium petræum, foliis Bursæ pastoris. *Pin.* 104.

1. THLASPI siliculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis. *hort. cliff.* 330. *fl. suec.* 531. *fl. leyd. prodr.* 333.

* Iberis siliculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis. *obs. pl.* 146.

Thlaspi vulgatius. *Bauh. hist.* 2. 921.

2. THLASPI sive Iberis foliis obversè lanceolatis, floribus umbellatis. *obs. pl.* 146.

Thlaspi umbellatum arvense amarum. *Bauh. hist.* 2. 925.

*—idem flore subrubente.

3. THLASPI siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *fl. lapp.* 337. *hort. cliff.* 330. *fl. suec.* 530. *fl. leyd. prodr.* 333.

Thlaspi arvense, siliquis latis. *Pin.* 105.

4. THLASPI foliis radicalibus ovatis, caulinis amplexicaulibus lanceolatis. *obs. pl.* 142.

Thlaspi arvense perfoliatum majus vel minus. *Pin.* 106.

5. THLASPI siliculis verticaliter cordatis. *fl. suec.* 532. *fl. lapp.* 252. *hort. cliff.* 330. *fl. leyd. prodr.* 334.

Bursa pastoris major, folio non sinuato. *Pin.* 108. TABOURET, BOURSE A BERGER.

*——ead. folio sinuato. *Pin.*

*——media. *Pin.* 108.

*——eleganti folio, instar Coronopi repentis. *Cam. hort.* 32.

1. CLYPEOLA siliculis biloculatibus tetraspermis. *hort. cliff.* 329. *fl. leyd. prodr.* 332.

ALYSSON incanum luteum, Serpilli folio majus & minus. *I. R. H.* 217.

1. ALYSSUM ramulis suffruticosis diffusis, foliis punctato-echinatis. Hort. Upsa. 185.

1. ALYSSUM foliis lanceolatis obtusis incanis, caulibus procumbentibus, radice perenni. *hort. cliff.* 332. *fl. leyd. prodr.* 331.

Alysson perenne montanum incanum. *I. R. H.* 217.

1. DRABA caulibus nudis, foliis incisis. *fl. suec.* 523. *hort. cliff.* 333. *fl. leyd. prodr.* 333.

Alysson vulgare, Polygoni folio, caule nudo. *I. R. H.* 217.

*——vulgare, Polygoni foliis incisis. *bot. par.* 11.

* Bursa pastoris minor, loculo oblongo, foliis laciniatis. *Pin.* 108.

SILIQUOSA.

1. CHEIRANTHUS foliis lanceolatis acutis glabris. *hort. cliff.* 334. *fl. leyd. prodr.* 337.

Leucoium luteum vulgare. *Pin.* 202. GIROFLE'E JAUNE.

*——petræum lignosius, folio rigido canescente, vulgatissimum. *Pluk. almag. bot.*

1. HESPERIS caule simplici, fo-

liis ovato-lanceolatis denticulatis. *hort. cliff.* 335. *fl. leyd. prodr.* 338.

Hesperis hortensis. *Pin.* 202. JULIENNE.

*——ead. flore candido. *Pin.* 202.

1. RAPHANUS siliquis teretibus articulatis unilocularibus. *hort. cliff.* 340. *fl. suec.* 568. *fl. leyd. prodr.* 344.

Raphanistrum segetum, flore luteo vel pallido. *I. R. H.* 230. RAIFORT.

a. Raphanistrum arvense, flore albo. *I. R. H.* 230. *ex hort. cliff.*

b. Raphanistrum segetum flore purpureo, aut dilute violaceo. *hist. ox.* 2. 266. *ex Hall. Helv.* 555.

1. DENTARIA foliis inferioribus palmatis, summis simplicibus. *hort. cliff.* 335. *fl. suec.* 565. *fl. leyd. prodr.* 340.

Dentaria heptaphyllos baccifera. *Pin.* 322. DENTAIRE.

1. CARDAMINE foliis pinnatis, foliolis subrotundis integris. *fl. suec.* 559.

*——foliis pinnatis, caule erecto. *fl.*

lapp. 258. *hort. cliff.* 336. *fl. leyd. prodr.* 345.

Cardamine pratensis, magno flore purpurascente. *I. R. H.* 224. CARDAMINE.

*——ead. magno flore albo. *I. R. H.* 224.

*——ead. flore minore purpurascente.

*——ead. flore minore albo.

*——ead. magno flore pleno. *I. R. H.* 224.

2. CARDAMINE foliis pinnatis, foliolis subrotundo-angulosis. *Hall. Helv.* 558. *fl. suec.* 560.

Cardamine pratensis, flore majore, elatior. *I. R. H.* 224.

1. BRASSICA radice caulescente fusiformi. *hort. cliff.* 339. *act. stock.* 1741. 200. *fl. suec.* 547. *fl. leyd. prodr.* 344.

Napus sylvestris. *Pin.* 95. NAVET.

*——sativa, radice alba *Pin.* 95.

*——sativa, radice nigra. *Pin.* 95.

1. SINAPIS siliquis glabris tetragonis. *hort. cliff.* 338. *fl. suec.* 549. *fl. leyd. prodr.* 343.

Sinapi sativum. *Ger. Emac.* MOUTARDE. SENEVE'.

*—siliquâ latiusculâ glabrâ, semine rufo, sive vulgare. *Bauh. hist.* 2. 855.

2. SINAPIS siliquis hispidis, rostro obliquo longissimo. *hort. cliff.* 338. *fl. leyd. prodr.* 343.

Sinapi apii folio. *Pin.* 99.

3. SINAPIS siliquis multangulis torosо-turgidis rostro proprio longioribus. *hort. cliff.* 338. *fl. suec.* 548. *fl. leyd. prodr.* 343.

Sinapi arvense præcox, semine nigro. *hist. ox.* 2. 216. SANVE.

*—idem foliis integris. *I. R. H.* 227.

1. ARABIS foliis lanceolatis petiolatis integerrimis. *virid. cliff.* 64. *fl. suec.* 567. *fl. leyd. prodr.* 339.

* Turritis foliis lanceolatis integris petiolatis, ad exortum ramorum solitariis. *hort. cliff.* 339.

Turritis vulgaris ramosa. *I. R. H.* 224.

1. ERYSIMUM siliquis cauli appressis. *hort. cliff.* 337. *fl. suec.* 554. *fl. leyd. prodr.* 342.

Erysimum vulgare. *Pin.* 100. VE-

LARD. TORTELLE. HERBE AUX CHANTRES.

2. ERYSIMUM foliis lyrato-pinnatis, extimo haſtato. *fl. ſuec.* 556.

Eryſimum latifolium majus glabrum. *Pin.* 101.

3. ERYSIMUM foliis lyrato-pinnatis, extimo obtuſo, ſubalaribus lineari-lanceolatis obtuſis.

Eryſimum foliis ſubincanis, ſiliquis breviſſimis. *Par. bat.* 51.

4. ERYSIMUM caule decumbente, ſiliquâ laterali ſubſeſſili. *fl. leyd. prodr.* 343.

Eruca procumbens alba, alis foliorum floreſcens. *hot. par.* 50.

5. ERYSIMUM foliis cordatis. *hort. cliff.* 338. *fl. ſuec.* 558. *fl. leyd. prodr.* 342.

Heſperis allium redolens. *hiſt. ox.* 252. ALLIAIRE.

6. ERYSIMUM foliis ſerratis lanceolatis. *fl. leyd. prodr.* 342.

Heſperis Leucoii folio ſerrato, ſiliquâ quadrangulâ. *I. R. H.* 223.

* Leucoium luteum ſylveſtre hieracifolium. *Pin.* 201.

7. ERYSIMUM foliis lyratis, extimo subrotundo. *fl. suec.* 557.

*——foliis basi pinnato-dentatis apice subrotundis. *fl. lapp.* 264. *hort. cliff.* 338. *fl. leyd. prodr.* 342.

Sisymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo. *I. R. H.* 226. HERBE DE STE BARBE.

8. ERYSIMUM foliis integris lanceolatis. *fl. lapp.* 263. *hort. cliff.* 337. *fl. suec.* 555. *fl. leyd. prodr.* 342.

* Turritis foliis integris lanceolatis. *obs. pl.* 161.

Turritis Leucoii folio. *I. R. H.* 224.

1. TURRITIS perrarò ramifera, foliis lanceolatis obscurè dentatis. *obs. pl.* 162.

Turritis. *lob. icon.* 220.

2. TURRITIS foliis omnibus dentatis hispidis, caulinis amplexicaulibus. *hort. cliff.* 339. *fl. suec.* 545. *fl. leyd. prodr.* 339.

Turritis minor. *bot. monsp.*

3. TURRITIS foliis radicalibus

dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *hort. cliff.* 339. *fl. suec.* 544. *fl. leyd. prodr.* 339.

Turritis foliis inferioribus cichoraceis, cæteris Perfoliatæ. *I. R. H.* 224.

1. SISYMBRIUM foliis pinnatis, foliolis subcordatis. *hort. cliff.* 336. *fl. suec.* 552. *fl. leyd. prodr.* 340. *fl. virg.* 170.

Sisymbrium aquaticum. *Matth.* 487. CRESSON D'EAU, OU DE FONTAINE.

2. SISYMBRIUM foliis simplicibus dentatis serratis. *hort. cliff.* 336. *fl. suec.* 550. *fl. leyd. prodr.* 341.

Sisymbrium aquaticum, Raphani folio, siliquâ breviori. *I. R. H.* 226.

3. SISYMBRIUM foliis pinnatifidis serratis. *fl. suec.* 551.

*—foliis infimis capillaceis, summis pinnatifidis. *hort. cliff.* 337. *fl. leyd. prodr.* 341.

Sisymbrium aquaticum, foliis in profundas lacinias divisis, siliquâ breviori. *I. R. H.* 226.

4. SISYMBRIUM foliis pinnatis; foliolis lanceolatis ſerratis. *hort. cliff.* 336. *fl. leyd. prodr.* 341.

Siſymbrium paluſtre repens, Naſturtii folio. *I. R. H.* 226.

a. Siſymbrium paluſtre, flore minimo. *bot. par.* 186.

5. SISYMBRIUM petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. *fl. ſuec.* 553.

*——corollis calyce minoribus, foliis multifidis linearibus. *fl. lapp.* 264. *hort. cliff.* 337. *fl. leyd. prodr.* 341.

* Deſcurea. *obſ. pl.* 164.

Siſymbrium annuum, Abſinthii minoris folio. *I. R. H.* 266. TALITRON, ou ARGENTINE ROUGE.

6. SISYMBRIUM foliis infimis bis ter-ve pinnatifidis, ſupremis integris, omnibus non dentatis. *obſ. pl.* 150.

Eruca tenuifolia perennis, flore luteo. *Bauh. hiſt.* 2. 861. ROQUETTE.

*——ead. flore viridi ſeu abortivo.

7. SISYMBRIUM foliis lanceolatis integris ſerratis. *hort. cliff.* 337. *fl. leyd. prodr.* 341.

Eruca minimo flore, Monspel. *Bauh. hist.* 2. 862.

8. SISYMBRIUM foliis sinuato-pinnatis. *obs. pl.* 150.

Eruca sylvestris minor lutea, Bursæ pastoris folio. *Pin.* 98.

9. SISYMBRIUM foliis linearibus pinnato-dentatis. *hort. cliff.* 337. *fl. leyd. prodr.* 341.

Eruca sylvestris major lutea, caule aspero. *Pin.* 98.

10. SISYMBRIUM Erucæ folio aspero, flore luteo. *I. R. H.* 226.

* Leucoium luteum, Erucæ folio. *Pin.* 201.

1. ISATIS foliis radicalibus crenatis, caulinis integerrimis ponè acutis, siliculis oblongis. *act. stock.* 1741. 199. *fl. suec.* 543.

Isatis sylvestris vel angustifolia. *Pin.* 113. PASTEL.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

1. GERANIUM pedunculis simplibus unifloris. *hort. cliff.* 343. *fl. suec.* 571. *fl. leyd. prodr.* 350.

Geranium sanguineum, maximo flore. *Pin.* 318. BEC DE GRUE.

2. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis subrotundis multifidis, caule procumbente. *hort. cliff.* 344. *fl. suec.* 575. *fl. leyd. prodr.* 351.

Geranium folio Malvæ rotundo. *Pin.* 318. PIED DE PIGEON.

a. Geranium columbinum majus, flore minore cæruleo vel purpureo. *Rai. hist.* 1059. *ex hort. cliff.*

3. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinque-partito-multifidis rotundatis, laciniis obtusiusculis, capsulis hirsutis. *fl. suec.* 577.

Geranium columbinum villosum,

petalis purpureis bifidis. *bot. par.* 79.
*——columbinum minus, majori flore, & foliis florum bifidis. *bot. monsp.*
*——idem petalis albis bifidis.

4. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-multifidis angulatis, laciniis acutis, capsulis glabris. *fl. suec.* 576.

Geranium columbinum, dissectis foliis, pediculis florum longissimis. *Rai. hist.* 1059. variet. anteced. *n.* 2. *ex hort. cliff.*
*——idem floribus incarnatis.

5. GERANIUM foliis ad nervum quinquefidis, pediculis brevioribus, caule erecto. *Hall. Helv.* 366.

Geranium columbinum majus, foliis imis longis usque ad pediculum divisis. *hist. ox.* 2. 511.

6. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinque tri-vepartitis, lobis pinnatifidis. *hort. cliff.* 344. *fl. suec.* 578.

Geranium Robertianum primum viride. *Pin.* 319. HERBE A ROBERT.

*—Robertianum primum rubens. *Pin.* 319.
*—Robertianum, flore albo. *hort. reg. Blef.*
7. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris. *fl. fuec.* 579.
*—pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, foliis duplicato-pinnatis. *hort. cliff.* 344. *fl. leyd. prodr.* 352.
Geranium Cicutæ folio, minus & fupinum. *Pin.* 319.
*—idem flore dilutè purpuraſcente.
*—idem flore albo. *Pin.* 319.
8. GERANIUM pedunculis biflo-ris, calycibus pyramidatis angulatis rugoſis, foliis quinquelobis rotundatis. *act. ſtock.* 1741. 200. *fl. fuec.* 574.
Geranium lucidum ſaxatile. *Pin.* 318.

POLYANDRIA.

1. MALVA caule erecto, foliis ſubpalmatis obſoletè ſerratis. *hort. cliff.* 347. *fl. fuec.* 581. *act. ſtock.*

1741. 200. *fl. leyd. prodr.* 356.

Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato. *Bauh. hist.* 2. 949. MAUVE.

*——sylvestris, folio sinuato. *Pin.* 314.

*——ead. flore albo. *hort. Edimb.*

2. MALVA caule repente, foliis cordato-orbicularibus, obsoletè quinquelobis. *hort. cliff.* 347. *fl. suec.* 580. *fl. leyd. prodr.* 356.

Malva vulgaris, flore minore, folio rotundo. *Bauh. hist.* 2. 949.

*——sylvestris, folio subrotundo. *Pin.* 314.

3. MALVA caule erecto, foliis multipartitis. *fl. suec.* 582. *hort. cliff.* 347. *act. stock.* 1741. 201. *fl. leyd. prodr.* 356.

Alcea vulgaris major. *Pin.* 316. ALCE'E.

*——ead. foliis magis dissectis.

a. Alcea amplissimo folio laciniato. *Bauh. hist.* 2. *app. l.* 23. *p.* 1067.

4. MALVA caule erecto, foliis imis subrotundis, superioribus te-

4. MALVA foliis radicalibus reniformibus inciso, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. Hort. Upsa. 202.

nuiter diviſis. *Hall. Helv.* 363.
*——montana, ſeu Alcea rotundifolia laciniata. *Col. Ecphr.* 148. *fl. ſuec.* 583.
Alcea folio rotundo laciniato. *Pin.* 316.
1. ALTHÆA foliis ſimplicibus tomentoſis. *hort. cliff.* 348. *fl. leyd. prodr.* 357.
Althæa Dioſcoridis & Plinii. *Pin.* 315. GUIMAUVE.
2. ALTHÆA foliis trifidis hiſpidis. *hort. cliff.* 349. *fl. leyd. prodr.* 357.
Alcea hirſuta. *Pin.* 317.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA, HEXANDRIA.

1. FUMARIA pericarpiis monoſpermis. *hort. cliff.* 352. *fl. ſuec.* 584. *fl. leyd. prodr.* 394.
Fumaria officinarum & dioſcoridis.

flore purpureo. *Pin.* 143. FUMETERRE.

*——ead. flore palleſcente.

*——ead. flore albo.

a. Fumaria major, floribus dilutè purpureis. *bot. monſp. ex hort. cliff. & obſ. pl.* 221.

b. Fumaria foliis tenuiſſimis, floribus albis. *Pin.* 143. *ex hort. cliff. & obſ. pl.* 222.

c. Fumaria lobis longioribus & anguſtioribus ſparſis. *bot. par.* 56.

d. Fumaria lobis tenuiſſimis, floribus alatis parvis. *bot. par.* 56.

e. Fumaria ſegmentis longis anguſtis rariùs diſpoſitis. *bot. par.* 56.

2. FUMARIA caule ſimpliciſſimo diphyllo, floribus calyce deſtitutis. *hort. cliff.* 351.

Fumaria bulboſa, radice cavâ major. *Pin.* 142.

OCTANDRIA.

1. POLYGALA foliis lineari-lanceolatis, caulibus diffuſis herbaceis. *virid. cliff.* 70. *hort. cliff.* 352. *fl. ſuec.* 582. *fl. leyd. prodr.* 393.

Polygala vulgaris, floribus cæruleis. *Pin.* 215.

*——purpurea. *tabern. icon.* 831.

*——vulgaris, flore pallidè cæruleo & albo mixto.

*——vulgaris alba. *tabern. icon.*

*——flore carneo. *hort. reg. par.*

a. Polygala minor vulgaris, flore cæruleo. *bot. par.* 161.

*——ead. flore pallidè cæruleo & albo mixto.

*——ead. flore purpureo.

*——ead. flore carneo.

*——ead. flore albo.

2. POLYGALA foliis subrotundis. *obs. pl.* 223.

*——foliis imis subrotundis, superioribus anguſtis acutis. *Hall. Helv.* 606.

Polygala Buxi minoris folio, flore cæruleo. *bot. par.* 161.

*——ead. flore roſeo. *bot. par.*

a. Polygala minor, foliis circa radicem rotundiuſculis, floribus dilutè cæruleis. *fl. quaſimodog.* 40. *ex Hall. Helv.*

*——ead. floribus purpuraſcentibus, vel albis.

DECANDRIA,

1. SPARTIUM ramis inermibus angulatis, foliis ternatis, solitariisque. *hort. cliff.* 356. *fl. suec.* 589. *fl. leyd. prodr.* 370.

Cytiso-genista scoparia vulgaris, flore luteo. *I. R. H.* 649. GENET.

*—ead. flore albo. *I. R. H.*

1. GENISTA foliis lanceolatis, ramis teretibus striatis. *hort. cliff.* 355. *fl. suec.* 587. *fl. leyd. prodr.* 371.

Genista tinctoria germanica. *Pin.* 395. GENESTROLE, ou GENET DES TEINTURIERS.

*—ead. angustifolia.

2. GENISTA foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculoso. *fl. leyd. prodr.* 371. *hort. cliff.* 355. *fl. suec.* 588.

Genista ramosa, foliis hyperici. *Pin.* 395.

3. GENISTA caule nudo, spinis simplicibus caulinis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *hort.*

cliff. 355. *fl. leyd. prodr.* 371.

Geniſta ſpartium minus anglicum. *I. R. H.* 645.

4. GENISTA ramis trianguli-ancipitibus, petiolis decurrentibus, foliis ovato-lanceolatis. *virid. cliff.* 71. *fl. leyd. prodr.* 371.

*——ramis ancipitibus articulatis, foliis ovato-lanceolatis. *hort. cliff.* 355.

Geniſtella herbacea, ſive Chamæſpartium. *Bauh. hiſt.* 1. 393.

1. ONONIS floribus ſubſeſſilibus ſolitariis lateralibus, caule ſpinoſo. *fl. ſuec.* 623. *hort. cliff.* 359. *fl. leyd. prodr.* 375.

Anonis ſpinoſa, flore purpureo. *Pin.* 389. ARRESTE-BOEUF.

*——ſpinoſa, flore albo. *Pin.* 389.

*——ſpinoſa, flore pallidè purpureo. *a.* Anonis ſpinoſa fruticoſa erecta, flore purpureo. *bot. par.* 13. *ex Hall. Helv.* 589.

*——ſpinoſa fruticoſa erecta, flore pallido.

2. ONONIS pedunculis unifloris ſetâ terminatis. *hort. cliff.* 358. *fl. leyd. prodr.* 375.

Anonis viſcoſa, ſpinis carens, lutea major. *Pin.* 389.

*—non ſpinoſa, flore luteo variegato. *Pin.* 389.

3. ONONIS floribus lateralibus ſeſſilibus ſolitariis, petiolis longiſſimis. *fl. leyd. prodr.* 375.

Anonis flore luteo parvo. *hort. reg. par.*

1. ULEX folio ſub ſpinâ ſingulâ ſubulato plano acuto. *hort. cliff.* 356. *fl. leyd. prodr.* 372.

Geniſta ſpartium majus, breviori-bus aculeis. *I. R. H.* 645. JOMARIN, ou JONC-MARIN.

a. Geniſta ſpartium majus, longioribus aculeis. *I. R. H.* 645. *ex hort. cliff.*

1. ROBINIA aculeis geminatis. *hort. cliff.* 354. *fl. leyd. prodr.* 372.

Pſeudo-acacia vulgaris. *I. R. H.* 649.

1. PHASEOLUS radice annuâ, leguminibus pendulis compreſſis toroſis. *fl. leyd. prodr.* 367.

Phaſeolus vulgaris. *lob. ic.* 59. HARICOT.

a. Phaseolus hortensis minor. *I. R. H.* 413. *ex hort. cliff.* 359.

~~1. PISUM~~ stipulis crenatis. *hort. cliff.* 369. *fl. leyd. prodr.* 362.

Pisum arvense. *Pin.* 342. Pois.

1. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis leguminibus compressis ovatis dorso bimarginatis. *hort. cliff.* 367. *fl. leyd. prodr.* 363.

Lathyrus sativus, flore fructuque albo. *Pin.* 343. Gesse.

*—sativus, flore purpureo. *Pin.* 343.

2. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus. *hort. cliff.* 367. *fl. suec.* 598.

Lathyrus sylvestris major. *Pin.* 343.

3. LATHYRUS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis linearilanceolatis, leguminibus hirsutis, seminibus scabris. *fl. leyd. prodr.* 363.

Lathyrus angustifolius, siliquâ hirsutâ. *Pin.* 343.

4. LA-

* 1. PISUM stipulis dentatis gibbis crenatis, petiolis petiolisque caule teretibus, pedunculis multifloris. Hort. Upsal. 215.

4. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ovalibus, radice tuberosâ. *hort. cliff.* 367. *fl. leyd. prodr.* 364.

Lathyrus arvensis repens tuberosus. *Pin.* 343.

5. LATHYRUS pedunculis unifloris cirrhiferis, foliolis linearibus, seminibus angulatis.

Lathyrus angustissimo folio, semine anguloso. *hort. reg. par.*

6. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis nudis. *hort. cliff.* 367. *fl. suec.* 599. *fl. leyd. prodr.* 364.

Lathyrus sylvestris luteus, foliis Viciæ. *Pin.* 344.

7. LATHYRUS cirrhis aphyllis. *hort. cliff.* 367. *fl. leyd. prodr.* 362.

Aphaca. *lob. icon.* 70.

8. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis. *hort. cliff.* 368. *fl. suec.* 600. *fl. leyd. prodr.* 364.

*—foliis pinnatis, pedunculis multifloris. *fl. lapp.* 271.

Clymenum parisiense, flore cæruleo. *I. R. H.* 396.

9. LATHYRUS foliis simplicibus ensiformibus. *virid. cliff.* 74. *fl. leyd. prodr.* 362.

*—foliis solitariis cirrho destitutis. *hort. cliff.* 366.

Nissolia vulgaris. *I. R. H.* 656.

1. VICIA leguminibus erectis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emarginatis, stipulis dentatis. *hort. cliff.* 368. *fl. leyd. prodr.* 365.

Vicia sativa vulgaris, semine nigro. *Pin.* 344. VESSE.

*—sativa vulgaris, semino cinereo. *Pin.* 344.

*—sativa vulgaris, flore suaverubente.

2. VICIA siliquis sessilibus erectis, foliis imis ovatis, superioribus linearibus. *Hall. Helv.* 598.

Vicia vulgaris, acutiore folio, semine parvo nigro. *Pin.* 344.

a. Vicia semine rotundo nigro. *Pin.* 344. *ex Hall. Helv.*

3. VICIA angustifolia purpuro-

violacea, siliquâ latâ glabrâ. *bot. monsp.*

4. VICIA pedunculis uni vel difloris, petiolis diphyllis brevissimè cirrhosis. *obs. pl.* 235.

Vicia minima præcox Parisiensium. *hort. reg. par.*

5. VICIA foliolis obversè ovatis apice emarginatis, leguminibus solitariis villosis.

Vicia sylvestris lutea, siliquâ hirsutâ. *Pin.* 345.

6. VICIA leguminibus adscendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. *hort. cliff.* 362. *fl. suec.* 602. *fl. leyd. prodr.* 365.

Vicia segetum major, cum siliquis nigris semper binis. *bot. par.* 202.

*——sepium, folio rotundiore acuto, semine maculato. *Pin.* 345.

7. VICIA pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirrhosis, foliolis alternis ovatis, stipulis dentatis. *fl. suec.* 604.

Vicia maxima Dumetorum. *Pin.* 385.

*—ead. flore albo.

8. VICIA pedunculis multifloris, ſtipulis utrinque acutis integris. *hort. cliff.* 368. *fl. ſuec.* 605. *fl. leyd. prodr.* 364.

Vicia multiflora. *Pin.* 345.

*—ead. pallidè cærulea.

*—ead. purpuro-violacea, cum alis albicantibus.

*—ead. purpuro-violacea tota.

*—ead. flore ſuave rubente.

*—multiflora, flore purpuro-violaceo minore.

a. Vicia multiflora purpuro-violacea, ſpicâ longiſſimâ. *bot. par.* 203. *ex hort. cliff.*

b. Vicia perennis incana, multiflora. *bot. monſp. ex hort. cliff.*

9. VICIA caule erecto, petiolis abſque cirrhis. *hort. cliff.* 369. *fl. leyd. prodr.* 366.

Faba major vulgaris. *adv. lob.* FEVE.

a. Faba minor, ſive equina. *Pin.* 338. *ex hort. cliff.*

10. VICIA lathyroides, purpuro-cæruleis floribus. *Par. Bat.* 242.

11. VICIA ſylveſtris alba, ſiliquâ hirſutâ. *bot. par.* 202.

12. VICIA ſylveſtris incana major & præcox pariſienſis, flore ſuave rubente. *I. R. H.* 397.

1. OROBUS caule ſimpliciſſimo, foliolis pluribus lanceolatis oblongis. *hort. cliff.* 366. *fl. ſuec.* 596. *fl. leyd. prodr.* 366.

Orobus ſylveſtris, foliis oblongis glabris. *I. R. H.* 392. OROBE.

*——ſylvaticus, foliis latis oblongis glabris.

*——ſylvaticus longis anguſtiſque glabris foliis.

1. LOTUS leguminibus ſæpiùs ſolitariis, angulis quatuor membranaceis. *hort. cliff.* 371. *fl. leyd. prodr.* 388.

Lotus pratenſis ſiliquoſus luteus. *Pin.* 332. LOTIER.

2. LOTUS caule herbaceo, florum capitulo depreſſo, leguminibus decumbentibus teretibus. *hort. cliff.* 372. *fl. ſuec.* 609. *fl. leyd. prodr.* 388.

Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor glabra. *Pin.* 332.

a. Lotus pentaphyllos minor glabra, foliis longioribus & angustioribus. *hort. Edimb. ex hort. cliff.*

b. Lotus corniculata hirsuta minor. *Bauh. hist.* 2. 356. *ex hort. cliff. & fl. suec.*

3. LOTUS floribus umbellatis, siliquis pendulis, caule erecto. *Hall. Helv.* 571.

Lotus pentaphyllos, flore majore luteo splendente. *Pin.* 332.

a. Lotus pentaphyllos major hirsutie candicans. *Pin.* 332. *ex Hall. Helv.*

b. Lotus pratensis major glaber. *bot. par.* 120. *ex Hall Helv.*

1. ANTHYLLIS foliis pinnatis, foliolis pluribus, terminatrice majore. *fl. leyd. prodr.* 389. *hort. cliff.* 371. *fl. suec.* 594.

Vulneraria rustica. *Bauh. hist.* 2. 373. VULNE'RAIRE.

1. TRIFOLIUM spicis villosis, caule diffuso, foliolis integerrimis. *hort. cliff.* 375. *fl. suec.* 615. *fl. leyd. prodr.* 580.

Trifolium pratenſe purpureum. *Pin.* 327. TREFLE.

*——idem dilutè purpureum.

*——pratenſe vulgare, flore albo. *hiſt. ox.*

*——idem flore ſuave rubente.

*——Trifolium pratenſe, flore monopetalo breviore purpuraſcente.

a. Trifolium lagopoides, flore ſubluteo. *hort reg. par. ex Hall. Helv.* 586.

2. TRIFOLIUM ſpicis villoſis ſubovatis, caule erecto, foliis ovato-oblongis integerrimis. *fl. leyd. prodr.* 380.

Trifolium ſpicâ oblongâ rubrâ. *Pin.* 328.

3. TRIFOLIUM ſpicis villoſis, caule erecto, foliis ſerrulatis. *hort. cliff.* 375. *fl. leyd. prodr.* 380.

Trifolium montanum, ſpicâ longiſſimâ rubente. *Pin.* 328.

4. TRIFOLIUM capitulis terminatricibus, corollarum vexillis ſubulatis, caule erecto, foliolis lanceolatis ſerratis. *fl. ſuec.* 611.

Trifolium montanum album. *Pin.* 328.

5. TRIFOLIUM capitulis subrotundis, floſculis pedunculatis, leguminibus tetraſpetmis, caule procumbente. *hort. cliff.* 375. *fl. leyd. prodr.* 378.

Trifolium pratenſe, flore albo, minus & fœmina glabrum. *Bauh. hiſt.* 2. 380.

*—pratenſe, flore carneo, minus & fœmina glabrum. *Plukn.*

*—pratenſe, capitulo folioſo. *Ambr.* 541.

a. Trifolium humifuſum glabrum, foliis ciliaribus. *bot. par.* 195.

6. TRIFOLIUM capitulis ſubrotundis, calycibus bidentatis reflexis. *hort. cliff.* 373. *fl. ſuec.* 613. *fl. leyd. prodr.* 378.

Trifolium fragiferum. *Cluſ. hiſt.*

*—fragiferum noſtras purpureum, folio oblongo. *hiſt. ox.*

*—idem flore albo. *hiſt. ox.*

7. TRIFOLIUM capitulis villoſis, involucro terminatrici reflexo rigido capitulum involvente. *hort. cliff.* 374. *fl. leyd. prodr.* 379.

Trifolium ſemen ſub terram condens. *hort. reg. par.*

8. TRIFOLIUM ſpicis oblongis villoſis obtuſis nudis, foliolis ſubrotundis. *fl. leyd. prodr.* 380.

*—foliis ſubrotundis, ſpicis villoſis, calyce tomentoſo. *Hall. Helv.* 584.

Trifolium albo incarnatum ſpicatum, ſive Lagopus maximus. *Bauh. hiſt.* 2. 376.

9. TRIFOLIUM ſpicis villoſis ovalibus, dentibus calycinis ſetaceis æqualibus. *hort. cliff.* 375. *fl. ſuec.* 616. *fl. leyd. prodr.* 379.

Trifolium arvenſe humile ſpicatum, ſive Lagopus. *Pin.* 328.

10. TRIFOLIUM capitulis ovatis ſeſſilibus lateralibus, calycibus ſubrotundis villoſis ſtriatis. *fl. ſuec.* 614.

Trifolium parvum hirſutum, flore parvo dilutè purpureo in glomerulis oblongis, ſemine magno. *Rai. hiſt.* 495.

11. TRIFOLIUM ſpicis ovatis ſeſſilibus ſcabris lateralibus. *hort. cliff.* 373. *fl. leyd. prodr.* 377.

Trifolium floſculis albis in glomerulis oblongis aſperis, cauliculis proximè adnatis. *Rai. ſynops.* 194.

12. TRIFOLIUM caule fiſtuloſo erecto, capitulis ſubgloboſis, foliolis obversè ovatis ſerratis.

Trifolium orientale altiſſimum, caule fiſtuloſo, flore albo. *Coroll. I. R. H.* 27.

13. TRIFOLIUM ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, caule erecto. *hort. cliff.* 374. *fl. ſuec.* 617. *fl. leyd. prodr.* 378.

Trifolium pratenſe luteum, capitulo Lupuli, vel agrarium. *Pin.* 328.

14. TRIFOLIUM ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, caule procumbente. *act. ſtock.* 1741. *p.* 202. *fl. ſuec.* 618.

Trifolium pratenſe luteo-croceum. *hot. par.*

15. TRIFOLIUM floribus racemoſis, leguminibus nudis diſpermis, caule erecto. *hort. cliff.* 376. *fl. ſuec.* 619. *fl. leyd. prodr.* 381.

Melilotus officinarum Germaniæ. *Pin.* 331. Me'lilot.

*—ead. flore albo. *Pin.*

a. Melilotus siliquis longioribus acutis. *I. R. H.* 407. *ex obs. pl.* 244.

*—ead. flore albo.

b. Melilotus vulgaris altissima frutescens, flore luteo. *I. R. H.* 407.

*—idem flore albo. *I. R. H.* 407.

~~1. ERVUM leguminibus pendulis. *hort. cliff.* 370. *fl. leyd. prodr.* 390. Ervum verum. *Cam. hort.* 97. Ers.~~

1. ERVUM pedunculis subbifloris, seminibus globosis quaternis. *fl. suec.* 606.

Vicia segetum singularibus siliquis glabris. *Pin.* 345.

*—minima, cum siliquis glabris. *I. R. H.* 397.

1. CICER pedunculis bifloris, seminibus compressis. *hort. cliff.* 370. *fl. leyd. prodr.* 289.

Lens vulgaris. *Pin.* 346. Lentille.

a. Lens major. *Pin.* 346. *ex hort. cliff.*

2. CICER pedunculis multifloris, seminibus globosis (binis.) *hort. cliff.*

370. *fl. leyd. prodr.* 389. *fl. suec.* 607.

Vicia segetum, cum siliquis plurimis hirsutis. *Pin.* 345.

1. ASTRAGALUS leguminibus lunatis biventricosis, caulibus procumbentibus. *hort. cliff.* 362. *fl. suec.* 591. *fl. leyd. prodr.* 392.

Astragalus luteus perennis procumbens vulgaris, sive sylvestris. 8. *hist. ox.* 2. 107. ASTRAGALE.

2. ASTRAGALUS acaulis, foliis ovatis, siliquâ erectâ stiliferâ. *Hall. Helv.* 566.

Astragalus Monspessulanus. *Bauh. hist.* 2. 338.

1. COLUTEA foliolis obversè cordatis, caule arboreo. *hort. cliff.* 365. *fl. leyd. prodr.* 374.

Colutea vesicaria. *Pin.* 396. BAGUENAUDIER.

*——ead. vesiculis rubentibus. *Bauh. hist.* 1. 380.

1. TRIGONELLA leguminibus sessilibus. *virid. cliff.* 76. *fl. leyd. prodr.* 383.

* Medicago leguminibus ferè so-

3. GIGER pistillorum germinibus undulato-falcatis, *Hort. Upsal.* 224.
* Ervum leguminibus pendulis *hort. cliff.* 370. *fl. leyd. prodr.* 390.
Ervum verum. *Com. Bort.* 97.

litariis seſſilibus erectis reflexo-falcatis acuminatis. *hort. cliff.* 376.

Fœnum græcum ſativum. *Pin.* 348. FENUGREC.

1. MEDICAGO pedunculis racemoſis, leguminibus lunatis, caule proſtrato. *fl. ſuec.* 620.

*—pedunculis laxè ſpicatis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *hort. cliff.* 377. *fl. leyd. prodr.* 381.

Medicago ſylveſtris, floribus croceis. *bot. par.*

* Medica ſylveſtris, floribus croceis. *Bauh. hiſt.* 2. 383.

*—ead. floribus è luteo palleſcentibus.

*—ead. floribus è cæruleo vireſcentibus.

*—ead. floribus partim luteis, partim violaceis.

a. Medica major erectior, floribus purpuraſcentibus. *Bauh. hiſt.* 2. 382. LUSERNE. *ex hort. cliff. & fl. ſuec.*

*—legitima. *Cluſ. hiſt.* 2. 242.

*—ead. floribus violaceis. *I. R. H.* 410.

* 2. ASTRAGALUS a caulis, ſcapo declinato longitudine foliorum, leguminibus subulatis teretibus subarcuatis glabris. Hort. Upſ. 277.

*——ead. floribus ex violaceo & luteo mixtis. *I. R. H.*
*——ead. flore albo cæruleſcente.

2. MEDICAGO leguminibus cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo. *hort. cliff.* 378. *fl. leyd. prodr.* 381.

Medica orbiculata. *Bauh. hiſt.* 2. 384.
a. Medica arabica. *Cam. hort. t.* 28. *ex obſ. pl.* 250.
b. Medica echinata glabra, cum maculis nigricantibus. *Bauh. hiſt.* 2. 384.
c. Medica polycarpos, folio obtuſo crenato. *I. R. H.* 411.

3. MEDICAGO leguminibus cochleatis aculeis uncinatis alternis externè donatis, ſtipulis integris. *obſ. pl.* 249.

Medica echinata minima. *Bauh. hiſt.* 2. 386.

4. MEDICAGO quæ Medica echinata magna hirſuta. *Bauh. hiſt.* 2. 385.

5. MEDICAGO triphylla, leguminibus cochleatis ſpinoſis, foliolis

inferioribus cuneiformibus retusis, superioribus subrotundis;

Medica hirsuta, echinis rigidioribus. *Bauh. hist.* 2. 385.

6. MEDICAGO leguminibus confertis sessilibus arcuatis inclinatis. *hort. cliff.* 377. *fl. leyd. prodr.* 382.

Fœnum græcum sylvestre alterum polyceration. *Pin.* 348.

7. MEDICAGO spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente. *fl. suec.* 621.

* Trifolium leguminibus spicatis reniformibus nudis monospermis, caule procumbente. *hort. cliff.* 375. *fl. leyd. prodr.* 380.

Melilotus capsulis renisimilibus in capitulum congestis. *I. R. H.* 407. *a.* Trifolium luteum lupulinum minimum. *hist. ox.* 142. *ex Hall. Helv.* 580.

1. HEDYSARUM foliis pinnatis, leguminibus subrotundis aculeatis. *hort. cliff.* 365. *fl. leyd. prodr.* 385.

Onobrychis foliis viciæ, fructu

echinato, major. *Pin.* 350. SAINFOIN.

1. HIPPOCREPIS leguminibus pedunculatis confertis, margine exteriori repandis. *fl. leyd. prodr.* 384.

*——leguminibus pedunculatis confertis margine exteriori lobatis. *hort. cliff.* 364.

Ferrum equinum germanicum, siliquis in summitate. *Pin.* 349. Item ferro equino gallico affinis. ejusd. ibid. FER DE CHEVAL.

1. ORNITHOPUS foliis pinnatis, articulis leguminum subrotundis lævibus. *hort. cliff.* 364. *fl. leyd. prodr.* 383.

Ornithopodium radice tuberculis nodosa. *Pin.* 350. PIED D'OISEAU.

1. CORONILLA leguminibus teretibus torosis, unguibus corollæ brevibus, foliolis glabris, caule herbaceo. *hort. cliff.* 363. *fl. leyd. prodr.* 386.

Coronilla herbacea, flore vario. *I. R. H.* 650. CORONILLE.

*——ead. flore albo.

*—ead. flore vario pleno. *D. Vaill. I. R. H.* 650.

2. CORONILLA leguminibus teretibus, unguibus corollæ brevibus, pinnis ad ſummum enneaphyllis, foliolis ovatis. *obſ. pl.* 231.

*—humillima fruteſcens, ſiliquis articulatis pendulis. *Hall. Helv.* 573.

Coronilla minima. *I. R. H.* 650.

* Ferrum equinum gallicum, ſiliquis in ſummitate. *Pin.* 349.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

Polyandria.

1. HYPERICUM floribus trigynis, caule annuo, foliis punctatis obtuſis. *hort. cliff.* 380. *fl. leyd. prodr.* 474.

*—foliis ovatis, calycinis laciniis linearibus. *obſ. pl.* 177.

Hypericum vulgare. *Pin.* 279. Millepertuis.

2. HYPERICUM floribus trigy-

nis, caule quadrato herbaceo. *hort. cliff.* 380. *fl. ſuec.* 624. *fl. leyd. prodr.* 473.

Hypericum aſcyrum dictum, caule quadrangulo. *Bauh. hiſt.* 3. 382.

*——idem variegatum.

a. Hypericum perforatum, caule quadrangulo, flore minore. *bot. par.* 106. *ex Hall. Helv.* 362.

3. HYPERICUM foliis ovatis, caulibus ſupinis. *obſ. pl.* 174.

Hypericum minus ſupinum, vel ſupinum glabrum. *Pin.* 279.

4. HYPERICUM foliis ovalibus obtuſis. *obſ. pl.* 451.

Hypericum paluſtre ſupinum tomentoſum. *I. R. H.* 255.

5. HYPERICUM floribus trigynis, calycum ſerraturis capitatis, caule tereti. *hort. cliff.* 380. *fl. ſuec.* 626. *fl. leyd. prodr.* 474.

*——foliis ovato-oblongis brevi pediculo donatis, calycinis laciniis oblongo-acutis. *obſ. pl.* 178.

Hypericum villoſum erectum, caule rotundo. *I. R. H.* 255.

a. Hypericum foliis lanceolatis, calycinis laciniis linearibus. *obſ. pl.* 176. *ex hort. cliff. & fl. ſuec.*

* Hypericum elegantiſſimum non ramoſum, folio lato. *Bauh. hiſt.* 3. 383.

b. Hypericum minus erectum. *Pin.* 279. *ex hort. cliff.*

6. HYPERICUM floribus trigynis, fructu baccato, foliis ovatis pedunculo longioribus. *hort. cliff.* 380. *fl. leyd. prodr.* 473.

Androſæmum maximum fruteſcens. *Pin.* 280. TOUTE-SAINE.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA,

POLYGAMIA ÆQUALIS.

1. PRENANTHES floſculis quinis, foliis pinnato-haſtatis. *hort. cliff.* 383. *fl. leyd. prodr.* 120.

Chondrilla ſonchi folio, flore luteo palleſcente. *I. R. H.* 475.

1. CHONDRILLA. *hort. cliff.* 383. *fl. leyd. prodr.* 120.

Chondrilla juncea viscosa arvensis, quæ prima dioscoridis. *Pin.* 130. CONDRILLE.

1. LACTUCA caule & foliis aculeatis. *hort. cliff.* 384. *fl. leyd. prodr.* 121.

Lactuca sylvestris, costâ spinosâ. *Pin.* 123. LAITUE.

*—sylvestris, costâ spinosâ, foliis parum laciniatis.

*—sylvestris non laciniata. *Rai. syn.* 70.

2. LACTUCA foliis radicalibus linearibus dentato-pinnatis, laciniis sursum dentatis, caulinis alato-lanceolatis, floralibus linearibus sessilibus integris. *obs. pl.* 374.

Lactuca sylvestris, angusto laciniato folio. *Bot. monsp. app.*

3. LACTUCA foliis linearibus dentato-pinnatis, laciniis sursum dentatis. *hort. cliff.* 384. *fl. leyd. prodr.* 121.

Lactuca perennis humilior, flore cæruleo. *I. R. H.* 473.

*—ead. flore albo. *I. R. H.* 473.

1. HIERACIUM foliis integris ovato-oblongis, ſtolone repente, ſcapo nudo multifloro. *fl. ſuec.* 634.

Hieracium quod Piloſella major repens, minus hirſuta. *Pin.* 262. HERBE A L'EPERVIER.

2. HIERACIUM caule ramoſo, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minore. *hort. cliff.* 388. *fl. ſuec.* 637. *fl. leyd. prodr.* 123.

*—caule ramoſo, foliis ovatis dentatis. *fl. lapp.* 284.

Hieracium murorum, folio piloſiſſimo. *Pin.* 129. PULMONAIRE DES FRANÇOIS.

a. Hieracium murorum laciniatum, minus piloſum. *Pin.* 129. *ex hort. cliff.*

b. Hieracium idem folio anguſtiore. *Pin.* 129.

3. HIERACIUM foliis lanceolato-linearibus obſoletè denticulatis ſparſis. *fl. lapp.* 287. *hort. cliff.* 387. *fl. ſuec.* 639. *fl. leyd. prodr.* 123.

Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus. *Pin.* 129.

Hieracium fruticoſum latifolium

4. *HIERACIUM caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis, ſemi amplexicaulibus Hort. Upſ. 238.*

hirsutum. *Pin.* 129. *ex obs. pl.* 383.
α. Hieracium fruticosum latifolium, foliis dentatis, glabrum. *Pin.* 129.

β. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis, caule repente, scapo unifloro. *hort. cliff.* 388. *fl. suec.* 633. *fl. leyd. prodr.* 122.

Dens Leonis qui Piloſella officinarum. *I. R. H.* 469. PILOSELLE.

Piloſella major repens hirsuta. *Pin.* 262.

~~1. CREPIS foliis sagittato-dentatis, scapis ramulisque supernè conicè inflatis. *obs. pl.* 378.~~ *Huds.*

~~Chondrilla hieracii folio, annua. *I. R. H.* 475.~~

1. CREPIS foliis lanceolatis haſtatis ſeſſilibus: inferioribus dentatis. *fl. suec.* 640.

* Hieracium foliis radicalibus pinnato-dentatis. *hort. cliff.* 387. (caulinis lanceolatis vix denticulatis) *fl. lapp.* 286.

Hieracium minus Dioſcoridis. *tab. icon.* 181.

2. CREPIS foliis pinnatis angula-

tis, petiolis dentatis. *fl. leyd. prodr.* 126.

Hieracium foliis Cichorii ſylveſtris, odore Caſtorei. *bot. monſp.* FUSELE'E.

4. CREPIS qui hieracioides foliis variis ſubaſperis, caule altiſſimo folioſo & unifloro. *Hall. Helv.* 750.

Hieracium Erucæ-folium hirſutum. *Bauh. hiſt.* 1025.

a. Hieracium hirſutum luteum. *Bauh. hiſt.* 1024. *ex Hall. Helv.*

1. HYPOCHŒRIS foliis alternatim dentato-ſinuatis, caule nudo unifloro, pedunculis glabris. *hort. cliff.* 386. *fl. leyd. prodr.* 126.

Hieracium minus, dentis Leonis folio oblongo glabro. *Pin.* 127.

2. HYPOCHŒRIS foliis ſerrato-ſinuatis, caule ramoſo nudo, pedunculis ſquamoſis. *hort. cliff.* 386. *fl. leyd. prodr.* 125.

Hieracium dentis leonis folio obtuſo, majus. *Pin.* 127.

3. HYPOCHŒRIS caule ſubnudo, ramo ſubſolitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *hort. cliff.*

385. *fl. suec.* 631. *fl. leyd. prodr.* 125.

Hieracium alpinum latifolium hirsutum incanum, flore magno. *Pin.* 128.

*——idem maculatum. *Pin.* 128.

1. PICRIS calycibus imbricatis. *hort. cliff.* 387. *fl. suec.* 641. *fl. leyd. prodr.* 128.

Hieracium asperum majori flore in limitibus agrorum. *Bauh. hist.* 2. 24. 1029.

2. PICRIS calycibus simplicibus perianthio maximo obvallatis. *hort. cliff.* 387. *fl. leyd. prodr.* 128.

Hieracium echioides, capitulis Cardui Benedicti. *Pin.* 128.

1. HYOSERIS caule diviso nudo. *hort. cliff.* 386. *fl. suec.* 630. *fl. leyd. prodr.* 127.

Lampsana minor aphyllo-caulos. *act. Acad. reg. par.* 1721.

*Hieracium minus, folio subrotundo. *Pin.*

1. LEONTODON calyce infernè reflexo. *hort. cliff.* 386. *fl. lapp.* 280. *fl. suec.* 627. *fl. leyd. prodr.* 122.

Dens Leonis latiore folio. *Pin.* 126.

DENT DE LION, ou PISSENLIT.

*—ampliſſimo folio. *I. R. H.* 468. *a.* Dens Leonis anguſtiore folio. *Pin.* 126. *ex hort. cliff.*

2. LEONTODON foliis aſperrimis penè ſpinoſis pinnato ſinuatis, pappo plumoſo. *Hall. Helv.* 741.

Dens Leonis foliis minimis hirſutis & aſperis. *I. R. H.* 469.

3. LEONTODON qui Dens Leonis pumilus ſaxatilis aſper, radice fibroſâ. *hiſt. ox. 3. icon. tab. 7. ſect. 7. n.* 13.

4. LEONTODON calyce toto erecto hiſpido, foliis hiſpidis dentatis integerrimis. *hort. cliff.* 386. *fl. ſuec.* 628. *fl. leyd. prodr.* 122.

Dens Leonis foliis hirſutis & aſperis. *I. R. H.* 468.

5. LEONTODON calycibus erectis, foliis glabris dentatis integerrimis, pedunculis ſquamoſis. *fl. ſuec.* 629.

* Crepis foliis longis dentatis linearibus, caule declinato ſubnudo. *hort. cliff.* 386.

Hieracium Chondrillæ folio glabro, radice succisâ, majus. *Pin.* 127.

*——Chondrillæ folio, glabrum. *Pin.* 127.

*——foliis Coronopi. *Pin.* 128.

6. LEONTODON qui Dens Leonis tenuissimo folio. *Pin.* 126.

1. SCORZONERA scapo unifloro, foliis oblongo-lanceolatis. *obs. pl.* 370.

Scorzonera palustris pulveriflora. *hort. reg. par.* SCORSONAIRE.

2. SCORZONERA scapo unifloro, foliis lanceolato-linearibus. *obs. pl.* 370.

Scorzonera angustifolia prima. *Pin.* 275.

3. SCORZONERA foliis dentatis. *fl. leyd. prodr.* 120.

Scorzonera foliis laciniatis. *I. R. H.* 477.

1. TRAGOPOGON calycibus florem superantibus. *hort. cliff.* 382. *fl. suec.* 648. *fl. leyd. prodr.* 119.

Tragopogon pratense luteum majus. *Pin.* 274. BARBE DE BOUC, ou SALSIFIS.

α. Tragopogon luteo-pallidum, calice barbato. *bot. par.* 194. *ex hort. cliff.*

1. SONCHUS pedunculis tomentoſis. *fl. ſuec.* 643.

*—annuus ramoſus diffuſus, foliis laciniatis. *fl. lapp.* 289. *hort. cliff.* 384.

*—caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis ſummis amplexicaulibus, pedunculis inæqualibus. *fl. leyd. prodr.* 129.

Sonchus aſper non laciniatus. *Pin.* 124. LAITRON.

*—idem Dipſaci vel Lactucæ foliis. *Pin.* 124.

*—aſper laciniatus, folio Dentis Leonis. *Pin.* 124.

*—idem flore intùs albido, extùs purpuraſcente.

*—lævis laciniatus latifolius. *Pin.* 124.

*—lævis minor, paucioribus laciniis. *Pin.* 124.

*—ſubrotundo folio, noſtras, leviſſimis ſpinulis circa foliorum oras exaſperatus. *Pluk. Phytogr.*

2. SONCHUS pedunculis calycibuſque hiſpidis, floribus congeſtis. *fl. ſuec.* 642.

*— foliis lanceolato-oblongis dentatis, floribus congestis hispidis. *hort. cliff.* 384. *fl. leyd. prodr.* 129.

Sonchus repens, multis hieracium majus. *Bauh. hist.* 2. 1017.

3. SONCHUS caule erecto, foliis pinnato-hastatis, apice hastatis, floribus congestis villosis. *hort. cliff.* 385. *fl. leyd. prodr.* 129.

Sonchus lævis paluſtris altissimus. *Rai. hist.* 226.

1. LAPSANA calycibus fructûs angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *hort. cliff.* 384. *fl. suec.* 649. *fl. leyd. prodr.* 130.

Lampsana. *Dod.* 675. LAMPSANE.

*—maculis nigris aspersa.

1. CICHORIUM caule simplici, foliis dentato-sinuatis. *act. stock.* 1741. 203. *fl. suec.* 650.

*—caule simplici. *hort. cliff.* 389. *fl. leyd. prodr.* 130.

Cichorium sylvestre, sive officinarum. *Pin.* 125. CHICORE'E.

*—idem flore pallidè cæruleo.

*—sylvestre, flore roseo. *Pin.* 126.

*2. LAPSANA calycibus pyramidatis seminibus dapposis foliis oblongis subdentatis scapis nudis. Hort. Upsal. 2

* Crepis foliis sagittato-dentatis scapis nudis quæ superne corymbo inflatis. *obs. pl.* 378.

*—ſylveſtre, flore albo. *Pin.* 126.
*—ſylveſtre platicaulon. *Pin.* 126.
*—ſylveſtre, folio prorsùs integro. *Pin.* 125.
*—ſylveſtre, folio maculato. A FEUILLES PANACHE'ES.
*—ſylveſtre femifloſculis fimbriatis.
*—ſativum, florum ſemifloſculis laciniatis. *I. R. H.* 473.

1. ECHINOPS floribus capitatis, calycibus unifloris. *hort. cliff.* 391. *fl. leyd. prodr.* 144.

Echinopus major. *Bauh. hiſt.* 3. 69. OURSIN.

1. ARCTIUM. *hort. cliff.* 391. *fl. ſuec.* 651. *fl. leyd. prodr.* 144.

Lappa major, Arctium Dioſcoridis. *Pin.* 198. BARDANE, ou GLOUTERON.
*—ſive Bardana major, flore albo. *hiſt. ox.* 3. 147.
a. Lappa major montana, capitulis tomentoſis, ſive Arctium Dioſcoridis. *Pin.* 198. *ex hort. cliff. & fl. ſuec.*
b. Lappa major, capite maximo glabro. *bot. par.* 114. *ex obſ. pl.* 332.

CHONDRILLA Hieracii folio annua. I. R. H. 475.

1. SERRATULA foliis pinnatifidis, laciniâ terminatrice maximâ. *hort. cliff.* 391. *fl. suec.* 660. *fl. leyd. prodr.* 143.

Jacea nemorensis quæ Serratula vulgò. *I. R. H.* 444. SARRETTE.

*——ead. flore albo. *I. R. H.* 444.

2. SERRATULA foliis lanceolato-oblongis serratis. *hort. cliff.* 392. *fl. leyd. prodr.* 143.

Jacea nemorensis altissima, Persicæ folio. *I. R. H.* 444.

3. SERRATULA foliis dentatis spinosis. *fl. suec.* 662.

* Carduus radice repente, foliis lanceolatis dentatis, margine aculeato. *fl. lapp.* 293. *fl. leyd. prodr.* 133.

Cirsium arvense, Sonchi folio, radice repente, flore purpurascente. *I. R. H.* 448. CHARDON HE'MORRHOÏDAL.

*——idem flore albo. *I. R. H.*

*——idem caule tuberoso. *I. R. H.*

*——idem capite prolifero. *act. Acad. R. Sc.* 1718. 159.

1. ONOPORDUM foliis decur-

rentibus margine ſpinoſis. *hort. cliff.* 393. *fl. ſuec.* 653. *fl. leyd. prodr.* 134.

Carduus tomentoſus, Acanthi folio, vulgaris. *I. R. H.* 441.

* Onopordum vulgare, flore purpureo. *Act. Acad. reg. Sc.* 1718.

*—idem flore ſuaverubente. *Act. Acad. reg. Sc.* 1718.

* Carduus totus viridis, Acanthi folio, vulgaris.

1. CARDUUS ſquamis calycinis margine & apice ſpinoſis. *hort. cliff.* 393. *fl. leyd. prodr.* 133.

Carduus albis maculis notatus, vulgaris. *Pin.* 381. CHARDON MARIE.

* Silybum albis maculis notatum, flore purpureo. *Act. Acad. reg. Sc.* 1718.

2. CARDUUS foliis ſinuatis decurrentibus, denticulis ſuperficieque ſpinoſis. *hort. cliff.* 392. *fl. ſuec.* 653. *fl. leyd. prodr.* 132.

Carduus lanceolatus latifolius. *Pin.* 385. CHARDON.

*—idem flore albo. *hort. reg. par.*

3. CARDUUS foliis ſinuatis de-

currentibus, denticulis & ſuperficie ſpinoſis, calycibus lanigeris. *fl. leyd. prodr.* 133.

Carduus capite rotundo tomentoſo. *Pin.* 382.

4. CARDUUS foliis ſpinoſis ſemidecurrentibus, floribus nutantibus, ſquamis calycinis ſupernè patentibus. *act. ſtock.* 1741. 204. *fl. ſuec.* 655.

*—foliis ſinuatis decurrentibus margine ſpinoſis, floribus ſolitariis nutantibus. *hort. cliff.* 393. *fl. leyd. prodr.* 132.

Carduus nutans. *Bauh. hiſt.* 3. 56.

*—idem flore ſuaverubente.

*—idem flore albo. *Bauh. hiſt.*

5. CARDUUS foliis ſinuatis decurrentibus margine ſpinoſis, floribus confertis terminatricibus nutantibus. *hort. cliff.* 393. *fl. ſuec.* 658. *fl. leyd. prodr.* 133.

Carduus caule criſpo. *Bauh. hiſt.* 3. 59.

*—idem flore ſuaverubente.

6. CARDUUS foliis laciniatis

ſubtùs tomentoſis ex margine ſpinoſis, capitulis ſeſſilibus congeſtis aculeatis. *Hall. Helv.* 677.

Carduus acanthoides. *Bauh. hiſt.* 3. 59.

7. CARDUUS acaulis, calyce glabro. *act. ſtock.* 1741. 204. *fl. ſuec.* 656.

Cirſium acaulos, flore purpureo. *I. R. H.* 448. HERBE AUX VARICES.

*—idem flore dilutè purpuraſcente.

*—idem flore albo.

8. CARDUUS foliis lanceolatis decurrentibus denticulatis inermibus, calyce ſpinoſo. *hort. cliff.* 392.

Cirſium anglicum. *lob. ic.* 583.

*—majus, ſingulari capitulo magno, vel incanum variè diſſectum. *Pin.* 377.

9. CARDUUS foliis linearibus dentatis ſpinoſiſſimis, caule criſpo ſpinoſo ramoſo, floribus erectis. *fl. leyd. prodr.* 134. *fl. ſuec.* 659.

Cirſium pratenſe polycephalon vulgare. *I. R. H.* 448.

*—idem flore albo.

1. CARTHAMUS foliis radicalibus dentatis, caulinis pinnatis, omnibus inermibus. *obſ. pl.* 330. CARTHAME.

Cnicus cæruleus humilis & mitior. *I. R. H.* 451.

2. CARTHAMUS foliis amplexicaulibus acuminatè dentatis. *hort. cliff.* 394. *fl. leyd. prodr.* 136.

Cnicus Atractylis lutea dictus. *hort. lugd. bat.* 164. CHARDON BE'NI DES PARISIENS.

1. CARLINA caule multifloro corymboſo. *hort. cliff.* 395. *fl. ſuec.* 652. *fl. leyd. prodr.* 135. CARLINE.

Carlina ſylveſtris vulgaris. *cluſ. hiſt.* 157.

1. CHRYSOCOMA calycibus laxis. *hort. cliff.* 396. *fl. leyd. prodr.* 145.

Conyza linariæ folio. *I. R. H.* 455.

1. EUPATORIUM foliis digitatis. *hort. cliff.* 396. *fl. leyd. prodr.* 155. *act. ſtock.* 1741. 204. *fl. ſuec.* 665.

Eupatorium cannabinum. *Pin.* 320. EUPATOIRE.

*—idem floribus albis. *fl. bat.* 26.

1. TANACETUM foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis inciſis ſerratis. *hort. cliff.* 398. *fl. ſuec.* 666. *fl. leyd. prodr.* 185.

*—foliis pinnatis planis, pinnis ſertatis. *fl. lapp.* 295.

Tanacetum vulgare luteum. *Pin.* 132. TANE'SIE.

1. BIDENS coronâ ſeminum retrorſum aculeatâ, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus nutantibus. *fl. ſuec.* 664.

Bidens folio non diſſecto. *Cæſalp.* 488. TESTE CORNUE.

2. BIDENS coronâ ſeminum retrorſum aculeatâ, foliis trifidis. *fl. ſuec.* 663.

*—coronâ ſeminum retrorſum aculeatâ, ſeminibus erectis. *hort. cliff.* 399. *fl. leyd. prodr.* 157.

Bidens foliis tripartito-diviſis. *Cæſalp.* 488.

*—idem caule purpuraſcente.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

1. GNAPHALIUM caule simplicissimo, corymbo simplici terminatrici, sarmentis procumbentibus. *hort. cliff.* 400. *fl. suec.* 672. *fl. leyd. prodr.* 147.

*——caule simplicissimo floribus coronatis terminato. *fl. lapp.* 302.

*——sexubus tota planta distinctis. *Hall. Helv.* 698.

Elichrysum montanum, flore rotundiore subpurpureo. *I. R. H.* 458. PIE' DE CHAT.

*——montanum, flore rotundiore suaverubente. *I. R. H.*

*——montanum, flore rotundiore variegato. *I. R. H.*

*——montanum, flore rotundiore candido. *I. R. H.*

a. Elichrysum montanum, longiore & folio & flore purpureo. *I. R. H.* 453. *ex hort. cliff.*

*——montanum, longiore & folio & flore albo. *I. R. H.*

2. GNAPHALIUM floribus sparsis per caulem simplicissimum. *fl. lapp.*

398. *hort. cliff.* 402. *fl. ſuec.* 675. *fl. leyd. prodr.* 148.

Elichryſum ſpicatum. *I. R. H.* 453.

3. GNAPHALIUM foliis ~~lineari-~~ ~~bus, caule fruticoſo ramoſo, corym-~~ ~~bo compoſito terminatrici. *hort. cliff.* 401.~~

Elichryſum ſylveſtre latifolium, capitulis conglobatis. *Pin.* 264. IMMORTELLE.

4. GNAPHALIUM caule ramoſo diffuſo, floribus confertis terminatricibus. *fl. lapp.* 300, *hort. cliff.* 402. *fl. ſuec.* 672. *fl. leyd. prodr.* 148.

Elichryſum aquaticum ramoſum minus, capitulis foliatis. *I. R. H.* 452.

5. GNAPHALIUM caule erecto dichotomo, floribus in alis ſeſſilibus. *fl. lapp.* 299. *fl. ſuec.* 677. *fl. leyd. prodr.* 148.

Filago ſeu Impia. *Dod. pempt.* 66. HERBE A COTTON.

6. GNAPHALIUM caule ramoſo diffuſo, floribus confertis lanâ tectis.

hort. cliff. 402. *fl. leyd. prodr.* 148.

Filago ſeu Impia capitulis lanuginoſis. *bot. par.* 52.

* Gnaphalium minus, latioribus foliis. *Pin.* 263.

7. GNAPHALIUM paniculatum hirſutum. *fl. ſuec.* 679.

Filago altera. *Dod. pempt.* 67.

8. GNAPHALIUM caule ramoſo, foliis longis & anguſtis, glomerulis florum ſubſtratis. *Hall. Helv.* 703.

Filago vulgaris, tenuiſſimo folio, erecta. *I. R. H.* 454.

9. GNAPHALIUM caule erecto diviſo, floribus pyramidatis lateralibus axillaribuſque. *fl. ſuec.* 678.

Filago minor. *Ger. emac.* 641.

1. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus erectis. *hort. cliff.* 404. *fl. ſuec.* 667. *fl. leyd. prodr.* 153.

Artemiſia vulgaris major. *Pin.* 137. ARMOISE.

2. ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caule procumbente. *fl. ſuec.* 668.

*——foliis ramoſis linearibus, caule procumbente. *hort. cliff.* 403.

Abrotanum campeſtre cauliculis albicantibus. *Pin.* 136. AURONE.

* Artemiſia tenuifolia. *Dod. pempt.* 33.

* Abrotanum campeſtre, cauliculis rubentibus. *Pin.* 136.

1. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymboſo. *hort. cliff.* 405. *fl. leyd. prodr.* 157.

Conyza major vulgaris. *Pin.* 265. CONISE.

1. ERIGERON pedunculis alternis unifloris. *hort. cliff.* 407. *fl. ſuec.* 691. *fl. leyd. prodr.* 165.

Aſter arvenſis cæruleus acris. *I. R. H.* 481.

2. ERIGERON foliis undulatis amplexicaulibus. *fl. ſuec.* 693.

* Conyza ramis ſecundum flores gradatim enaſcentibus, foliis lanceolatis obtuſis. *hort. cliff.* 405.

Aſter paluſtris, parvo flore globoſo. *I. R. H.* 483.

3. ERIGERON floribus panicula-

tis. *hort. cliff.* 407. *fl. leyd. prodr.* 166.

Virga aurea virginiana annua. *Zan.* 205.

1. TUSSILAGO scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis. *hort. cliff.* 411. *fl. suec.* 680. *fl. leyd. prodr.* 159.

Tussilago vulgaris. *Pin.* 197. TUSSILAGE, ou PAS D'ANE.

2. TUSSILAGO scapo imbricato thyrsifero, floseulis omnibus hermaphroditis. *hort. cliff.* 411. *fl. leyd. prodr.* 159. *fl. suec.* 683.

Petasites major & vulgaris. *Pin.* 197. PE'TASITE, ou HERBE AUX TEIGNEUX.

1. DORONICUM foliis ovatis acutis obsoletè dentatis, ramis alternis. *hort. cliff.* 411. *fl. leyd. prodr.* 160.

Doronicum Plantaginis folio. *Pin.* 184. DORONIC.

1. SOLIDAGO caule erecto, racemis alternis erectis. *hort. cliff.* 409. *fl. suec.* 685. *fl. leyd. prodr.* 161.

---

4. ERIGERON pedunculis unifloris lateralibus, calycibus squarrosis. Hort. Ups. 258.

* Aster foliis serratis, petiolis simplicibus lateralibus unifloris longitudine folii foliosis id. Hort

*—floribus per caulem ſimplicem undique ſparſis. *fl. lapp.* 306.

Virga aurea vulgaris latifolia. *Bauh. hiſt.* 2. 1062. VERGE D'OR.

1. SENECIO foliis ſinuato-pinnatis amplexicaulibus, floribus nudis ſparſis. *fl. leyd. prodr.* 165. *fl. ſuec.* 690.

*—foliis pinnatifidis denticulatis, laciniis æqualibus patentiſſimis, rachi lineari. *hort. cliff.* 406.

Senecio minor vulgaris. *Pin.* 131. SENEÇON.

2. SENECIO foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. *fl. ſuec.* 688.

*—foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis. *hort. cliff.* 406. *fl. leyd. prodr.* 164.

Jacobæa vulgaris laciniata. *Pin.* 131. JACOBE'E.

*—altiſſima luſitanica tenuiſſimè laciniata. *I. R. H.* 485.

a. Jacobæa vulgaris, foliis inſtar Erucæ laciniatis. *I. R. H.* 485. *ex fl. ſuec.*

cliff. 409. fl. Leyd. prodr. 169.
Virga aurea minor, foliis glutinosis et graveolentibus
I. R. H. 484

b. Jacobæa latifolia paluſtris, ſive aquatica. *Rai. hiſt.* 1. 285. *ex Hall. Helv.* 732.

5. SENECIO foliis pinnatis, pinnis linearibus apice inciſis ſubtùs incanis. *Hall. Helv.* 732.

Jacobæa Senecionis folio incano, perennis. *Rai. hiſt.* 1. 285.

4. SENECIO foliis pinnatifidis ſeſſilibus, lacinulis anguloſis, ſuperioribus latioribus, florum radiis diſco brevioribus. *fl. leyd. prodr.* 164.

*—foliis pinguibus pinnatis, pinnis alternè breviſſimis, radiis perexiguis. *Hall. Helv.* 732.

Jacobæa pannonica prima. *Cluſ. hiſt.* 21.

5. SENECIO foliis pinnatifidis denticulatis, florum radiis revolutis linearibus. *fl. ſuec.* 689.

* Doria quæ Senecio minor, latiore folio, ſive montana. *obſ. pl.* 363.

Jacobæa quæ Senecio minor, latiore folio, ſive montana. *Pin.* 131.

6. SENECIO foliis decompoſitis. *obſ. pl.* 360.

*—foliis ramoſis, nervo & pinnulis planis & anguſtiſſimis, floribus umbellatis. *Hall. Helv.* 734.

Jacobea foliis ferulaceis, flore minore. *I. R. H.* 486.

7. SENECIO foliis integris ſerratis. *obſ. pl.* 359.

*—foliis longiſſimè mucronatis ſerratis ſubtùs incanis, floribus umbellatis. *Hall. Helv.* 735.

Jacobæa paluſtris altiſſima, foliis ſerratis. *I. R. H.* 485.

8. SENECIO foliis lingulatis tomentoſis ſimpliciſſimis. *Hall. Helv.* 736.

Jacobæa montana lanuginoſa anguſtifolia non laciniata. *Pin.* 131.

1. ASTER foliis lanceolatis amplexicaulibus ſerrato-ciliatis glabris acuminatis recurvis, floribus ſolitariis, caule ſtriato. *fl. ſuec.* 696.

Aſter montanus luteus, ſalicis folio glabro. *Pin.* 266. ASTRE.

2. ASTER foliis lanceolatis ſeſſilibus integerrimis, caulibus ſimplicibus unifloris, ſquamis calicinis ſubulatis.

Aſter luteo flore, aliis Conyzæ ſpecies. *Cam. epit.* 907.

3. ASTER foliis ſemiamplexicaulibus oblongis, caule paniculato hirſuto, floribus latis, ſquamis calycinis ſetaceis. *fl. ſuec.* 694.

Aſter pratenſis autumnalis, Conyzæ folio. *I. R. H.* 482.

4. ASTER incanus, Verbaſci folio, villoſus. *I. R. H.* 482.

* Conyza incana. *Pin.* 265.

5. ASTER foliis ſemiamplexicaulibus oblongis crenatis, caule ramoſo, ſquamis calycinis ſetaceis. *obſ. pl.* 357.

* Aſter paluſtris luteus, folio longiori lanuginoſo. *I. R. H.* 483.

6. ASTER foliis ovatis rugoſis ſubtùs tomentoſis amplexicaulibus, calycum ſquamis ovatis patulis. *hort. cliff.* 407. *fl. ſuec.* 695. *fl. leyd. prodr.* 166. *act. ſtock.* 1743. 112.

Aſter omnium maximus, helenium dictus. *I. R. H.* 482. AUNE'E.

7. ASTER foliis ſerratis, petiolis ſimplicibus lateralibus unifloris lon-

gitudine folii folioſis. *hort. cliff.* 409. *fl. leyd. prodr.* 169.

Virga aurea minor, foliis glutinoſis & graveolentibus. *I. R. H.* 484.

1. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus ſupernè laciniatis infernè dentato-ſerratis. *hort. cliff.* 416. *fl. ſuec.* 699. *fl. leyd. prodr.* 174.

Chryſanthemum ſegetum. *lob. ic.* 552.

*—ſegetum noſtras, folio glauco multifidiſſo, majus, flore minore. *Pluk. alm. bot.*

*—ſegetum noſtras, Calendulæ folio glauco neque ſecto, neque ſerrato. *Pluk. alm. bot.*

2. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus ſupernè ſerratis, infernè dentatis. *hort. cliff.* 416. *fl. ſuec.* 700.

*—foliis oblongis ſerratis. *fl. lapp.* 310.

Leucanthemum vulgare. *I. R. H.* 492. GRANDE MARGUERITE.

*—idem caule villis caneſcente. *I. R. H.* 492.

1. MATRICARIA foliis compoſitis planis, foliolis ovatis inciſis, pe-

dunculis ramosis. *hort. cliff.* 416. *fl. leyd. prodr.* 173.

Matricaria vulgaris. *Pin.* 133. MATRICAIRE.

2. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *fl. suec.* 701.

* Anthemis foliis pinnato-decompositis, laciniis setaceis. *hort cliff.* 415. *fl. leyd. prodr.* 172.

Chamæmelum nobile, sive Leucanthemum odoratius. *Pin.* 135. CAMOMILLE.

3. MATRICARIA receptaculis hemisphæricis, radiis patentibus, seminibus coronato-marginatis, squamis calycinis margine exsoletis. *fl. suec.* 702.

*—foliis supra decompositis setaceis, pedunculis solitariis. *hort. cliff.* 415. *fl. leyd. prodr.* 173.

* Anthemis vulgaris. *fl. lapp.* 309.

Chamæmelum vulgare, Leucanthemum Dioscoridis. *Pin.* 135.

*—majus, folio tenuissimo, caule rubente. *hort. reg. monsp.*

*—idem flore pleno, *bot. par.*

*—majus folio tenuiſſimo, caule rubro, flore pleno. *I. R. H.* 494.

1. ANTHEMIS receptaculis conicis, paleis ſetaceis, ſeminibus nudis. *fl. ſuec.* 703.

*—foliis pinnato-decompoſitis, laciniis linearibus, caulibus diffuſis, radice annuâ. *fl. leyd. prodr.* 172.

Chamæmelum fœtidum. *Pin.* 135. MAROUTE.

*—idem ſemyfloſculis fiſtuloſis.

*—idem flore pleno. *I. R. H.* 494.

2. ANTHEMIS receptaculis conicis, paleis lanceolatis, ſeminibus coronato-marginatis. *fl. ſuec.* 704.

Chamæmelum inodorum. *Pin.* 135.

3. ANTHEMIS foliis ſingularibus pinnato-dentatis. *obſ. pl.* 2. 347.

Chamæmelum luſitanicum latifolium, ſive Coronopi folio. *Breyn. cent.* 1. 149.

1. ACHILLEA foliis duplicato-pinnatis glabris, laciniis linearibus acutè laciniatis. *hort. cliff.* 413. *fl. ſuec.* 705. *fl. leyd. prodr.* 175.

*—foliis pinnato-pinnatis. *fl. lapp.* 311.

Millefolium vulgare album. *Pin.* 140. MILLEFEUILLE.

*—vulgare purpureum minus. *Pin.* 140.

2. ACHILLEA foliis acutis integris minutiſſimè ſerratis. *act acad. reg. par.* 1720. 416. *hort. cliff.* 412. *fl. ſuec.* 706. *fl. leyd. prodr.* 176.

Ptarmica vulgaris, folio longo ſerrato, flore albo. *Bauh. hiſt.* 3. 147.

1. BELLIS ſcapo nudo unifloro. *hort. cliff.* 418. *fl. ſuec.* 707. *fl. leyd. prodr.* 177.

Bellis ſylveſtris minor. *Pin.* 261. PAQUERETTE.

*—ead. petalis ex candido rubris. *Pin.* 261.

*—ead. petalis ex albo & rubro mixtis. *Pin.* 261.

*—ead. duplici ſemifloſculorum ſerie in flore.

*—ead. petalis intùs rubris in ambitu albis. *Pin.* 261.

POLYGAMIA

POLYGAMIA, FRUSTRANEA.

1. CENTAUREA calycibus ſerratis, foliis linearibus infimis dentatis, ſuperioribus integerrimis. *hort. cliff.* 423. *fl. ſuec.* 710. *fl. leyd. prodr.* 142.

Cyanus ſegetum, flore cæruleo. *Pin.* 373. BLUET, ou BARBEAU.

*——ſegetum, flore albo. *Pin.*

*——ſegetum, flore dilutè ianthino. *Pin.*

*——ſegetum, flore incarnato. *hort. Eyſt.*

*——hortenſis, atro purpuraſcente flore. *hort. reg. par.*

2. CENTAUREA calycibus ſquamoſis, foliis lanceolatis, radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis. *hort. cliff.* 421. *fl. ſuec.* 709. *fl. leyd. prodr.* 142.

Jacea nigra pratenſis latifolia. *Pin.* 271. JACE'E.

*——ead. floribus carneis. *hiſt. ox.*

*——ead. flore albo. *I. R. H.*

*——coronata, purpureis floribus.

*——coronata, carneis floribus.

*——coronata, albis floribus.

*——coronata purpurea, floſculis tenuiſſimè diſſectis.

3. CENTAUREA calycibus ciliatis, ciliis ſetaceis. *obſ. pl.* 317.

Jacea cum ſquamis cilii inſtar piloſis. *Bauh. hiſt.* 3. 28.

4. CENTAUREA calycibus ciliatis, ciliis ſetaceis reflexis. *hort. cliff.* 422. *fl. leyd. prodr.* 139.

Jacea latifolia, capite hirſuto. *Pin.* 271.

*—latifolia diſſecta, capite hirſuto.

5. CENTAUREA calycibus ciliatis ſubrotundis, foliis pinnatifidis. *hort. cliff.* 422. *fl. ſuec.* 708. *fl. leyd. prodr.* 139.

Jacea vulgaris laciniata, flore purpureo. *I. R. H.* 443.

*—ead. flore carneo.

*—ead. flore albo. *I. R. H.*

a. Jacea ſupina incana purpurea. *bot. par.* 107.

*—ſupina incana coronata purpurea. *bot. par.* 107.

6. CENTAUREA calycibus ſubulato-ſpinoſis ſeſſilibus, foliis linearibus pinnatifidis. *hort. cliff.* 423. *fl. leyd. prodr.* 140.

Carduus ſtellatus, ſive Calcitrapa. *Bauh. hiſt.* 3. 89.

Calcitrapa officinarum, flore purpuraſcente. *act. Acad. reg. Sc.* 1718. CHAUSSE-TRAPE. CHARDON ETOILE'.

*—idem flore intensè purpureo. *I. R. H.* 440.

*—idem flore ſuaverubente. *I. R.H.* 440.

*—idem flore albo. *hort. reg. par.*

*—idem multiflorus, capitulo longiore. *bot. par.*

a. Carduus ſtellatus, foliis integris ſerratis. *bot. monſp.*

7. CENTAUREA calycibus duplicato-ſpinoſis, foliis decurrentibus inermibus lanceolatis, radicalibus haſtato-pinnatis. *hort. upſ.* 272.

Carduus ſtellatus luteus, foliis Cyani. *Pin.* 387.

1. CNICUS caule erecto, foliis inferioribus laciniatis, ſuperioribus integris. *hort. cliff.* 394. *fl. ſuec.* 711. *fl. leyd. prodr.* 136.

Cnicus pratenſis acanthi folio, flore flaveſcente. *I. R. H.* 450.

*—idem flore purpureo.
*—pratenſis, foliis inferioribus integris, ſuperioribus laciniatis. *bot. par.*

POLYGAMIA, NECESSARIA.

1. CALENDULA ſeminibus radii cymbiformibus echinatis, diſci bicornibus. *hort. cliff.* 425. *fl. ſuec.* 712. *fl. leyd. prodr.* 177.

Caltha arvenſis. *Pin.* 276. SOUCI.

POLYGAMIA, MONOGAMIA.

1. JASIONE foliis lineari-lanceolatis obſoletè ſerratis. *hort. cliff.* 426. *fl. ſuec.* 713. *fl. leyd. prodr.* 191.

Rapunculus Scabioſæ capitulo cæruleo. *Pin.* 92.
*—Scabioſæ capitulo albo. *Pin.* 92.

1. LOBELIA foliis oblongo-ovatis, floribus laxè ſpicatis. *obſ. pl.* 35.

Rapuntium urens ſolonienſe. *hort. reg. Bleſ.* CARDINALE.

1. VIOLA acaulis, ſtolonibus teretibus reptantibus, pedunculis radicalibus. *hort. cliff.* 427. *fl. ſuec.* 715. *fl. leyd. prodr.* 431.

Viola martia purpurea, flore ſimplici odoro. *Pin.* 199. VIOLETTE.

*——martia alba. *Pin.*

2. VIOLA caulibus adſcendentibus floriferis, foliis cordatis. *hort. cliff.* 427. *fl. ſuec.* 716. *fl. leyd. prodr.* 430. *fl. virg.* 182.

*——foliis cordatis oblongis, pedunculis ſubradicatis. *fl. lapp.* 277.

Viola martia inodora, ſylveſtris, flore cæruleo. *Pin.* 199.

*——ead. flore pallido. *Pin.*

*——ead. flore violaceo & albo mixto.

3. VIOLA acaulis, foliis cordatis hiſpidis. *fl. ſuec.* 718.

*——acaulis, ſtolonibus repentibus deſtituta. *Hall. Helv.* 500.

Viola martia major, hirſuta inodora. *hiſt. ox.* 2. 475.

an. Viola martia inodora ſylveſtris, foliis mucronatis oblongis & ſtrictioribus. *Pin.* 199?

4. VIOLA foliis ovato-lanceolatis, caule recto erecto, ſtipulis dentatis. *fl. leyd. prodr.* 430.

Viola martia arboreſcens purpurea, *Pin.* 199.

5. VIOLA foliis oblongis inciſis,

ſtipulis dentatis, caule diffuſo. *fl. ſuec.* 721.

*——pedunculis caulinis angulatis, ſtipulis oblongis pinnato-dentatis, foliis ovato-oblongis crenatis. *hort. cliff.* 427. *fl. leyd. prodr.* 431.

Viola bicolor arvenſis, flore candido & luteo. *Pin.* 200. PENSE'E.

a. Viola tricolor hortenſis repens, flore nigro purpureo & inſtar holoſerici nitente. *Pin.* 200. *ex hort. cliff. & fl. ſuec.*

b. Viola tricolor hortenſis repens. *Pin.* 199. *ex hort. cliff. & fl. ſuec.*

6. VIOLA acaulis, foliis reniformibus. *Hall. Helv.* 501. *fl. ſuec.* 717.

*——foliis ſubrotundo-cordatis, pedunculis radicatis. *fl. lapp.* 278.

Viola paluſtris rotundifolia glabra. *hiſt. ox.* 2. 475.

*——ead. flore cæruleo & luteo. *Pin.*

*——ead. flore toto albo. *Pin.*

1. IMPATIENS pedunculis multifloris, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *fl. ſuec.* 722.

*——pedunculis ſolitariis multifloris.

hort. cliff. 428. *fl. leyd. prodr.* 431.

Balſamina lutea, ſive noli me tangere. *Pin.* 306. BELSAMINE.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA, DIANDRIA.

1. ORCHIS bulbis indiviſis, Nectarii labio quinquefido punctis ſcabro, cornu obtuſo, petalis conniventibus. *act. upſal.* 1740. *p.* 11. *fl. ſuec.* 725.

Orchis militaris major. *I. R. H.* 432.

*——militaris minor. *I. R. H.* 432.

a. Orchis latifolia, hiante cucullo, major. *I. R. H.* 432. *ex act. upſal.* 1740.

*——galeâ & alis ferè cinereis. *Bauh. hiſt.* 2. 755.

b. Orchis flore ſimiam referens. *Pin.* 82. flore purpureo. *ex act. upſ.* 1740.

*——ead. flore dilutè carneo.

*——ead. flore albo.

2. ORCHIS bulbis indiviſis, Nectarii labio quadrifido punctis ſcabro, cornu obtuſo, petalis diſtinctis. *act. upſ.* 1740. *p.* 11. *fl. ſuec.* 726.

Orchis militaris pratenſis humilior. *I. R. H.* 432.

3. ORCHIS bulbis indiviſis, Nectarii labio trifido reflexo crenato, cornu brevi, petalis conniventibus. *act. upſ.* 1740. *p.* 8.

Orchis odore hirci minor. *Pin.* 82.

*——ead. flore ſubviridi.

4. ORCHIS bulbis indiviſis, Nectarii labio quadrifido crenulato, cornu obtuſo. *act. upſ.* 1740. *p.* 8. *fl. ſuec.* 724.

*——radicibus ſubrotundis, Nectarii labio quadrifido æquali crenulato, cornu obtuſo. *fl. leyd. prodr.* 15.

Orchis morio fœmina. *Pin.* 82.

*——ead. flore roſeo. *hort. reg. par.*

*——ead. flore niveo & verſicolore. *hort. reg. par.*

*——ead. flore carneo. *Rai. hiſt.*

*——ead teſticulis ternis.

*——morio fœmina parva.

a. Orchis morio fœmina procerior, majori flore. *hiſt. par.* 1508. Orchis anguſtifolia. *Pin.* 83. flore intenſe purpureo. *ex act. upſ.*

*——ead. flore dilutè purpureo.

*——ead. flore ex albo & purpureo variegato.

*——ead. flore albo.

*——ead. flore albo cum alis variegatis.

b. Orchis teſticulata, anguſto folio, ſerotina. *bot. par.* 150. *ex act. upſ.*

c. Orchis morio mas, foliis maculatis. *Pin.* 81. *ex act. upſ.*

*——ead. flore roſeo.

*——ead. foliis non maculatis. *bot. par.* 151. Orchis major tota purpurea non maculata. *Bauh. hiſt.* 2. 19. 760.

5. ORCHIS bulbis indiviſis, Nectarii labio lanceolato integerrimo, cornu longiſſimo, petalis patentibus. *act. upſ.* 1740. *p.* 5. *fl. ſuec.* 723.

Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Pin.* 83.

*——trifolia major & minor. *Pin.* 83.

6. ORCHIS bulbis indiviſis, nec-

tarii labio trifido anticè bidentato, cornu longo, petalis acuminatis. *act. upſ.* 1740. *p.* 7.

*——radicibus ſubrotundis, bracteis flore brevioribus, nectarii labio trifido, ſetâ longiſſimâ. *hort. cliff.* 429.

Orchis militaris montana, ſpicâ rubente conglomeratâ. *I. R. H.* 432.

7. ORCHIS bulbis ſubpalmatis rectis, nectarii cornu conico, labio trilobo integerrimo, bracteis flore longioribus. *act. upſ.* 1740. *p.* 15. *fl. ſuec.* 728.

*——radicibus palmatis, bracteis flore longioribus, nectarii labio trifido, cornu germinibus breviore. *hort. cliff.* 429.

Orchis palmata pratenſis latifolia, longis calcaribus. *Pin.* 85. Item orchis palmata paluſtris latifolia. éjuſd.

*——ead. flore carneo. *hort. reg. monſp.*

*——ead. flore albo. *hort. reg. monſp.*

*——ead. flore ſuaverubente, cum lituris purpureis. *hiſt. par.* 509.

8. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus

breviore, labio crenato, petalis dorſalibus patulis. *act. upſ.* 1740. *p.* 14. *fl. ſuec.* 729.

Orchis palmata pratenſis maculata. *Pin.* 85.

*——ead. flore variegato. *Pin.*

*——ead. flore albo. *Pin.*

9. ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu ſetaceo germinibus longiore, labio crenato. *act. upſ.* 1740. *p.* 13. *fl. ſuec.* 727.

*——radicibus palmatis, bracteis longitudine floris, nectarii labio trifido, ſetâ germinibus longiore. *hort. cliff.* 429.

Orchis palmata minor, calcaribus oblongis. *Pin.* 85.

*——ead. flore dilutiori.

10. ORCHIS bulbis faſciculatis filiformibus, nectarii labio ovato integerrimo. *act. upſ.* 1740. *p.* 17.

Limodorum auſtriacum. *Cluſ. hiſt. Pann.* 241.

1. SATYRIUM bulbis indiviſis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido; intermediâ lineari obliquâ præ-

morsâ. *act. upſ.* 1740. *p.* 18.

Orchis barbata fœtida. *Bauh. hiſt.* 2. 756.

*——barbata, odore hirci, breviore latioreque folio. *Pin.* 82.

2. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis oblongis obtuſis, nectarii labio trifido lineari: intermediâ obſoletâ. *act. upſ.* 1740. *p.* 18. *fl. ſuec.* 730.

*——foliis oblongis caulinis. *fl. lapp.* 313.

Orchis palmata, Batrachites. *Pin.* 86.

1. SERAPIAS bulbis fibroſis, nectarii labio obtuſo petalis breviore. *act. upſ.* 1740. *p.* 21. *fl. ſuec.* 734.

*——caule multifolio multifloro. *hort. cliff.* 429. *fl. leyd. prodr.* 13.

Helleborine latifolia montana. *Pin.* 186. HELLE'BORINE.

a. Helleborine paluſtris noſtras. *Rai. hiſt.* 1231. *ex hort. cliff.*

b. Helleborine flore albo, vel Damaſonium montanum latifolium. *Pin.* 187. *ex act. upſ.*

c. Helleborine montana anguſtifolia

purpurascens. *Pin.* 187. *ex act. upsal. d.* Serapias radicibus fibrosis, nectarii labio obtuso petalis breviore, foliis ensiformibus. *act. stock.* 1741. *p.* 208. *ex fl. suec.*

Helleborine foliis prælongis angustis, floribus candidis. *bot. par.* 97.

1. HERMINIUM bulbo infra radicato, nectarii labio bifido. *act. upsal.* 1740. *p.* 31. *fl. suec.* 741.

*——radicibus ovatis tunicatis, scapo nudo. *hort. cliff.* 429.

Ophris bifolia bulbosa. *Pin.* 87.

1. NEOTTIA bulbis fasciculatis, nectarii labio bifido. *act. upsal.* 1740. *p.* 33. *fl. suec.* 742.

Nidus avis. *Lugd. hist.* 1073. Nid d'Oiseau.

2. NEOTTIA bulbis subrotundis, nectarii labio quadrifido. *act. upsal.* 1740. *p.* 32.

Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, fœmina. *Pin.* 82.

3. NEOTTIA bulbis fasciculatis, nectarii labio indiviso. *act. upsal.* 1740. *p.* 32.

Orchis ſpiralis alba odorata. *Bauh. hiſt.* 2. 769.

a. Orchis ſpiralis alba odorata, longo anguſtoque folio. *bot. par.* 147. *ex obſ. pl.* 216.

1. OPHRYS foliis ovatis. *hort. cliff.* 429. *act. upſ.* 1740. 28. *fl. ſuec.* 738. *fl. leyd. prodr.* 15.

Ophrys bifolia. *Pin.* 87. DOUBLE-FEUILLE.

*—trifolia. *Pin.* 87.

1. CYPRIPEDIUM bulbis ſubrotundis, foliis oblongis caulinis. *act. upſ.* 1740. *p.* 26. *fl. ſuec.* 737.

Orchis fucum referens, colore rubiginoſo. *Pin.* 83.

a. Orchis ead. flore ſubvirente. *Pin.* 83. *ex act. upſ.*

b. Orchis fucum referens major, foliolis ſuperioribus candidis & purpuraſcentibus. *Pin.* 83. *ex act. upſ.*

c. Orchis ſerotina, fucum referens major, foliolis ſuperioribus candidis & purpuraſcentibus. *bot. par.* 147. *ex act. upſ.*

d. Orchis muſcæ corpus referens, mi-

nor, & galeâ & alis herbidis. *Pin.* 83. *ex act. upſ.*

HEXANDRIA.

1. ARISTOLOCHIA foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *hort. upſ.* 279.

Ariſtolochia Clematitis recta. *Pin.* 307. ARISTOLOCHE.

POLYANDRIA.

1. ARUM acaule, foliis haſtatis integerrimis, ſpadice clavato. *hort. cliff.* 434. *fl. ieyd. prodr.* 8.

Arum vulgare non maculatum. *Pin.* 195. PIED DE VEAU.

*——idem folio ſubrotundo. *hort. reg. par.*

a. Arum maculatum, maculis nigris. *Pin.* 195. *ex hort. cliff.*

*——idem folio ſubrotundo. *hort. reg. par.*

b. Arum maculatum, maculis candidis. *Pin.* 195. *ex hort. cliff.*

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

1. NAIAS. *hort. cliff.* 437. *fl. suec.* 791. *fl. leyd. prodr.* 10.

Fluvialis Pisana, foliis denticulatis. *Bauh. hist.* 3. 779. NAÏADE.

a. Fluvialis foliis angustis dentatis. *bot. par.* 54.

* Fluvialis species angusto brevique folio, undequaque spinis infesta. *hort. Cath.* 241.

1. ZANNICHELLIA. *fl. lapp.* 321. *hort. cliff.* 437. *fl. suec.* 745. *fl. leyd. prodr.* 9.

Algoides vulgaris. *act. acad. reg. Sc.* 1719. ALGUETTE.

* Fluvialis gramineo folio, polycarpos. *bot. par.* 54.

* Potamogeito similis, gramini folia ramosa, & ad genicula polyceratos. *Pluk. almag. tab.* 163. *fig.* 7.

TRIANDRIA,

1. CAREX ſpicis maſculis pluribus, fœmineis ſubſeſſilibus, capſulis obtuſiuſculis. *fl. ſuec.* 769.

*——ſpicis erectis oblongis ſeſſilibus alternis foliolo florali brevioribus, ſuperioribus maſculis. *hort. cliff.* 439.

*——maxima ſpicis plurimis remotis longis. *fl. lapp.* 329.

*——ſpicis maſculinis numeroſis, ſuperioribus, fœmininis inferioribus, intermediâ unicâ androgynâ. *fl. leyd. prodr.* 75.

Cyperoides latifolium, ſpicâ rufâ, ſeu caule triangulo. *I. R. H.* 529.

a. Cyperoides nigro-luteum vernum minus. *I. R. H.* 529. *ex fl. ſuec.*

b. Cyperoides nigro-luteum vernum majus. *I. R. H.* 529. *ex obſ. pl.* 152.

2. CAREX ſpicis pendulis omnibus fœmineis, unicâ androgynâ infernè maſculâ. *hort. cliff.* 439. *fl. ſuec.* 766. *fl. leyd. prodr.* 74. *fl. virg.* 114.

Cyperoides ſpicâ pendulâ breviore. *I. R. H.* 529.

a. Cyperoides ſpicâ pendulâ longiore & anguſtiore. *I. R. H.* 529.

3. Carex ſpicis remotis, fœmineis ſubſellibus, capſulis hirſutis. *fl. lapp.* 335. *fl. ſuec.* 757.

*——piloſa, ſpicis erectis, maſculis tribus ſeſſilibus, ſecundâ minore, fœmineis duabus remotis. *hort. cliff.* 438. *fl. leyd. prodr.* 74.

Cyperoides polyſtachion lanuginoſum. *I. R. H.* 529.

4. CAREX ſpicis maſculis pluribus, fœmineis pedunculatis, capſulis inflatis acuminatis. *fl. ſuec.* 768.

*——ſpicis plurimis floreſcentibus tenuibus, fructiferis craſſis. *fl. lapp.* 330.

Cyperoides ſpicis maſculis gracillimis, fœmininis pendulis aut erectis capſulis ventricoſis, collo longo bifido. *Hall. Helv.* 241.

Cyperoides veſicarium glabrum, ſpicâ pendulâ longiore. *I. R. H.* 530. *a.* Cyperoides polyſtachion ſpicis teretibus erectis. *I. R. H.* 529. *ex fl. ſuec. & ex phraſi Hall. Helv.* 241.

b. Carex culmo longiſſimo, ſpicis tenuibus remotis. *fl. lapp.* 328. *fl. leyd. prodr.* 75. *ex fl. ſuec.*

Cyperoides ſylvarum tenuiùs ſpicatum. *I. R. H.* 530.

c. Carex ſpicis fœmininis oblongis pedunculatis brevioribus, maſculinis ſeſſilibus, ultimâ longiſſimâ, capſulis inflatis acuminatis. *fl. leyd. prodr.* 76. *ex fl. ſuec.*

Gramen Cyperoides majus præcox, ſpicis turgidis teretibus flaveſcentibus. *hiſt. ox.* 3. 242.

5. CAREX ſpicis pedunculatis erectis remotis, fœmineis linearibus, capſulis obtuſiuſculis inflatis. *fl. ſuec.* 765.

*——ſpicis remotis ſeſſilibus, capſulis ſubgloboſis. *fl. lapp.* 333.

Cyperoides ſpicis parvis longè diſtantibus. *I. R. H.* 530.

a. Cyperoides veſicarium humile, locuſtis rarioribus. *I. R. H.* 530. *ex fl. ſuec.*

6. CAREX ſpicis extremitati culmi nudi complanati fœmininis ſub-

globosis, masculinâ superiori oblongâ. *obs. pl.* 152.

Cyperoides minus, spicis densioribus. *I. R. H.* 530.

* Gramen Caryophyllatæ foliis, spicâ divulsâ. *Pin.* 3.

7. CAREX spicis confertis subsessilibus, masculâ lineari, fœmineis subrotundis, capsulis acutis recurvis. *fl. suec.* 755.

*——spicis ad apicem tribus sessilibus, fœmininis subrotundis, capsulis acutis recurvis. *fl. lapp.* 334. *fl. leyd. prodr.* 74.

Cyperoides paluſtre aculeatum, capitulo breviore. *I. R. H.* 529.

8. CAREX spicis terminatricibus confertis subrotundis, masculinâ oblongâ. *fl. leyd. prodr.* 75.

Gramen Cyperoides tenuifolium, spicis ad summum caulem sessilibus globulorum æmulis. *Pluk. almag. bot.* 178.

9. CAREX spicis pendulis, masculâ erectâ, fœmineis ovatis imbricatis, capsulis confertis obtusis. *fl. suec.* 764.

*—ſpicis ex apice pendulis, maſculinâ & fœmininis concoloribus. *fl. lapp.* 326. *fl. leyd. prodr.* 75.

Cyperoides polyſtachion flavicans, ſpicis brevibus prope ſummitatem caulis. *I. R. H.* 530.

10. CAREX ſpicis omnibus cylindricis, in fœmininis inferiori, in maſculinis ſuperiori longioribus. *obſ. pl.* 152.

Cyperoides latifolium, ſpicâ ſpadiceo-viridi, majus. *I. R. H.* 529.

11. CAREX ſpicis linearibus, maſculâ breviore inferioreque, bracteis aphyllis, capſulis diſtantibus. *hort. cliff.* 438. *fl. ſuec.* 758.

*—ſpicâ maſculâ terminatrici, quam fœminea ſupremâ breviore, capſulis diſtantibus. *fl. lapp.* 338.

Cyperoides ſylvarum, ſpicâ variâ. *bot. par.* 44.

* Gramen caryophyllatum montanum, ſpicâ variâ. *Bauh. prodr.* 9.

12. CAREX ſpiculis in foliorum alis ſeſſilibus. *obſ. pl.* 151.

Cyperoides anguſtifolium, ſpicis

ſeſſilibus in foliorum alis. *I. R. H.* 530.

13. CAREX ſpicâ oblongâ androgynâ, ſpiculis laxis alternis. *obſ. pl.* 150.

Gramen Cyperoides paluſtre elatius, ſpicâ longiore laxâ. *Rai. hiſt.* 1296.

14. CAREX ſpicis obeſis ſubrotundis in ſummo caule ſe alternè contingentibus. *Hall. Helv.* 244.

Gramen Cyperoides ex monte Balon, ſpicâ divulsâ. *Bauh. hiſt.* 2. 497.

a. Gramen cyperoides ſpicâ è pluribus ſpicis brevibus mollibus compoſitâ. *Rai. ſynopſ.* 3. 422. *ex Hall. Helv.*

15. CAREX ſpicâ ſupra decompoſitâ infernè laxiore, ſpiculis androgynis ovatis ſeſſilibus conglomeratis ſupernè maſculis. *fl. ſuec.* 750.

*——ſpicâ ſupra decompoſitâ, ſpiculis androgynis ovatis ſeſſilibus confertis ſupernè maſculis. *hort. cliff.* 438.

Gramen Cyperoides paluſtre majus, ſpicâ compactâ. *Pin.* 6.

16. CAREX ſpiculis ſubrotundis diſtinctis ſeſſilibus obtuſis androgynis, capſulis ovatis obtuſiuſculis. *fl. ſuec.* 754.

*——ſpicâ androgynâ, ſpiculis compactis obſcurè alternis, culmo nudo compreſſo. *obſ. pl.* 149.

Gramen Cyperoides ſpicatum minus, ſpicâ longâ divulsâ ſeu interruptâ. *Rai. ſyn.* 3. 424.

17. CAREX ſpicâ ſimplici androgynâ. *hort. cliff.* 438. *fl. ſuec.* 747.

*——ſpicâ unicâ. *fl. lapp.* 339.

Gramen Cyperoides minimum, ſeminibus deorſum reflexis puliciformibus. *Rai. hiſt.* 1298.

18. CAREX quod Gramen Cyperoides ſpicatum minus, ſpicâ divulsâ aculeatâ. *Rai. ſyn.* 269.

19. CAREX quod Gramen Cyperoides elegans, ſpicâ compoſitâ molli. *Pluk.*

1. ISCHŒMUM paniculâ digitatâ, ſpiculis oppoſitis disjunctiſve,

florum ſerie duplici, culmo tereti. *obſ. pl.* 187.

Gramen dáctylon anguſtifolium, ſpicis villoſis. *Pin.* 8.

1. SPARGANIUM foliis adſurgentibus triangularibus. *fl. lapp.* 345. *hort. cliff.* 439. *fl. ſuec.* 770. *fl. leyd. prodr.* 73. *fl. virg.* 114.

Sparganium ramoſum. *Pin.* 15.

a. Sparganium non ramoſum. *Pin.* 15. *ex hort. cliff. & fl. ſuec.*

1. TYPHA. *Fuchs. hiſt.* 822. *hort. cliff.* 439. *fl. ſuec.* 772. *fl. leyd. prodr.* 73.

Typha paluſtris major. *Pin.* 20. MASSE.

*——paluſtris, clavâ duplici.

a. Typha paluſtris, clavâ gracili. *Pin.* 20. *ex hort. cliff.*

*——paluſtris, clavâ duplici gracili.

TETRANDRIA.

1. URTICA dioica, foliis oblongo-cordatis. *hort. cliff.* 440. *fl. ſuec.* 774. *fl. leyd. prodr.* 210.

*——foliis cordatis, amentis cylindraceis,

ceis, sexu distincta. *fl. lapp.* 374.

Urtica urens maxima. *Pin.* 232. Ortie.

*—ead. foliis ternis.

*—ead. caule rubente. *Pin.* 232.

*—ead. foliis ex luteo variegatis.

2. URTICA androgyna, foliis ovalibus. *hort. cliff.* 440. *fl. suec.* 773. *fl. leyd. prodr.* 210.

*—foliis ovatis, amentis cylindraceis, androgyna. *fl. lapp.* 375. *Hall. Helv.* 178.

Urtica urens minor. *Pin.* 232. Ortie Griesche.

3. URTICA amentis fructiferis globosis, androgyna. *hort. cliff.* 440. *fl. leyd. prodr.* 209.

Urtica urens, Pilulas ferens, prima dioscoridis, semine Lini. *Pin.* 232. Ortie Romaine.

1. BUXUS. *Bauh. hist.* 1. 496. *hort. cliff.* 441. *fl. leyd. prodr.* 400.

Buxus arborescens. *Pin.* 471. Buis ou Bouis.

1. ALNUS. *fl. suec.* 775. *fl. lapp.* 340. *hort. cliff.* 441. *fl. leyd. prodr.* 85.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis. *Pin.* 428. AULNE.

1. BETULA foliis acuminatis serratis. *hort. cliff.* 442. *fl. suec.* 776. *fl. leyd. prodr.* 85.

*—foliis cordatis serratis. *fl. lapp.* 341.

Betula. *Dod.* 839. Virgulis pendulis. *Menz. ind.* 47. BOULEAU.

*—virgulis erectis.

1. MORUS foliis cordatis hispidis. *hort. cliff.* 441. *hort. upsal.* 283.

Morus fructu nigro. *Pin.* 459. MEURIER.

2. MORUS foliis obliquè cordatis lævibus. *hort. cliff.* 441. *hort. upsal.* 283.

Morus fructu albo. *Pin.* 459.

PENTANDRIA.

1. XANTHIUM caule inermi. *hort. cliff.* 443. *fl. suec.* 778. *fl. leyd. prodr.* 85.

Xanthium. *Dod. Pempt.* 39.

1. AMARANTHUS foliis ovatis emarginatis. *fl. suec.* 779. *hort. cliff.*

444. *fl. leyd. prodr.* 420. *Hall. Helv.* 176.

*—foliis ovatis integris. *obſ. pl.* 16.

Blitum rubrum minus. *Pin.* 118. BLETE.

* Amaranthus ſylveſtris & vulgaris. *hiſt. par.*

a. Blitum ſylveſtre ſpicatum. *I. R.H.* 507. *variet. Hall. Helv.* Videtur.

*—ſylveſtre ſpicatum, foliis ex albo & viridi variegatis. *I. R. H.* 507.

POLYANDRIA.

1. POTERIUM inerme, filamentis longiſſimis. *fl. leyd. prodr.* 240.

*—inerme. *hort. cliff.* 446.

Pimpinella ſanguiſorba minor, hirſuta. *Pin.* 160.

*—ſanguiſorba minor lævis. *Pin.*

1. SAGITTARIA foliis ſagittatis. *fl. lapp.* 344. *hort. cliff.* 447. *fl. ſuec.* 780. *fl. leyd. prodr.* 493. *fl. virg.* 116.

Sagitta aquatica minor latifolia. *Pin.* 194. FLECHE D'EAU, ou SAGETTE.

a. Sagitta aquatica minor anguſtifo-

lia. *Pin.* 194. *ex hort. cliff. & fl. fuec.*

1. MYRIOPHYLLUM floribus omnibus verticillatis. *hort. cliff.* 446. *fl. fuec.* 782. *fl. leyd. prodr.* 213.

Myriophyllum aquaticum minus. *cluſ. hiſt.* 2. 252. VOLANT D'EAU.

* Potamogeton floſculis ad foliorum nodos. *I. R. H.* 233.

2. MYRIOPHYLLUM floribus maſculis interruptè ſpicatis. *hort. cliff.* 446. *fl. fuec.* 781. *fl. leyd. prodr.* 213.

Myriophyllum aquaticum majus. *bot. par.* 143.

* Potamogeton foliis pennatis. *I. R. H.* 233.

1. CERATOPHYLLUM. *hort. cliff.* 446. *fl. fuec.* 783. *fl. leyd. prodr.* 214.

Ceratophyllon aſperum aquis immerſum. *bot. par.* 33.

* Hydroceratophyllum folio aſpero quatuor cornibus armato. *act. Acad. Reg. Sç. Par.* 1719. *p.* 16. HYDRE CORNU.

a, Ceratophyllon læve, aquis immer-

ſum. *bot. par.* 32. *ex hort. cliff.*

* Hydroceratophyllum folio lævi octo cornibus armato. *act. Acad. Reg. Sc. Par.* 1719. *p.* 16.

1. QUERCUS foliis annuis oblongis ſupernè latioribus, ſinubus acutioribus, angulis obtuſis. *hort. cliff.* 448. *fl. ſuec.* 784. *fl. leyd. prodr.* 80. *obſ. pl.* 215.

Quercus cum longo pediculo. *Pin.* 419. CHESNE.

*——ead. glande craſſiſſimâ.

a. Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo eſt. *Pin.* 419. *ex hort. cliff.*

b. Quercus latifolia fœmina. *Pin.* 419.

c. Quercus foliis molli lanugine pubeſcentibus. *Pin.* 419. *ex obſ. pl.*

1. JUGLANS foliolis ovalibus glabris obſoletè ſerratis: omnibus ſubæqualibus. *hort. upſ.* 286.

Nux juglans, ſive regia vulgaris. *Pin.* 417. NOYER.

a——juglans, fructu perduro. *I. R. H.* 581. *ex hort. cliff.*

b.——juglans, fructu tenero & fragili

putamine. *I. R. H.* 581. *ex hort. cliff.*
c.—juglans, fructu maximo. *Pin.*
417. *ex hort. cliff.*

1. FAGUS foliis ovatis undulatis obſoletè ſerratis. *hort. cliff.* 447. *fl. ſuec.* 785. *fl. leyd. prodr.* 79.

Fagus. *Dod. pempt.* 832. HESTRE.

2. FAGUS foliis lanceolatis acuminatè ſerratis. *hort. cliff.* 447. *fl. leyd. prodr.* 79.

Caſtanea. *Dod.* 814.

* Caſtanea ſylveſtris quæ peculiariter Caſtanea. *Pin.* 419. CHATEIGNER.

*—ſativa. *Pin.* 419. MARONNIER.

1. CORYLUS ſtipulis ovatis obtuſis. *hort. cliff.* 448. *fl. ſuec.* 787. *fl. leyd. prodr.* 89.

Corylus ſylveſtris. *Pin.* 418. NOISETTIER.

1. CARPINUS ſquamis ſtrobilorum planis. *hort. cliff.* 447. *fl. ſuec.* 786. *fl. leyd. prodr.* 79.

Carpinus. *Dod.* 841. CHARME.

MONADELPHIA.

1. PINUS foliis geminis primordialibus ſolitariis glabris. *hort. cliff.* 450. *fl. ſuec.* 788. *fl. leyd. prodr.* 89.

Pinus ſylveſtris vulgaris Genevenſis. *Bauh. hiſt.* 1. 253. PIN.

2. PINUS maritima altera Matthioli. *Pin.* 492.

1. ABIES foliis ſolitariis apice acuminatis. *fl. ſuec.* 789. *hort. cliff.* 449. *fl. leyd. prodr.* 89.

*——foliis apicé acuminatis. *fl. lapp.* 347.

Abies tenuiore folio, fructu deorſum inflexo. *I. R. H.* 585. PECE, ou PESSE, ou EPICIA.

*——tenuiore folio, fructu deorſum inflexo majore albido. *Cimel. Reg.*

1. CUPRESSUS foliis imbricatis erectis. *hort. cliff.* 449. *fl. leyd. prodr.* 88.

Cupreſſus metâ in faſtigium convolutâ, quæ fœmina Plinii. *I. R. H.* 587.

*——faſtigiata fœmina. *Pluk. almag.* *a*. Cupreſſus ramos extra ſe ſpargens,

quæ mas Plinii. *I. R. H.* 587. *ex hort. cliff. & fl. leyd.*
*—fusa, sive mas. *Pluk. almag.* CIPRE'S.

SYNGENESIA.

1. BRYONIA foliis palmatis utrinque callosè scabris. *hort. cliff.* 453. *fl. suec.* 790. *fl. leyd. prodr.* 264.
Bryonia aspera, sive alba, baccis rubris. *Pin.* 297. COULEUVRE'E, ou BRYONE.
*—cucumeris folio. Brionia. *tab. ic.* 893.

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

1. VALLISNERIA mas & femina. *hort. cliff.* 454. *fl. lapp.* 371. *fl. leyd. prodr.* 9. omissa *in fl. suec.*
*—variet. scirpi palustris altissimi. *I. R. H.* 528. *inquit. Dillen. hist. musc.*

13. *ex obſervat.* D. BERN. DE JUSSIEU.

Alga fluviatilis graminea, longiſſimo folio. *I. R. H.* 569. ALGUE.

1. SALIX foliis lineari-lanceolatis acuminatis ſerratis utrinque pubeſcentibus : ſerraturis infimis glanduloſis. *hort. cliff.* 473. *fl. ſuec.* 812. *fl. leyd. prodr.* 83.

*—foliis elliptico-lanceolatis ſerratis ſubtùs ſericeis, Vimine fragili. *Hall. Helv.* 152.

Salix vulgaris alba arboreſcens. *Pin.* 473. Florifera. SAULE.

*—ead. fructifera.

2. SALIX foliis firmis vix ſerratis longè ellipticis ſubtùs ſubhirſutis & caneſcentibus. *Hall. Helv.* 153.

Salix vulgaris rubens. *Pin.* 473.

3. SALIX foliis ſubintegerrimis lanceolato-linearibus longiſſimis acutis ſubtùs ſericeis, ramis virgatis. *fl. ſuec.* 813.

Salix ſativa lutea, folio crenato. *Pin.* 473.

4. SALIX foliis glabris acutè ſerratis lanceolatis petiolatis, ſtipulis

trapeziformibus. *fl. -leyd. prodr.* 83. *fl. ſuec.* 794.

*——foliis ſerratis glabris acuminatis appendiculatis. *fl. lapp.* 349.

Salix folio amygdalino, utrinque virente aurito. *Pin.* 473.

5. SALIX ramis villoſis, foliis lineari-lanceolatis ſubtùs tomentoſis. *fl. leyd. prodr.* 84. *obſ. pl.* 207.

Salix folio longiſſimo anguſtiſſimo, utrinque albido. *Pin.* 474.

6. SALIX foliis ovatis rugoſis ſubtùs tomentoſis margine undulatis ſupernè denticulatis. *fl. leyd. prodr.* 83. *fl. ſuec.* 811.

*——foliis ſubcrenatis utrinque villoſis ovato-oblongis. *fl. lapp.* 365.

Salix latifolia rotunda. *Pin.* 474. MARCEAU.

a. Salix platyphyllos leucophleos. *Lugd. hiſt.* 276. *ex Hall. Helv.* 155.

b. Salix capræa, folio oblongo utrinque villoſo. *bot. par.* 176. *ex ipſo Vaill.*

*——Ulmi minoris folio rugoſo & crenato.

*—Ulmi minoris folio rugoso non crenato.

7. SALIX foliis obscurè crenatis utrinque villosis ovato-oblongis. *fl. leyd. prodr.* 83.

Salix folio ex rotunditate acuminato. *Pin.* 474. M. Vaillant croit que c'est une variété du précédent.

8. SALIX foliis ovatis integerrimis, subtùs tomentosis nitidis. *fl. leyd. prodr.* 84.

Salix subrotundo argenteo folio. *Pin.* 474.

9. SALIX foliis ovato-lanceolatis integerrimis, ramis decumbentibus, radice reptatrice. *fl. leyd. prodr.* 84.

*—foliis integris ovatis, aliquot linearum longis, caulibus vix assurgentibus. *obs. pl.* 416.

Salix pumila angustifolia, infernè lanuginosa. *Bauh. hist.* 1. 214.

10. SALIX foliis serratis glabris lanceolato-linearibus, superioribus oppositis obliquis. *fl. leyd. prodr.* 83.

Salix humilior, foliis angustis subcæruleis ex adverso binis. *Rai. hist.* 1421.

a. Salix Nerii folio utrinque virente. *bot. par.* 175. *variet.* Videtur. *Hall. Helv.* 153.
*——vulgaris nigricans, folio non ferrato. *Pin.* 473.

TETRANDRIA.

1. VISCUM. *hort. cliff.* 441. *fl. suec.* 816. *fl. leyd. prodr.* 400.
Viscum baccis albis. *Pin.* 423. GUI.

1. MYRICA foliis lanceolatis, fructu sicco. *fl. lapp.* 373. *hort. cliff.* 455. *fl. suec.* 817. (mas. . . fœmina.) *fl. leyd. prodr.* 527.
Gale florifera. *bot. par.* 77. PIMENT ROYAL.
*——fructifera.

PENTANDRIA.

1. CANNABIS foliis digitatis. *hort. cliff.* 457. (mas. . . . . fœmina.) *fl. leyd. prodr.* 221.
Cannabis sativa. *Pin.* 320. CHANVRE.
*——erratica. *Pin.* 320.

1. HUMULUS. *hort. cliff.* 458. *fl. suec.* 818.

*——mas.... fœmina. *fl. leyd. prodr.* 222.

Lupulus mas. *Pin.* 298. HOUBLON.

*——fœmina. *Pin.* 298.

HEXANDRIA.

1. TAMUS foliis cordatis. *hort. cliff.* 458. (mas.... fœmina.) *fl. leyd. prodr.* 228.

Tamnus racemosa, flore minore luteo pallescente. *I. R. H.* 102. SEAU DE NOTRE DAME, RACINE VIERGE.

OCTANDRIA.

1. POPULUS foliis deltoidibus acuminatis serratis. *hort. cliff.* 460. *fl. suec.* 821. *fl. leyd. prodr.* 82. *fl. virg.* 194.

Populus nigra. *Pin.* 429. PEUPLIER NOIR.

2. POPULUS foliis subrotundis dentato-angulatis utrinque glabris.

hort. cliff. 460. *fl. ſuec.* 819. *fl. leyd. prodr.* 82.

*——foliis orbiculatis crenatis. *fl. lapp.* 300.

Populus tremula. *Pin.* 429. PEUPLIER TREMBLE.

3. POPULUS foliis ſubrotundis dentato-angulatis ſubtùs tomentoſis. *hort. cliff.* 460. *fl. ſuec.* 820. *fl. leyd. prodr.* 82.

Populus alba, majoribus foliis. *Pin.* 429. PEUPLIER BLANC.

a. Populus alba minoribus foliis. *lob. ic.* 193.

ENNEANDRIA.

1. MERCURIALIS caule brachiato, foliis glabris. *hort. cliff.* 461. (mas... fœmina.) *fl. leyd. prodr.* 203.

Mercurialis teſticulata ſive mas Dioſcoridis & Plinii. *Pin.* 121. MERCURIALE.

*——ſpicata, ſive fœmina Dioſcoridis & Plinii. *Pin.* 121.

2. MERCURIALIS caule ſimpliciſſimo, foliis ſcabris. *hort. cliff.* 461.

fl. ſuec. 823. (mas... fœmina.) *fl. leyd. prodr.* 203.

Mercurialis montana teſticulata. *Pin.* 122.

*——montana ſpicata. *Pin.* 122.

1. HYDROCHARIS. *hort. cliff.* 460. *fl. ſuec.* 822.

*——mas.... fœmina. *fl. leyd. prodr.* 10.

Morſus Ranæ foliis circinnatis, floribus albis. *act. Acad. Reg. Sc. Par.* 1705.

MONADELPHIA.

1. JUNIPERUS foliis ſeſſilibus patentibus. *virid. cliff.* 99. *hort. cliff.* 464. *fl. ſuec.* 824. (mas... fœmina.) *fl. leyd. prodr.* 89.

*——foliis undique prominentibus pungentibus. *fl. lapp.* 376.

Juniperus vulgaris fruticoſa. *Pin.* 488. GENEVRIER.

*——fœmina. *Volck.* 234. florifera.

1. TAXUS. *hort. cliff.* 464. *fl. ſuec.* 825. *fl. leyd. prodr.* 87.

Taxus. *Bauh. hiſt.* 1. 241. IF.

SYNGENESIA.

1. RUSCUS foliis supinè floriferis nudis. *hort. cliff.* 465. (mas.... fœmina.) *fl. leyd. prodr.* 227.

Ruscus myrtifolius aculeatus. *I. R. H.* 79. HOUX FRELON, FRAGON, ou PETIT HOUX.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA, MONOECIA.

1. CELTIS foliis ovato-lanceolatis serratis. *hort. cliff.* 39. *fl. leyd. prodr.* 207.

Celtis fructu nigricante. *I. R. H.* 612. MICOCOULIER.

1. ÆGILOPS spicâ ovatâ aristis breviore. *hort. upsf.* 301.

Gramen spicatum, durioribus & crassioribus locustis, spicâ brevi. *I. R. H.* 529.

Gramen spicatum, durioribus & crassio-

2. ÆGILOPS spicâ compressâ aristis ea is longiore.

ribus locuſtis, ſpicâ longiſſimâ. *I. R. H.* 529.

1. CENCHRUS paniculâ ſpicatâ. *obſ. pl.* 188.

Gramen ſpicatum, locuſtis echinatis. *I. R. H.* 519.

1. VALANTIA floribus maſculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. *hort. upſ.* 303.

* Galium foliis quaternis, floribus in alis confertis. *hort. cliff.* 34. *fl. leyd. prodr.* 257.

Cruciata hirſuta. *Pin.* 335.

2. VALANTIA floribus maſculis trifidis hermaphroditici pedunculo inſidentibus. *hort. upſ.* 302.

Aparine ſemine lævi. *bot. par.* 14. *t.* 4. *f.* 3.

1. PARIETARIA foliis lanceolato-ovatis alternis. *hort. upſ.* 302.

Parietaria officinarum & Dioſcoridis. *Pin.* 121. PARIE'TAIRE.

a. Parietaria minor, ocymi folio. *Pin.* 121. *ex hort. cliff.*

1. ATRIPLEX caule herbaceo, vulvulis fœmineis magnis deltoidibus ſinuatis. *fl. ſuec.* 827.

Atriplex folio haſtato ſeu deltoide. *hort. reg. bleſ.* 237. ARROCHE.

2. ATRIPLEX caule herbaceo, valvulis fœmineis ſeminum diſco dentatis. *fl. ſuec.* 828.

*—caule herbaceo, foliis ſuperioribus lanceolatis integerrimis. *hort. cliff.* 469. *fl. leyd. prodr.* 218.

*—foliis ſagittato-lanceolatis. *fl. lapp.* 377.

Atriplex anguſto oblongo folio. *Pin.* 119.

a. Atriplex caule annuo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis. *fl. leyd. prodr.* 218. *ex fl. ſuec. & ex bot. par.*

Atriplex anguſtiſſimo & longiſſimo folio. *hort. lugd. bat.*

DIOECIA.

1. FRAXINUS floribus nudis. *hort. cliff.* 469. *fl. ſuec.* 830. (hermaphroditus....fœmina.) *fl. leyd. prodr.* 396.

Fraxinus excelſior. *Pin.* 416. FRESNE.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

1. EQUISETUM caule non ſulcato latiſſimo, verticillis denſiſſimis. *Hall. Helv.* 144. *fl. ſuec.* 836.

*——fluviatile. *fl. lapp.* 393.

Equiſetum paluſtre, longioribus ſetis. *Pin.* 15. PRESLE.

2. EQUISETUM ſetis ſimplicibus internodia vix ſuperantibus. *fl. leyd. prodr.* 496. *fl. ſuec.* 835.

*——paluſtre. *fl. lapp.* 392. *hort. cliff.* 472.

Equiſetum paluſtre brevioribus ſetis. *Pin.* 16.

3. EQUISETUM ſetis ſimplicibus internodio multotiès longioribus. *fl. leyd. prodr.* 496.

Equiſetum pratenſe, longiſſimis ſetis. *Pin.* 16.

a. Equiſetum paluſtre majus. *tab. ic.*

252. *ex Hall. Helv.* 143.

4. EQUISETUM ſcapo fructificante nudo, caule ſterili, ramis compoſitis. *fl. ſuec.* 833.

*——arvenſe. *fl. lapp.* 390. *hort. cliff.* 471.

Equiſetum arvenſe, longioribus ſetis. *Pin.* 16.

5. EQUISETUM caule nudo ſcabro baſi ſubramoſo *fl. ſuec.* 838.

Equiſetum foliis nudum ramoſum. *Pin.* 16.

a. Equiſetum ſcapo nudo ſimpliciſſimo. *fl. leyd. prodr.* 496. *fl. virg.* 196. *ex fl. ſuec.*

*——hyemale. *fl. lapp.* 394.

Equiſetum foliis nudum non ramoſum, ſeu junceum. *Pin.* 16.

6. EQUISETUM caule nudo lævi. *fl. ſuec.* 837.

Equiſetum nudum lævius noſtras. *Rai. ſynopſ.* 42.

1. OSMUNDA ſcapo paniculato polyphyllo. *fl. ſuec.* 840.

*——frondibus caulinis ſimpliciter pinnatis, pinnis lanceolatis. *hort.*

cliff. 472. *fl. leyd. prodr.* 497.

Oſmunda vulgaris & paluſtris. *I. R. H.* 547. OSMONDE.

2. OSMUNDA ſcapo caulino unico, fronde pinnatâ ſolitariâ. *fl. ſuec.* 842.

*—fronde pinnatâ caulinâ, pinnis lunulatis. *hort cliff.* 472. *fl. leyd. prodr.* 496.

*—folio pinnatifido, pinnis lunulatis. *fl. lapp.* 389.

Oſmunda foliis lunulatis. *I. R. H.* 547.

1. OPHIOGLOSSUM fronde ovatâ. *fl. ſuec.* 839.

*—folio ovato, ſpicâ diſtichâ. *hort. cliff.* 472.

OPHIOGLOSSUM vulgatum. *Pin.* 354. LANGUE DE SERPENT.

1. PTERIS fronde ſupra decompoſitâ, foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis, ſuperioribus minoribus. *hort. cliff.* 473. *fl. ſuec.* 843. *fl. leyd. prodr.* 497.

Filix ramoſa major, pinnulis obtuſis non dentatis. *Pin.* 357. FOUGERE FEMELLE.

*—ramosa major, pinnulis obtusis undulatis. *I. R. H.* 357.
*—ramosa major, pinnulis obtusis, ramulis bifurcatis. *bot. par.* 54.

2. PTERIS fronde pinnatifidâ lanceolatâ, laciniis parallelis integerrimis. *fl. suec.* 844.
*—fronde pinnatâ, foliolis linearibus parallelis. *fl. leyd. prodr.* 497.
* Strutiopteris. *Hall. Helv.* 132.

Polypodium angustifolium, folio vario. *I. R. H.* 540.

1. ASPLENIUM fronde pinnatifidâ, laciniis alternis adnatis. *hort. cliff.* 474. *fl. leyd. prodr.* 499.

Asplenium sive Ceterac. *Bauh. hist.* 3. 749. CETERAC.

2. ASPLENIUM frondibus linearibus integris basi cordatis inflexis; petiolis hirsutis. *virid. cliff.* 103. *hort. cliff.* 474. *fl. suec.* 853. *fl. leyd. prodr.* 498.

Lingua cervina officinarum. *Pin.* 353. SCOLOPENDRE, ou LANGUE DE CERF.
*—multifido folio. *Pin.* 353.

*—Hemionitidis vulgaris facie. *bot. par.* 118.

3. ASPLENIUM frondibus alternatim decompositis, foliolis cuneiformibus crenulatis. *fl. leyd. prodr.* 498. *fl. suec.* 855.

Ruta muraria. *Pin.* 356. SAUVEVIE.

4. ASPLENIUM fronde pinnatâ, foliolis subrotundis crenatis. *fl. lapp.* 388. *hort. cliff.* 474. *fl. suec.* 854. *fl. leyd. prodr.* 498.

Trichomanes sive Polytrichum officinarum. *Pin.* 356. POLITRIC.

*—minus & tenerius. *Pin.* 356.

a. Trichomanes foliis eleganter incisis. *I. R. H.* 539. *ex hort. cliff.*

5. ASPLENIUM frondibus duplicato-pinnatis: foliis inferioribus majoribus, foliolis obversè ovatis, supernè crenatis. *fl. leyd. prodr.* 498. *6. obs. pl.* 67.

Filicula quæ Adiantum nigrum officinarum pinnulis obtusioribus. *I. R. H.* 542.

1. POLYPODIUM fronde pinna-

tâ, pinnis lanceolatis indiviſis ſerrulatis alternis connato-ſeſſilibus. *hort. cliff.* 475. *fl. ſuec.* 845. *fl. leyd. prodr.* 499.

*——pinnatum, pinnis lanceolatis integris. *fl. lapp.* 380.

Polypodium vulgare. *Pin.* 359. POLIPODE.

2. POLYPODIUM fronde duplicato-pinnatâ, pinnis remotis, Foliolis ſubrotundis inciſis. *fl. lapp.* 384. *fl. ſuec.* 849. *fl. leyd. prodr.* 500.

Filicula fontana major, ſive Adiantum album, filicis folio. *Pin.* 358. FILICULE.

3. POLYPODIUM fronde alternatim duplicato-pinnatâ, foliolis laciniatis. *hort. cliff.* 475. *fl. leyd. prodr.* 500.

Filicula regia, Fumariæ pinnulis. *bot. par.* 52. *t.* 9. *f.* 1.

4. POLYPODIUM duplicato-pinnatum, foliolis ovato-acutis crenulatis. *obſ. pl.* 69.

Filix minor non ramoſa. *Bauh. hiſt.* 3. 740.

*——minor

*—minor paluſtris. *Rai. hiſt.* 146. FOUGERE.

5. POLYPODIUM fronde duplicato-pinnatâ, foliolis obtuſis crenulatis, petiolo ſtrigoſo. *hort. cliff.* 475. *fl. ſuec.* 846. *fl. leyd. prodr.* 499.
*—duplicato-pinnatum, pinnulis obtuſis crenulatis. *fl. lapp.* 385.
Filix non ramoſa dentata. *Pin.* 353.
*—mas non ramoſa latifolia dentata. *I. R. H.* 536. FOUGERE MASLE.

6. POLIPODIUM fronde duplicato-pinnatâ: pinnulis lanceolatis acutis pinnatifidis. *fl. leyd. prodr.* 499. *fl. ſuec.* 847.
*—duplicato-pinnatum, pinnulis lanceolatis acutis pinnatifidis. *fl. lapp.* 386.
Filix mollis ſive glabra vulgari mari non ramoſæ accedens. *Bauh. hiſt.* 3. 738.

7. POLYPODIUM pinnis ramorum pinnatis, pinnulis laxis, acutè ſectis ſpinuloſis. *Hall. Helv.* 141.
Filix mas ramoſa, pinnulis dentatis. *Ger. emac.* 1129.

a. Filix montana ramosa minor argutè denticulata. *Rai. syn.* 49. *variet. Hall. Helv.* 141. *videtur.*

*——non ramosa petiolis tenuissimis & tenuissimè dentatis. *Pin.* 358.

8. POLYPODIUM fronde supra decompositâ, foliis ternis duplicato-pinnatis. *fl. suec.* 852.

*——trifidum, ramis pinnatis, pinnis pinnatifidis. *fl. lapp.* 387.

Filix ramosa minor, pinnulis dentatis. *Pin.* 358.

9. POLYPODIUM fronde duplicato-pinnatâ, foliolis lunulatis dentatis, petiolo strigoso. *fl. leyd. prodr.* 500.

Lonchitis aculeata major. *I. R. H.* 538. LONKITE.

1. ACROSTICUM fronde linearì-laciniatâ. *fl. lapp.* 380. *fl. suec.* 856. *fl. leyd. prodr.* 501.

Filicula saxatilis corniculata. *I. R. H.* 542.

MUSCI.

1. POLYTRICHUM calyptrâ stria-

tâ, ſurſumve piloſâ. *fl. ſuec.* 869.

*——Bryi ruralis facie, capſulis ſeſſilibus, majus. *hiſt. muſc.* 430.

Muſcus apocarpos arboreus ramoſus. 8. *Rai. hiſt.* 3. 40.

a. Polytrichum Bryi ruralis facie, capſulis ſeſſilibus, minus. *hiſt. muſc.* 431. *ex fl. ſuec.*

Muſcus apocarpos arboribus adnaſcens minor. 9. *Rai. hiſt.* 3. 40.

b. Muſcus capillaceus minimus acaulos, calyptrâ ſtriatâ. *I. R. H.* 552. *ex fl. ſuec.* idem *ac varietas præcedens. a. ex hiſt. muſc.*

c. Polytrichum capillaceum criſpum, calyptris acutis piloſiſſimis. *hiſt. muſc.* 433. *ex fl. ſuec.*

Muſcus, qui Adiantum aureum minimum, pediculis brevibus, foliis capillaceis. *Muſ. Petiv.* 25.

2. POLYTRICHUM nanum capſulis ſubrotundis galeritis, aloes folio non ſerrato. *hiſt. muſc.* 428.

Muſcus capillaceus, minor, calyptrâ tomentosâ. *I. R. H.* 552.

3. POLYTRICHUM caule ramo-

so, capsulis basi destitutis apophysi. *fl. suec.* 870.

*—ramosum setis ex alis urnigeris. *hist. musc.* 427.

Muscus ramosus erectus, calyptrâ villosâ. *bot. par.* 131.

4. POLYTRICHUM capsulâ parallelipipedâ. *fl. suec.* 868.

*—caule simplici. *fl. lapp.* 395.

*—quadrangulare vulgare, Yuccæ foliis serratis. *hist. musc.* 420.

Muscus qui Polytricum aureum majus. *Pin.* 356. PERCE-MOUSSE, ou POLITRIC DORE'.

α. Polytrichum quadrangulare, Juniperi foliis brevioribus & rigidioribus. *hist. musc.* 424. ex fl. suec.

Muscus coronatus humilis rigidior capitulis longis acutis sessilibus erectis. *hist. ox.* 3. 630.

β. Polytrichum quadrangulare minus, Juniperi foliis pilosis. *hist. musc.* 426. ex Hall. Sw.

Muscus Juniperi folio, roseus prolifer. *bot. par.* 131.

*—capillaceus stellatus prolifer. *I. R. H.* 251.

~~*a.* Polytrichum quadrangulare, Juniperi foliis brevioribus & rigidioribus. *hiſt. muſc.* 424. *ex ſt. ſuec.*~~

Muſcus capillaceus minimus, calyptrâ longiſſimâ erectâ. *I. R. H.* 552.

b. Adiantum pileolo villoſo, medium. *Rai. ſyn.* 28. 2. idem *ac. variet. præced. a. ex hiſt. muſc.* ideòque *variet. ex ſt. ſuec.*

1. BRYUM capſulis erectis ſphæricis. *ſt. ſuec.* 888.

*——caule erecto, foliis ſetaceis, capitulis globoſis. *ſt. lapp.* 400.

*——capillaceum, capſulis ſphæricis. *hiſt. muſc.* 379.

Muſcus capillaceus medius, capitulis globoſis. *I. R. H.* 551.

2. BRYUM ſtellare roſeum pendulum minus, capſulis & ſetis longioribus. *hiſt. muſc.* 412.

Muſcus parvus ſtellaris. *Pin.* 361.

3. BRYUM capſulis erectis turbinato-ovatis, operculo obtuſiuſculo. *ſt. ſuec.* 890.

*——Serpilli-folium pellucidum, cap-

ſulis pyriformibus. *hiſt. muſc.* 345.

Muſcus capillaceus minimus capitulis pyriformibus turgidis. *I. R. H.* 553.

4. BRYUM ſtellare nitidum pallidum, capſulis tenuiſſimis. *hiſt. muſc.* 381.

Muſcus capillaceus minimus muralis ſtellatus. *I. R. H.* 552.

5. BRYUM capſulis erectis ſubrotundis, operculo mucronato. *fl. ſuec.* 889.

*——exiguum, creberrimis capſulis rufis. *hiſt. muſc.* 347.

Muſcus capillaceus, omnium minimus. *I. R. H.* 552.

6. *an* BRYUM foliis gramineis pellucidis, cauliculo rubente. *hiſt. muſc.* 359?

Muſcus capillaris humilis, graminifolius minor, capitulis oblongis erectis. 17. *Rai. hiſt.* 3.

a. Muſcus capillaris, ſurculis erectis foliis oblongis tenuiſſimis acutis cinctis. *Rai. ſyn.* 29. *idem ex hiſt. muſc.*

7. BRYUM ampullaceum, foliis Thymi pellucidis, collo ſtrictiore. *hiſt. muſc.* 343.

Muſcus capillaris, capſulis pyriformibus erectis in acumen deſinentibus. *bot. par.*

*—capillaceus minor, capitulis geminatis. *I. R. H.* 552.

8. BRYUM albidum & glaucum fragile majus, foliis erectis, ſetis brevibus. *hiſt. muſc.* 362.

Muſcus capillaceus ſericeus, Coridis facie. *I. R. H.* 552.

*—trichoides montanus albidus fragilis. *Rai. ſyn.* 339.

9. BRYUM capſulâ erectâ, foliis ſetaceis ſecundis. *fl. ſuec.* 895.

*—heteromallum. *hiſt. muſc.* 375.

Muſcus capillaceus minimus plumoſus elegans. *I. R. H.* 552.

10. BRYUM capſulis erectiuſculis, pedunculis aggregatis, foliis ſecundis recurvatis, caule declinato. *fl. ſuec.* 898.

*—caule inclinato, foliis arrectis ſubulatis, capitulis erectiuſculis. *fl. lapp.* 398.

*—reclinatum, foliis falcatis, ſcoparum effigie. *hiſt. muſc.* 357.

Muſcus capillaceus major, pediculo & capitulo tenuioribus. *I. R. H.* 551.

11. BRYUM capſulis erectiuſculis, pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ſerratis. *fl. ſuec.* 899.

*—Phyllitidis folio rugoſo acuto, capſulis incurvis. *hiſt. muſc.* 360.

Muſcus capillaceus minor, capitulo longiori falcato. *I. R. H.* 551.

12. BRYUM tegulare humile piloſum & incanum. *hiſt. muſc.* 355.

Muſcus capillaris minor, capitulis erectis, vulgatiſſimus. *Rai. ſyn.* 28.

*—idem foliis in pilum deſinentibus.

13. BRYUM capſulis erectiuſculis, foliis piliferis recurvis. *fl. ſuec.* 900.

*—caule erecto, foliis reflexis ſetâ terminatis, capitulis falcatis. *fl. lapp.* 397.

*—rurale unguiculatum hirſutum

elatius & ramoſius. *hiſt. muſc.* 352.

Muſcus capillaris tectorum, denſis ceſpitibus, capitulis oblongis, foliis in pilum oblongum deſinentibus. *Rai. ſyn.* 28. *n.* 2.

14. BRYUM capſulis longis ſubulatis. *hiſt. muſc.* 350.

Muſcus capillaris, corniculis longiſſimis incurvis. *Rai. ſyn.* 29. *n.* 3.

15. BRYUM capſulis ſubrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. *fl. ſuec.* 904.

*——foliis ſetaceis, pedunculo reflexo, capitulis ſubrotundis. *fl. lapp.* 401.

*——orbiculare pulvinatum, hirſutie caneſcens, capſulis immerſis. *hiſt. muſc.* 395.

Muſcus capillaceus lanuginoſus minimus. *I. R. H.* 552.

16. BRYUM capſulis pendulis, ſurculis cylindricis imbricato-lævibus. *fl. ſuec.* 909.

*——pendulum iulaceum argenteum & ſericeum. *hiſt. muſc.* 392.

Muſcus argenteus, capitulis reflexis. *Rai. ſyn.* 34. *n.* 5.

*——ſquamoſus, Ericæ folio, minimus, capitulis nutantibus. *I. R. H.* 555.

17. BRYUM capſulis pendulis, foliis lanceolatis acuminato-ſetaceis, pedunculis longiſſimis. *fl. ſuec.* 905.

*——foliis ſubulatis, pedunculo longiſſimo, capitulo reflexo. *fl. lapp.* 402.

*——pendulum ovatum cæſpiticium & piloſum, ſetâ bicolori. *hiſt. muſc.* 396.

Muſcus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo-purpureo. *I. R. H.* 552.

18. BRYUM capſulis pendulis, foliis ovatis ſetiferis carinatis, pedunculis longiſſimis. *fl. ſuec.* 906.

*——foliis latiuſculis congeſtis, capſulis longis nutantibus. *hiſt. muſc.* 398.

Muſcus capillaceus major, capitulis craſſioribus cylindraceis nutantibus. *I. R. H.* 551.

19. BRYUM ſtellare hornum ſylvarum, capſulis magnis nutantibus. *hiſt. muſc.* 401.

Muſcus capillaceus major ſtellatus. *bot. par.* 134.

*——roſeus, Polygoni folio. *I. R. H.* 551.

20. BRYUM capſulis nutantibus, foliis ſubovatis obtuſis pellucidis punctatis, caulibus ſtrictibus, procumbentibus, pedunculis aggregatis. *fl. ſuec.* 901.

*——caule procumbente, foliis alternis ovatis pellucidis. *fl. lapp.* 404.

*——pendulum Serpilli folio rotundiore pellucido, capſulis ovatis. *hiſt. muſc.* 416.

Muſcus ſtellatus latifolius, capitulo ſingulari. *bot. par.*

*——folio lato ſubrotundo, capitulo ſingulari nutante pediculo longo ſubrubenti inſidente. *bot. par.* 136. *t.* 24. *f.* 5.

21. BRYUM annotinum paluſtre, capſulis ventricoſis pendulis. *hiſt. muſc.* 404.

Muſcus denticulatus lucens fluviatilis, maximus, ad ramulorum apices Adianti capitulis ornatus. *Pluk. almag.*

a. Muſcus capillaceus major & elatior, capitulis cylindraceis obtuſis nutantibus. *I. R. H.* 551. idem *ex hiſt. muſc.*

22. BRYUM capſulâ nutante turbinato-ovatâ, calyptrâ reflexâ quadrangulari. *fl. ſuec.* 903.

*——bulbiforme aureum, calyptrâ quadrangulari, capſulis pyriformibus nutantibus. *hiſt. muſc.* 407.

Muſcus capillaceus, folio rotundiore, capſulâ oblongâ incurvâ. *I. R. H.* 551.

23. BRYUM caule adſcendente, foliis ovato-oblongis patulis pellucidis. *fl. lapp.* 399. *fl. leyd. prodr.* 502. *obſ. pl.* 90.

*——dendroides polycephalon, Phyllitidis folio undulato pellucido, capſulis ovatis pendulis. *hiſt. muſc.* 410.

Muſcus Polygoni folio. *I. R. H.* 555.

*——roſeus polycephalus, Linariæ foliis undulatis. *bot. par.* 135.

24. BRYUM pendulum, foliis variis pellucidis, capſulis ovatis. *hiſt. muſc.* 413.

Muſcus paluſtris, foliis ſubrotundis. *I. R. H.* 555.

25. BRYUM hypnoides aquaticum, calyptris nigris acutis. *hiſt. muſc.* 367.

Muſcus aquaticus pileis acutis. *muſ. Petiv.* 74.

26. BRYUM erectis capitulis brevibus, foliis reflexis. *hiſt. muſc.* 365.

Muſcus trichoides paluſtris, capitulis erectis, foliis reflexis. *Rai. ſyn.* 338.

27. BRYUM capſulâ erectâ oblongâ minore, calyptris laxis æqualibus. *fl. ſuec.* 891.

*——calyptrâ extinctorii figurâ minus. *hiſt. muſc.* 349.

*——calyptrâ extinctorii figurâ majus & ramoſum. *hiſt. muſc.* 350.

Muſcus capillaceus minimus, calyptrâ longâ conoideâ nitidâ. *I. R. H.* 552.

28. BRYUM capſulâ erectiuſculâ oblongâ, caulium diviſuris pedunculiferis, ſummitatibus ſtellatis, foliis carinatis. *fl. ſuec.* 896.

*—tenue ſtellatum, ſetis purpureis. *hiſt. muſc.* 386.

Muſcus trichoides parvus, foliis muſci vulgaris, capitulis longis acutis. *hiſt. ox.* 3. 628.

*—capillaceus ramoſus parvus erectus, ſetis ruberrimis. *bot. par.* 188.

29. BRYUM capſulis erectis, caule erecto, ramis lateralibus brevibus fertilibus. *fl. lapp.* 396. *fl. ſuec.* 894.

*—hypnoides, hirſutie caneſcens vulgare. *hiſt. muſc.* 368.

Muſcus capillaceus denſiſſimus lanuginoſus. *I. R. H.* 551.

a. Muſcus capillaris lanugine caneſcens, pediculis tenuibus oblongis, capitulis in mucrones longos rectâ ſurſùm ex porrectis. *Rai. ſyn.* 31. 16. idem *ex hiſt. muſc.*

1. HYPNUM caule repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, capitulis erectis. *fl. lapp.* 412. *fl. ſuec.* 882.

*—vulgare ſericeum recurvum, capſulis erectis cuſpidatis. *hiſt. muſc.* 323.

Muſcus capillaceus ramoſus minor, capitulo anguſtiſſimo. *I. R. H.* 552.

2. HYPNUM myoſuroides tenuius, capſulis nutantibus. *hiſt. muſc.* 317.

Muſcus ſquamoſus minor myoſuroides, capſulis incurvis. *bot. par.* 137.

3. HYPNUM dentatum vulgatiſſimum, operculis obtuſis. *hiſt. muſc.* 295.

Muſcus denticulatus minor ſericeus noſtras, capitulis Adianti. *hiſt. ox.* 3. 626.

a. Muſcus ſquamoſus ramoſus craſſior, capitulis incurvis. *I. R. H.* 553. idem *ex hiſt. muſc.*

4. HYPNUM ſubhirſutum, viticulis gracilibus erectis, capſulis teretibus. *hiſt. muſc.* 307.

Muſcus terreſtris arborum ſtipitibus adnaſcens major & erectior. *Rai. hiſt.* 3. 47.

a. Muſcus ſquamoſus, viticulis longioribus glabris. *I. R. H.* 555. idem *ex hiſt. muſc.*

5. HYPNUM caule erecto, ramis

fasciculatis terminatricibus simpliciusculis, capsulis erectis. *fl. suec.* 886.
*——caule erecto, supernè undique ramoso. *fl. lapp.* 411.
*——dendroides fericeum, setis & capsulis longioribus erectis. *hist. musc.* 313.

Muscus squamosus ramosus erectus alopecuroides. *I. R. H.* 554.

6. HYPNUM caule erecto, ramis fasciculatis terminatricibus subdivisis, capsulis subnutantibus. *fl. suec.* 887.
*——dendroides obscurius, setis & capsulis brevioribus nutantibus. *hist. musc.* 315.

Muscus squamosus dendroides repens. *I. R. H.* 554.

7. HYPNUM quod Bryum caule erecto ramoso, foliis ovatis undique imbricatis. *fl. lapp.* 403. *ex obs. pl.* 78.
*——cupressiforme rotundius, vel Illecebræ æmulum. *hist. musc.* 311.

Muscus terrestris, furculis Kali aut Illecebræ æmulis, foliis subrotundis squamatim incumbentibus. *Rai. syn.* 2. 37.

8. HYPNUM ramis vagis recurvis, foliis ovatis rectis acutis patulis. *fl. ſuec.* 881.

*——ramis inæqualibus, foliis laxè imbricatis triangularibus acutis. *fl. lapp.* 409.

*——vulgare triangulum maximum & pallidum. *hiſt. muſc.* 293.

Muſcus ſquamoſus major, ſive vulgaris. *I. R. H.* 553.

9. HYPNUM loreum montanum, capſulis ſubrotundis. *hiſt. muſc.* 305.

Muſcus ſquamoſus major, foliis anguſtioribus acutiſſimis. *I. R. H.* 553.

10. HYPNUM caule repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, capitulis ſubnutantibus. *fl. ſuec.* 883.

*——velutinum, capſulis ovatis cernuis. *hiſt. muſc.* 326.

Muſcus ſquamoſus ramoſus tenuior, capitulis incurvis. *I. R. H.* 553.

11. HYPNUM ramis pinnato-ſparſis ſubulatis, foliis ovatis obtuſis conniventibus. *fl. ſuec.* 876.

*——ramis inæqualibus ſparſis, foliis

ovatis imbricatis capitulis obliquis. *fl. lapp.* 410.

*——cupreſſiforme vulgare, foliis obtuſis. *hiſt. muſc.* 309.

Muſcus ſquamoſus cupreſſiformis. *I. R. H.* 554.

12. HYPNUM caule repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, capitulis erectis. *fl. lapp.* 412. *fl. ſuec.* 882.

*——vulgare ſericeum recurvum, capitulis erectis cuſpidatis. *hiſt. muſc.* 323.

Muſcus muralis repens ſericeus, foliis ſplendentibus. *muſ. Petiv.* 83.

13. HYPNUM ramis vagis apice foliis convolutis acuminatis. *fl. ſuec.* 884.

*——paluſtre, extremitatibus cuſpidatis & pungentibus. *hiſt. muſc.* 300.

Muſcus ſquamoſus paluſtris aureus, foliis flagelliſque rigidiuſculis, capitulis incurvis. *bot. par.* 138. *t.* 28. *f.* 11.

a. Muſcus ramoſus paluſtris major, foliis membranaceis acutis. *Rai. ſyn.*

39. 19. idem *ex hiſt. muſc.*

14. HYPNUM trichodes ſerpens, ſetis & capſulis longis erectis. *hiſt. muſc.* 329.

Muſcus terreſtris omnium minimus, capitulis majuſculis oblongis erectis. *Rai. ſyn.* 38. 11.

15. HYPNUM foliis lanceolatis alternis remotis. *fl. ſuec.* 885.

*—erectum aut fluitans, foliis oblongis peranguſtis acutis. *hiſt. muſc.* 299.

Muſcus fluitans, foliis & flagellis longis tenuibuſque. *Rai. ſyn. app.* 338.

16. HYPNUM ramis vagis, foliis ovatis apice ſubulatis undique reflexis. *fl. ſuec.* 878.

*—repens, triangularibus reflexis foliis, majus & minus. *hiſt. muſc.* 303. & 304.

Muſcus erectus, foliis reflexis. *Rai. ſyn. app.* 337.

17. HYPNUM pennatum undulatim criſpum, ſetis & capſulis brevibus. *hiſt. muſc.* 273.

Muſcus vulgaris pennatus major.

Pin. 360. verus *ex Dill. & Hall.*

* Muſcus ſquamoſus, Linariæ folio, minor & criſpus, capitulis incurvis. *I. R. H.* 554.

a. an Muſcus vulgaris pennatus minor. *Pin.* 360 ? aſſerere non auſit Dillenius.

18. HYPNUM cupreſſiforme tenuius & compreſſius. *hiſt. muſc.* 312.

Muſcus ſquamoſus elatior ramoſus, caulibus compreſſis. *I. R. H.* 553.

19. HYPNUM caule ſubpinnato, foliis ſecundis recurvis apice ſubulatis. *fl. ſuec.* 880.

*——criſpum cupreſſiforme, foliis aduncis. *hiſt. muſc.* 287.

Muſcus terreſtris aureus minor, flagellis claviſque brevioribus. *hiſt. ox.* 3. 624.

*——ſquamoſus ramoſus minor & criſpus. *I. R. H.* 553.

20. HYPNUM pennatum compreſſum & ſplendens, capſulis ovatis. *hiſt. muſc.* 268.

Muſcus ſquamoſus denticulatus

ſplendens arboreus. *I. R. H.* 555.

21. HYPNUM Taxiforme exiguum, verſus ſummitatem capſuliferum. *hiſt. muſc.* 262.

Muſcus pennatus omnium minimus. *I. R. H.* 556.

22. HYPNUM denticulatim pennatum, pinnulis duplicatis recurvis. *hiſt. muſc.* 266.

Muſcus pennatus capitulis Adianti. *Rai. ſyn. app.* 236.

a. Muſcus pennatus denticulatus minor. *bot. par.* 140. *t.* 29. *f.* 8. *ex hiſt. muſc.*

*——ſquamoſus non ramoſus major & minor, capitulis incurvis. *I. R. H.* 553.

23. HYPNUM ramis proliferis plano-pinnatis. *fl. lapp.* 405. *fl. ſuec.* 872. *fl. leyd. prodr.* 505.

*——filicinum, Tamariſci foliis minoribus non ſplendentibus. *hiſt. muſc.* 276.

Muſcus filicinus major. *Pin.* 360. *bot. par.* 140. *t.* 25. *f.* 1.

24. HYPNUM repens filicinum, triangularibus parvis foliis, prælongum. *hiſt. muſc.* 278.

an Muſcus filicinus minor. *Pin.* 360. *bot. par.* 140. *tab.* 23. *f.* 9 ?

25. HYPNUM ramis plano-pinnatis, continuatâ ſerie extenſis. *fl. lapp.* 406. *fl. ſuec.* 873.

*——filicinum, Tamariſci foliis majoribus ſplendentibus. *hiſt. muſc.* 274.

Muſcus filicinus major flaveſcens ramoſus. *bot. par.* 140. *t.* 28. *f.* 1.

*——vulgaris pennatus major. *Pin.* 360. *ex Tourn. & Vaill.*

a. an etiam muſcus vulgaris pennatus minor. *Pin.* 360 ? Neſcit Dillenius.

26. HYPNUM ramulis pinnatis teretiuſculis remotis inæqualibus. *fl. lapp.* 408. *fl. ſuec.* 874.

*——luteſcens, alis ſubulatis tenacibus. *hiſt. muſc.* 280.

Muſcus pennatus minor, cauliculis ramoſis, in ſumnitate veluti ſpicatus. *bot. par. t.* 29. *f.* 12.

*——ſquamoſus viticulis longiſſimis abietinis. *I. R. H.* 554.

27. HYPNUM ramis pinnatis, ramulis diſtantibus, foliolis imbricatis

incurvis acutis ſecundis. *fl. ſuec.* 875.
*——repens filicinum criſpum. *hiſt. muſc.* 282.

Muſcus paluſtris abietiformis, foliis reflexis. *bot. par.* 141. *t.* 23. *f.* 12.

28. HYPNUM ramis pinnatis, ramulis approximatis apicibus recurvis. *fl. ſuec.* 871.
*——ramulis plano-pinnatis, pinnis contiguis apicibus deflexis. *fl. lapp.* 407.
*——filicinum, criſtam caſtrenſem repræſentans. *hiſt. muſc.* 284.

Muſcus terreſtris repens ſubflavus, foliolis criſpis minoribus ramuliſque denſiùs confertis. *hiſt. ox.* 3. 625. *a.* Muſcus criſtam caſtrenſem repræſentans flaveſcens nemoroſus ramoſus caſſubicus. *hiſt. ox.* 3. 625. *bot. par.* 141. *t.* 27. *f.* 1. idem. *ex fl. ſuec.*
*——ſquamoſus, viticulis longiſſimis abietinis. *I. R. H.* 554.

1. MNIUM caule ramoſo androgynum. *fl. ſuec.* 910.
*——peranguſtis & brevibus foliis. *hiſt. muſc.* 230.

Muſcus capillaceus minimus, capitulo minimo pulverulento. *I. R. H.* 562.

2. MNIUM caule ſimplici, foliis ovatis. *fl. ſuec.* 911.

*——Serpilli foliis tenuibus pellucidis. *hiſt. muſc.* 232.

Muſcus coronatus minimus, capillaceis foliis, capitulis oblongis. *bot. par.* 130. *t.* 24. *f.* 7.

3. MNIUM caule dichotomo, foliis ſubulatis. *fl. lapp.* 413. *fl. ſuec.* 912.

*——majus, ramis longioribus bifurcatis. *hiſt. muſc.* 233.

Muſcus capillaceus paluſtris, flagellis longioribus bifurcatis. *I. R. H.* 551.

*——paluſtris erectus flaveſcens, capillaceo folio. *bot. par.* 135. *t.* 24. *f.* 1.

4. MNIUM caule ſimplici geniculis inflexo. *fl. lapp.* 414. *fl. ſuec.* 913.

* Bryum paluſtre, ſcapis teretibus ſtellatis, capſulis magnis ſubrotundis. *hiſt. muſc.* 340.

Muſcus

Muſcus ſquamoſus erectus minimus. *I. R. H.* 555.

*——roſeus, Polygoni folio. *I. R. H.* 551.

*——capillaceus major ſtellatus. *bot. par. t.* 24. *f.* 5.

*——capillaceus tenuiſſimus, pediculo longiſſimo purpuraſcente, capitulo rotundiori. *bot. par. tab.* 24. *fig.* 10.

1. SPHAGNUM acaulon bulbiforme minus. *hiſt. muſc.* 452.

Muſcus trichoides acaulos minor latifolius. *muſ. Petiv.* 86.

2. SPHAGNUM acaulon trichodes. *Cat. Giſſ.* 229. *hiſt. muſc.* 251.

Muſcus trichoides minor acaulos, capillaceis foliis. *muſ. Petiv.* 87.

3. SPHAGNUM caulibus ramoſis, foliis undique imbricatis capſulas obtegentibus. *fl. ſuec.* 865.

*——ſubhirſutum obſcurè virens, capſulis rubellis. *hiſt muſc.* 245.

*——nodoſum hirſutum & incanum. *hiſt. muſc.* 246.

Muſcus ſquamoſus ſaxatilis tortuoſus ac nodoſus. *I. R. H.* 555.

*—apocarpos hirsutus, saxis adnascens, capitulis obscurè rubris. 10. *Rai. hist.* 3. 40.

4. SPHAGNUM heteromallum polycephalum. *hist. musc.* 248.

Muscus apocarpos arboribus adnascens polyspermos. 7. *Rai. hist.* 3. 39.

5. SPHAGNUM pennatum undulatum, vaginâ squamosâ. *hist. musc.* 250.

Muscus Linariæ folio, major & crispus. *I. R. H.* 554.

*—terrestris major, ramulis compressis, foliis superficie crispis. *Rai. syn. app.* 337.

6. SPHAGNUM ramis deflexis. *fl. lapp.* 415. *fl. suec.* 864.

*—palustre molle deflexum, squamis cymbiformibus. *hist. musc.* 240.

*—palustre molle deflexum, squamis capillaceis. *hist. musc.* 243.

Muscus squamosus palustris candicans, mollissimus. *I. R. H.* 554.

*—squamosus palustris purpurascens mollissimus. *bot. par.* 139. *t.* 23. *f.* 3.

1. FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis acutis, capſulis lateralibus. *fl. ſuec.* 866.

*——triangularis major complicata, è foliorum alis capſulifera. *hiſt. muſc.* 254.

Muſcus ſquamoſus, foliis acutiſſimis, in aquis naſcens. *I. R. H.* 554.

1. LYCOPODIUM caule repente, foliis patulis, pedunculis ſpicâ geminâ terminatis. *fl. lapp.* 418. *hort. cliff.* 476. *fl. ſuec.* 659. *fl. leyd. prodr.* 506.

*——vulgare piloſum an fragoſum & repens. *hiſt. muſ.* 441.

Lycopodium vulgare. *bot. par.* 123.

* Muſcus terreſtris clavatus. *Pin.* 360.

2. LYCOPODIUM caule repente, ramis tetragonis. *fl. lapp.* 417. *hort. cliff.* 476. *fl. ſuec.* 861. *fl. leyd. prodr.* 506.

*——ſabinæ facie. *hiſt. muſ.* 445.

Lycopodium Cypreſſi foliis. *bot. par.* 123.

* Muſcus clavatus, foliis Cupreſſi. *Pin.* 360.

3. LYCOPODIUM caule repente, spicis solitariis sessilibus foliosis, foliolis lævibus. *fl. suec.* 862.

*——palustre repens, clavâ singulari. *hist. musc.* 452. *bot. par.* 123.

Muscus terrestris repens, clavis singularibus foliosis erectis. *Rai. syn.* 27.

ALGÆ.

1. MARCHANTIA calyce communi decemfido, laciniis linearibus. *fl. lapp.* 422. *fl. suec.* 931. *fl. leyd. prodr.* 507.

* Lichen fontanus major stellatus æquè ac umbellatus & cyathophorus. *hist. musc.* 523.

Hepatica officinarum. 1ª. *tabern. ic.* 815.

* Lichen petræus latifolius, sive hepatica fontana. *Pin.* 362. HE'PATIQUE.

a. Lichen domesticus minor stellatus æquè ac umbellatus & cyatophorus. *hist. musc.* 527. *ex fl. suec.*

Hepatica petræa stellata. 2ª. *tabern. c.* 815.

* Lichen petræus ſtellatus. *Pin.* 362.

b. Marchantia calyce communi octo partito, laciniis è plano convexis. *fl. lapp.* 423. *fl. leyd. prodr.* 607. *ex fl. ſuec. variet. præced. a. ex hiſt. muſc.*

Hepatica petræa umbellata. 3ª. *tab. ic.* 815.

* Lichen petræus umbellatus. *Pin.* 362.

2. MARCHANTIA calyce communi conico plurifariam partito. *obſ. pl.* 52.

* Lichen vulgaris major pileatus & verrucoſus. *hiſt. muſc.* 516.

Hepatica pileata & ſtellata. *bot. par.* 98.

* Lichen petræus, cauliculo pileolum ſuſtinente. *Pin.* 362.

3. MARCHANTIA quæ Lichen feminifer lunulatus, florifer pileatus, tandem cruciatus. *hiſt. muſc.* 521.

Lichen ſive hepatica lunulata Epiphyllo-carpos. 7. *Rai. hiſt.* 125.

* Hepatica reticulata & verrucoſa. *bot. par.* 97. *tab.* 33. *f.* 8.

1. ANTHOCEROS. *hort. cliff.* 477. *fl. leyd. prodr.* 507.

Anthoceros major & minor. *Mich. gen.* 11. *t.* 7. *f.* 1. 2.

1. RICCIA foliis aſpergine cryſtallina perfuſis margine incraſſatis. *act. ſtock.* 1741. 209. *fl. ſuec.* 935.

* Lichen paluſtris, Rutæ folio. *hiſt. muſc.* 535.

Hepatica paluſtris, lobis criſtatis. *bot. par.* 98.

2. RICCIA minima pinguis, foliis latiuſculis amplè ſulcatis è glauco vireſcentibus. *Mich. nov. gen.* 107. *obſ. pl.* 54.

* Lichen minimus, foliis venoſis bifariam vel trifariam ſe dividendo progredientibus. *hiſt. muſc.* 533.

Hepatica paluſtris bifurcata, lobis brevioribus carinatis. *bot. par.* 98.

1. JUNGERMANNIA acaulis linearis ramoſa extremitatibus furcatis obtuſiuſculis. *fl. ſuec.* 928.

* Lichenaſtrum tenuifolium furca-

tum, thecis globosis pilosis. *hist. musc.* 512.

Hepatica arborea globuligera. *bot. par. tab.* 23. *fig.* 2.

2. JUNGERMANNIA quæ Hepatica paluſtris dichotoma, ſegmentis oblongis & anguſtis. *bot. par.* 98.

* Lichenaſtrum aquaticum fluitans tenuifolium furcatum. *hiſt. muſc.* 514.

3. JUNGERMANNIA quæ Lichenaſtrum pinnis auriculatis majoribus & non crenatis. *hiſt. muſc.* 490.

Hepatica ſaxatilis undulata ſeminifera. *bot. par.* 98.

4. JUNGERMANNIA acaulis, foliolo folio innato. *fl. ſuec.* 930.

* Hypophyllum. *act. ſtock.* 1741. 209.

* Lichenaſtrum capitulis rotundis è foliorum medio enaſcentibus. *hiſt. muſc.* 508.

Hepaticoides hepaticæ facie. *bot. par.* 99.

* Lichen petræus cauliculo calceato. *Pin.* 362.

* 2. JUNGERMANNIA auriculis linearibus planis æqualibus multoties dichotomis.

5. JUNGERMANNIA caule ramoso repente, foliis imbricatis ovatis crenulatis, alternis minoribus. *fl. leyd. prodr.* 508.

* Lichenastrum asplenii facie, pinnis laxioribus. *hist. musc.* 482.

Hepaticoides Polytrichi facie. *bot. par.* 99.

* Muscus Nummulariæ foliis subrotundis densè positis. *I. R. H.* 555. *a.* Lichenastrum asplenii facie, pinnis confertioribus. *hist. musc.* 483. *variet. Dillenio videtur.*

Muscus Nummulariæ folio, major. *I. R. H.* 555.

* Hepatica asplenioides ramosa major florida. *bot. par.* 99.

6. JUNGERMANNIA major repens, foliis bifidis. *obs. pl.* 57.

* Lichenastrum pinnulis acutioribus & concavis bifidis, majus. *hist. musc.* 487.

Hepaticoides Polytrichi facie, foliis bifidis, major. *bot. par.* 99.

* Muscus pennatus, foliis subrotundis bifidis, major. *I. R. H.* 555.

7. JUNGERMANNIA ſurculis pinnatis, foliolis recurvis planis auriculatis. *fl. ſuec.* 916.

* Lichenaſtrum auriculatum, pinnulis anguſtis planis recurvis. *hiſt. muſc.* 492.

Hepaticoides albeſcens, foliis pennatis. *bot. par.* 100.

* Muſcus Nummulariæ folio, fructu pediculo carente. *I. R. H.* 555.

8. JUNGERMANNIA ſurculoſa repens, foliolis duplicato-imbricatis, infernè auriculatis ciliatis. *fl. ſuec.* 918.

*——caule ramoſo, ſurculis compreſſis, foliis imbricatis ſerie duplici ovato-acutis ciliatis. *fl. lapp.* 426.

* Lichenaſtrum arboris vitæ facie, foliis minùs rotundis. *hiſt. muſc.* 502.

Hepaticoides foliis ſubrotundis ſquamatim incumbentibus, major. *bot. par.* 100.

* Muſcus ſquamoſus foliis ſubrotundis denſiſſimis. *I. R. H.* 554.

9. JUNGERMANNIA ſurculoſa repens, foliolis infernè auriculatis.

duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *fl. ſuec.* 919.

*—foliis imbricatis ſerie duplici, ſuperioribus ſubrotundis majoribus convexis obtuſis quadruplo-majoribus. *fl. lapp.* 425. *fl. leyd. prodr.* 508.

* Lichenaſtrum imbricatum minus, ſquamis convexo-concavis. *hiſt. muſc.* 497.

Hepaticoides foliis ſubrotundis, ſquamatim incumbentibus minor. *bot. par.* 100.

* Muſcus ſaxatilis, Nummulariæ folio, minor. *I. R. H.* 555.

10. JUNGERMANNIA quæ Lichenaſtrum filicinum pulchrum villoſum. *hiſt. muſc.* 503.

Muſcus paluſtris, abſinthii folio, inſipidus. *I. R. H.* 556.

1. LICHEN fruticuloſus perforatus ramoſiſſimus ramulis nutantibus. *flſuec.* 980.

*—caule erecto tereti ramoſiſſimo, alis perforatis. *fl. lapp.* 437. *fl. virg.* 203. *fl. leyd. prodr.* 511.

* Coralloides montanum fruticuli

ſpecie ubique candicans. *hiſt. muſc.* 107.

Coralloides corniculis candidiſſimis. *I. R. H.* 566.

2. LICHEN qui Coralloides fruticuli ſpecie candicans, corniculis rufeſcentibus. *hiſt. muſc.* 110. *an. prioris n.* 1. *varietas ?*

Coralloides corniculis rufeſcentibus. *I. R. H.* 566.

3. LICHEN fruticuloſus tubuloſus dichotomus, ramis ſimplicibus ſubulatis. *fl. ſuec.* 981.

*——caule erecto dichotomo, ramis ſubulatis. *fl. lapp.* 435. *fl. leyd. prodr.* 512.

Coralloides corniculis longioribus & rarioribus. *hiſt. muſc.* 102.

Coralloides cornua Cervi referens, corniculis brevioribus. *I. R. H.* 565.

*——eadem corniculis longioribus. *I. R. H.* 565.

*——aſpera, corniculis tenuioribus bifurcatis. *hiſt. par.* 423.

*——glabra, corniculis tenuioribus bifurcatis. *hiſt. par.* 423.

4. LICHEN fruticulosus perforatus, ramulis brevissimis acutis. *fl. suec.* 979.

*——caule ramoso, alis perforatis, ramis brevissimis acutis. *fl. lapp.* 438. *fl. leyd. prodr.* 511.

Coralloides perforatum majus molle & crassum. *hist. musc.* 98.

* Coralloides perforatum minus molle & tenue. *hist. musc.* 99.

Coralloides tubulosa, ramulis crassioribus. *bot. par.* 42.

* Corallina montana tubulosa, ramulis crassioribus. *Rai. syn.* 332.

5. LICHEN scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus integris. *fl. suec.* 976.

*——caule simplici subulato rariùs bifido. *fl. lapp.* 434. *fl. leyd. prodr.* 512.

Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. *hist. musc.* 90.

Coralloides non ramosa tubulosa. *bot. par.* 42.

* Musco-fungus petræus corniculatus, cornibus indivisis & incurvatis. *hist. ox.* 3. 633.

6. LICHEN ſcyphifer ſimplex crenulatus, tuberculis fuſcis. *fl. ſuec.* 971.

*—caule ſimplici, calyce turbinato, margine tenui. *fl. lapp.* 428. *fl. virg.* 203. *fl. leyd. prodr.* 512.

* Coralloides ſcyphiforme, tuberculis fuſcis. *hiſt. muſc.* 79.

Lichen pyxidatus major. *I. R. H.* 549.

*—pyxidatus major rugoſus. *bot. par.* 115. *ex hiſt. muſc.*

*—pyxidatus verticillatus prolifer. *bot. par.* 115. *ex hiſt. muſc.*

*—pyxidatus, acetabulorum oris fuſcis & tumentibus *I. R. H.* 549. *ex hiſt. muſc.*

*—pyxidatus prolifer. *I. R. H.* 549. *ex fl. ſuec.*

7. LICHEN ſcyphifer ſimplex denticulatus, ſtipite cylindrico. *fl. ſuec.* 973.

*—caule ſimplici, calyce turbinato, margine acuto prolifero. *fl. lapp.* 430. *fl. leyd. prodr.* 512.

* Coralloides ſcyphiforme gracile,

marginibus ſerratis. *hiſt. muſc.* 84.

Lichen pyxidatus minor. *I. R. H.* 549. *bot. par.* 115.

8. LICHEN ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. *fl. ſuec.* 972.

*——caule ſimplici, calyce turbinato, margine carnoſo colorato prolifero. *fl. lapp.* 429. *fl. leyd. prodr.* 512.

* Coralloides ſcyphiforme, tuberculis coccineis. *hiſt. muſc.* 82.

Lichen pyxidatus, oris coccineis & tumentibus. *I. R. H.* 549. *bot.* 115.

9. LICHEN ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus dentatis. *fl. ſuec.* 977.

*——caule ſimplici, apice acuto, aut calyce turbinato terminatrice. *fl. lapp.* 433.

* Coralloides craſſius ſubincanum, calycibus dentatis. *hiſt. muſc.* 95.

Lichen pyxidatus teres, acetabulis minoribus repandis. *Mich. gen.* 80. *t.* 41. *f.* 1.

10. LICHEN qui Coralloides ſcyphiforme oſſis femoris facie. *hiſt.*

muſc. 91. *an. præced.* 9. *varietas* ?

Lichen pyxidatus teres, acetabulis minoribus repandis. *I. R. H.* 549.

11. LICHEN qui Coralloides ſcyphiforme cornutum. *hiſt. muſc.* 92.

Lichen pyxidatus ramoſus & non ramoſus, acetabulis fimbriatis. *I. R. H.* 549.

a. Lichen pyxidatus, corniculis aduncis. *hiſt. pl. Par.* 483. *ex hiſt. muſc.*

* Coralloides cornua cervi referens, corniculis aduncis. *bot. par.* 42. *ex hiſt. muſc.*

12. LICHEN qui Coralloides ſcyphiforme, foliis alcicorniformibus cartilaginoſis. *hiſt. muſc.* 87.

Lichen pyxidatus Endiviæ criſpæ folio, prolifer acetabulorum oris criſpis. *I. R. H.* 549.

13. LICHEN foliaceus erectiuſculus, laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis. *fl. ſuec.* 952.

*—foliis laciniatis cinereis, laciniis linearibus apicepiloſis. *fl. leyd. prodr.* 509.

* Lichenoides hiſpidum majus & rigidius, ſcutellis nigris. *hiſt. muſc.* 150.

Lichen cinereus arboreus, marginibus piloſis, major. *bot. par.* 115.

* Lichen cinereus latifolius aculeatus umbilicis nigricantibus. *I. R. H.* 549.

14. LICHEN qui Lichenoides hiſpidum minus & tenerius, ſcutellis nigris. *hiſt. muſc.* 152.

Lichen cinereus arboreus, marginibus piloſis, minor. *bot. par.* 115.

15. LICHEN foliaceus erectiuſculus lacunoſus, ſubtùs tomentoſus albus. *fl. ſuec.* 954.

*——foliis mollibus candicantibus dichotomis, calycibus orbiculatis ſeſſilibus. *fl. leyd. prodr.* 570.

* Lichenoides cornutum bronchiale molle ſubtùs incanum. *hiſt. muſc.* 160.

Lichen cinereus vulgatiſſimus, cornua Damæ referens. *bot. par.* 115.

* Muſcus arboreus ramoſus. *bauh. hiſt.* 3. 764.

16. LICHEN foliaceus erectus compreſſus ramoſus farinaceus, lateribus verrucoſis. *fl. ſuec.* 957.

*——foliis multifidis, calycibus in margine laciniarum ſeſſilibus. *fl. leyd. prodr.* 510.

* Lichenoides ſegmentis anguſtioribus ad margines verrucoſis & pulverulentis. *hiſt. muſc.* 172.

Lichen cinereus anguſtior, ſcutis in marginibus ſegmentorum. *bot. par.* 115

17. LICHEN foliaceus erectus linearis ramoſus lacunoſus convexus mucronatus. *fl. ſuec.* 956.

* Lichenoides Coralliforme roſtratum & canaliculatum. *hiſt. muſc.* 170.

Lichen cinereus latifolius ramoſus. *I. R. H.* 550.

*——pyxidatus Damæ cornu diviſurâ acetabulorum oris criſpis. *I. R. H.* 549.

18. LICHEN qui Lichenoides longifolium rugoſum rigidum. *hiſt. muſc.* 165.

Lichen cinereus Lactucæ folio. *Elem. bot.* 438.

*—pulmonarius cinereus mollior in amplas lacinias divisus. *I. R. H.* 549.

19. LICHEN qui Coralloides fruticuli specie fuscum spinosum. *hist. musc.* 112.

Lichen terrestris angustior ramosissimus fuscus. *bot. par.* 115.

20. LICHEN foliaceus repens laciniatus obtusus glaber suprà lacunosus, subtùs tomentosus. *fl. suec.* 960.

*—foliis oblongis divisis, superficie reticulatâ punctatâ. *fl. lapp.* 444. *fl. leyd. prodr.* 509.

*—Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *hist. musc.* 212.

Lichen arboreus, seu Pulmonaria arborea. *Bauh. hist.* 3. 759. PULMONAIRE DE CHESNE.

21. LICHEN foliaceus repens lobatus obtusus planus, subtùs venosus villosus, peltâ marginali adscendente. *fl. suec.* 961.

*—foliis planis subrotundis lobatis

obtusis, calyce plano, lacinulâ propriâ adnato. *fl. lapp.* 441. *fl. leyd. prodr.* 508.

* Lichenoides digitatum cinereum, Lactucæ foliis sinuosis. *hist. musc.* 200.

Lichen pulmonarius saxatilis digitatus. *bot. par.* 116.

*——terrestris cinereus. *Rai. hist.* 1. 117.

22. LICHEN qui Lichenoides caperatum rosaceè expansum è sulphureo virens. *hist. musc.* 193.

Lichen pulmonarius saxatilis maximus. *bot. par.* 116.

23. LICHEN qui Lichenoides glaucum perlatum, subtùs nigrum & cirrhosum. *hist. musc.* 147.

Lichen arboreus subtùs nigricans. *hist. ox; bot. par.* 116.

24. LICHEN imbricatus, foliolis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis. *fl. suec.* 950.

* Lichenoides cinereum, segmentis angustis stellatis, scutellis nigris. *hist. musc.* 176.

Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens, tenuiter diviſus. *I. R. H.* 548.

25. LICHEN imbricatus, foliolis multifidis glabris obtuſis canis, punctis vagis eminentibus. *fl. ſuec.* 947.

*—foliis planis acutè laciniatis rubiginoſo-albidis. *fl. lapp.* 447. *fl. leyd. prodr.* 509.

* Lichenoides ſaxatile tinctorium, foliis piloſis purpureis. *hiſt. muſc.* 185.

Lichen nigricans omphalodes. *I. R. H.* 549.

26. LICHEN foliaceus laciniatus criſpus fulvus. *fl. ſuec.* 967.

*—fulvus, ſinubus dædaleis, laciniatus. *fl. lapp.* 450. *fl. leyd. prodr.* 510.

* Lichenoides vulgare ſinuoſum, foliis & ſcutellis luteis. *hiſt. muſc.* 180.

Lichen Dioſcoridis & Plinii 2. colore flaveſcente vel cinereo. *Col.* 1. 331.

27. LICHEN qui Lichenoides olivaceum, ſcutellis lævibus. *hiſt. muſc.* 182.

Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens pullus. *I. R. H.* 548.

28. LICHEN qui Lichenoides cruſtaceum & leproſum, ſcutellis nigricantibus majoribus & minoribus. *hiſt. muſc.* 133.

Lichen cruſtaceus leproſus, ſcutis nigricantibus. *bot. par.* 116.

a. Lichen terreſtris leproſus cinereus, ſcutis nigricantibus. *idem ex hiſt. muſc.*

29. LICHEN qui Lichenoides leproſum tinctorium, ſcutellis lapidum cancri figurâ. *hiſt. muſc.* 130.

Lichen cruſtaceus, leproſus, ſcutis cinereis. *bot. par.* 116.

30. LICHEN qui Lichenoides candidum & farinaceum, ſcutellis ferè planis. *hiſt. muſc.* 131.

Lichen cruſtaceus albeſcens, ſcutis farinaceis. *Petiv. hiſt. ox.* 3. 634. *bot. par.* 116.

31. LICHEN leproſus albicans, ſcutellis ſubfuſcis, margine cinereo ſubcrenato. *fl. ſuec.* 943.

* Lichenoides cruſtaceum & lepro-

ſum, ſcutellis ſubfuſcis. *hiſt. muſc.* 134.

Lichen cruſtaceus cinereus, ſcutis ferrugineis. *bot. par.* 116.

32. LICHEN foliaceus umbilicatus, ſubtùs lacunoſus. *fl. ſuec.* 969.

*——folio orbiculato peltato, margine integriuſculo undique glaber. *fl. lapp.* 452. *fl. leyd. prodr.* 511.

* Lichenoides coriaceum cinereum, peltis atris compreſſis. *hiſt. muſc.* 219.

Lichen pulmonarius ſaxatilis cinereo-fuſcus minimus. *I. R. H.* 549.

33. LICHEN foliaceus umbilicatus, undique lævis. *fl. ſuec.* 970.

*——folio orbiculato, margine integriuſculo, ſuperficie ſubtùs lacunatâ. *fl. lapp.* 453. *fl. leyd. prodr.* 511.

* Lichenoides puſtulatum cinereum & veluti ambuſtum. *hiſt. muſc.* 227.

Lichen cruſtæ modo ſaxis adnaſcens verrucoſus cinereus & veluti deuſtus. *I. R. H.* 549.

34. LICHEN filamentoſus ramoſus erectus, ſcutellis radiatis. *fl. ſuec.* 991.

*—caule ramoso solido, foliis setaceis, receptaculis maximis orbiculatis peltatis ciliato-radiatis. *hort. cliff.* 477. *fl. leyd. prodr.* §13.

* Usnea vulgatissima tenuior & brevior, cum orbiculis. *hist. musc.* 69.

Lichen cinereus vulgaris, capillaceo folio, minor. *I. R. H.* 550.

35. LICHEN foliaceus adscendens laciniatus, marginibus elevatis ciliatis. *fl. suec.* 959.

*—foliis oblongis laciniatis, marginibus conniventibus ciliatis. *fl. lapp.* 455. *fl. leyd. prodr.* 508.

* Lichenoides rigidum, Eryngii folia referens. *hist. musc.* 209.

Coralloides cornua Damæ referens. *Elem. bot.* 442. *I. R. H.* 565.

36. LICHEN qui Lichenoides polyschides villosum & scabrum, peltis parvis. *hist. musc.* 199.

Lichen pulmonarius saxatilis rufescens supernè planus, infernè reticulatus. *hist. pl. Par.* 483.

37. LICHEN filamentosus pen-

dulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis. *fl. ſuec.* 984.

*——ramis filiformibus ramoſis pendulis confertis. *fl. lapp.* 457. *fl. virg.* 203.

* Uſnea vulgaris, loris longis implexis. *hiſt. muſc.* 56.

Muſcus arboreus, uſnea officinarum. *Pin.* 361.

1. LEMNA foliis ſeſſilibus utrinque planiuſculis, radicibus ſolitariis. *hort. cliff.* 477. *fl. ſuec.* 999. *fl. leyd. prodr.* 516.

Lenticula paluſtris vulgaris. *Pin.* 362. LENTILLE D'EAU.

2. LEMNA foliis ſeſſilibus, radicibus confertis. *hort. cliff.* 477. *fl. ſuec.* 997. *fl. leyd. prodr.* 516.

Lenticula paluſtris major. *Cat. Lugd. bat.*

3. LEMNA foliis petiolatis. *fl. lapp.* 470. *hort. cliff.* 477. *fl. ſuec.* 1000. *fl. leyd. prodr.* 516.

Lenticula aquatica triſulca. *Pin.* 362.

1. MARSILEA. *gen. pl.* 961.

Pilularia

Pilularia paluſtris juncifolia. *boc. par.* 159. PILULAIRE.

* Graminifolia paluſtris repens, vaſculis granorum Piperis æmulis. *Rai. ſyn.* 281.

1. CHARA vulgaris. *fl. lapp.* 469. *fl. ſuec.* 992.

*——caulibus lævibus. *fl. leyd. prodr.* 533.

Hippuris qui equiſetum fœtidum ſub aquâ repens. *Pin.* 16. LUSTRE, ou GIRANDOLE D'EAU.

* Chara vulgaris fœtida. *act. Acad. reg. Sç.* 1719. *p.* 17.

2. CHARA aculeis caulinis ovatis. *fl. ſuec.* 993.

Hippuris qui Equiſetum fragile majus ſubcinereum aquis immerſum. *hiſt. ox.* 3. 621.

* Chara major ſubcinerea fragilis. *act. Acad. reg. Sç.* 1719. 18.

3. CHARA aculeis caulinis capillaribus. *fl. ſuec.* 994.

*——caulibus aculeatis. *hort. cliff.* 477. *fl. leyd. prodr.* 214.

Hippuris qui Equiſetum, ſive hip-

puris muſcoſus, cauliculis ſpinulis crebriùs exaſperatis, ſub aquis repens, Sherardi. *hiſt. ox.* 3. 621.

* Chara major, caulibus ſpinoſis. *act. Acad. reg. Sc.* 1719.

4. CHARA quæ Equiſetum ſive hippuris lacuſtris foliis manſu arenoſis Geſnero. *Pluk. Phyt. tab.* 29. *f.* 4.

*——foliis ſenis, inferioribus integris. *act. Acad. reg. Sc.* 1719.

5. CHARA quæ hippuris foliis non articuloſis longioribus & lucidis. *bot. par.* 105.

*——tranſlucens major flexilis. *act. Acad. reg. Sc.* 1719.

6. CHARA quæ hippuris breviſſimis & tenuiſſimis ſetis, polyſpermos. *bot. par.* 105.

*——tranſlucens minor flexilis. *act. Acad. reg. Sc.* 1719.

1. ULVA tubuloſa ſimplex. *fl. lapp.* 458. *hort. cliff.* 458. *fl. ſuec.* 1013. *fl. leyd. prodr.* 515. *fl. virg.* 204. 128.

* Tremella marina tubuloſa, in-

teſtinorum figurâ. *hiſt. muſc.* 47.

Fucus tubuloſus inteſtinorum formâ. *I. R. H.* 568.

2. ULVA quæ Tremella paluſtris gelatinoſa, Damæ cornuum facie. *hiſt. muſc.* 51.

Fucus fontanus, pinguis corniculatus viridis. *bot. par.* 56. *tab.* 10. *fig.* 3.

1. CONFERVA filis ſimpliciſſimis æqualibus longiſſimis. *fl. ſuec.* 1023.

*—capillaris ſimpliciſſima enodis. *fl. leyd. prodr.* 515.

*—fluviatilis ſericea vulgaris & fluitans. *hiſt. muſc.* 12.

Conferva Plinii. *lob. ic.* 257.

* Alga viridis, capillaceo folio. *Pin.* 364.

2. CONFERVA fontalis ramoſiſſima glomeratim congeſta. *hiſt. muſc.* 28.

Conferva trichodes vel Trichomanes aquaticum. *hiſt. lugd.* 1022.

* Alga fontalis trichodes. *Pin.* 364.

a. Conferva minor ramoſa. *hiſt. ox.*

3. *ſect.* 15. *tab.* 4. *ex hiſt. muſc.*

* Alga viridis, brevioribus ſetis. *bot. par.* 4.

3. CONFERVA reticulata. *hiſt. muſc.* 20. *fl. ſuec.* 1025. *Rai. hiſt. app.* 1852. *bot. par.* 40.

4. CONFERVA fluviatilis nodoſa, fucum æmulans. *hiſt. muſc.* 39.

Corallina fluviatilis non ramoſa. *bot. par.* 40.

* Equiſetum, ſive hippuris exigua fluviatilis petræa nuda Virginienſis. *Pluk. Phyt. tab.* 193. *f.* 7.

5. CONFERVA fontana nodoſa, ſpermatis ranarum inſtar lubrica minor & viridis. *hiſt. muſc.* 37.

Corallina pinguis ramoſa viridis. *bot. par.* 40.

* Conferva fontalis geniculata lubrica minor. *Dill. Cat.* 200.

FUNGI.

1. AGARICUS cauleſcens, lamellis ramoſis decurrentibus. *fl. ſuec.* 1049.

*——cauleſcens fulvus, pileo conca-

vo, margine reflexo, lamellis erectis, ſtipite breviſſimo. *fl. lapp.* 493.

* Merulius flavus, oris contortis & laceris. *Hall. Helv.* 33.

* Elvela. *variet.* Elvelæ *ſubſeq. n.* 5. *ex obſ. pl.*

Fungus anguloſus & velut in lacinias diſſectus. *Pin.* 371.

*—luteus ſive pallidus, *Chanterelle* dictus, ſe contorquens eſculentus. *Bauh. hiſt.* 3. 832.

2. AGARICUS qui fungus pileolo lato & rotundo. *Pin.* 370.

* Fungus pileolo lato & rotundo livido. *Pin.* 370.

3. AGARICUS qui fungus pileolo lato orbiculari candicante. *Pin.* 370.

4. AGARICUS qui fungus pileolo rotundiori, *Mouceron* dictus. *I. R. H.* 557.

5. AGARICUS qui fungus albus, pileolo inverſo. *I. R. H.* 559.

6. AGARICUS qui fungi lutei pernicioſi ſub pinu habitantes. *Bauh. hiſt.* 3. 832.

7. AGARICUS cauleſcens, pileo

planiusculo lacteſcente, margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *fl. ſuec.* 1036.

* Fungus piperatus albus craſſus, lacteo ſucco turgens. *Mich. nov. gen.* 141. *Hall. Helv.* 34.

Fungus albus acris. *Pin.* 371.

8. AGARICUS qui fungus lacteus maximus infundibuli formâ. *bot. par.* 61.

9. AGARICUS qui fungus obſoletè albidus, pileo leniter excavato, lacte roſeo. *Hall. Helv.* 44.

Fungus lacteſcens prægnantiſſimus. *bot. par.* 61.

10. AGARICUS qui fungus lacteſcens piperatus rufus. *bot. par.* 61.

11. AGARICUS qui fungus ſiccus ex albo cinereus, lamellis ſordidè rubellis. *Hall. Helv.* 45.

Fungus noſtras, pediculo brevi in pileolum didymum abeunte. *Cimel. Reg.*

12. AGARICUS qui fungus eſculentus acris albus, pileolo turbinato ad oras angulato & ſubtùs repando.

Mich. nov. gen. 143. *Hall. Helv.* 34.

Fungus albidus, infundibuli formâ paluſtris. *bot. par.* 62.

13. AGARICUS qui fungus pileo plano, aurantius ſubtùs flavus. *Hall. Helv.* 46.

an Fungus glutine flavo limacino reſplendens. *bot. par.* 62.

a. an Fungi plures, ex uno pede à prunorum radicibus enati. *Rai. hiſt.* 1. 99. *ex Hall. Helv.*

* Fungus multiplex parvus luteus, pileolo molliter convexo. *cimel. reg.*

14. AGARICUS qui fungus griſeus holoſericeus, pileolo crenelato. *bot. par.* 63.

15. AGARICUS qui fungus, pileolo ſtraminei coloris. *bot. par.* 63.

16. AGARICUS qui fungus gilvus, margine tenuiſſimo. *bot. par.* 63.

17. AGARICUS qui fungus eſculentus, pileolo è griſeo plumbeo & veluti ſquamoſo, lamellis ſimul cum breviori & habitiori pediculo albis. *Hall. Helv.* 41.

Fungus pileolo conico maculato. *bot. par.* 63.

18. AGARICUS qui fungus aurantius, pileo hemisphærico. *Hall. Helv.* 46.

Fungus totus per maturitatem coloris aurantii. *bot. par.* 64.

19. AGARICUS qui fungus siccus vaccini coloris. *Hall. Helv.* 49.

an Fungus margine per maturitatem sursum repando. *bot. par.* 64.

20. AGARICUS qui fungus pileolo hemisphærico, murinus. *Hall. Helv.* 55.

an Fungus lætè fusco colore. *bot. par.* 64?

21. AGARICUS qui fungus lætè fusco colore, pediculo breviore. *bot. par.* 64.

22. AGARICUS qui fungus clypeiformis major. *Pin.* 373.

23. AGARICUS qui fungus clypeiformis minor. *Pin.* 373.

24. AGARICUS qui fungus pernicioſus ex eodem pediculo multiplex. *I. R. H.* 560.

25. AGARICUS qui fungus subtùs niveus brevi petiolo, pileo ad oras rugoso, varii coloris. *Hall. Helv.* 39.

Fungus piperatus non lacteſcens, coloris braſilici. *bot. par.* 63.

a. Fungus piperatus non lacteſcens. *bot. par.* 63. *ex Hall. Helv.*

b. Fungus magnus albus, pileo lato, pronâ parte ſordidè cæruleo. *bot. par.* 67. *ex Hall. Helv.*

26. AGARICUS qui fungus parvus, pediculo oblongo, galericulatus, ſtriis lividis aut nigris. *Rai. ſyn.* 13. *n.* 14.

27. AGARICUS qui fungus exiguus conicus ſtriatus dilutè rubellus. *Hall. Helv.* 49.

an Fungus pileolo albo, centro rufeſcente. *bot. par.* 65.

28. AGARICUS qui fungus capite hemiſphærico pallidè luteſcente. *bot. par.* 65.

29. AGARICUS qui fungus capitulo conico pallidè cinericio, centro fuſco. *bot. par.* 65.

30. AGARICUS qui fungus albus, laminis tenerioribus, sæpè viscidus. *Hall. Helv.* 35.

Fungus totus albus. *bot. par.* 65.

a. Fungus mediæ magnitudinis, totus albus. *bot. par.* 63. *ex Hall. Helv.*

b. Fungus albus splendens ex uno pediculo multiplex. *I. R. H.* 560. *ex Hall. Helv.*

c. Fungus colore lacteo. *bot. par.* 64. *ex Hall. Helv.*

d. Fungus capite expanso, viscosus. *bot. par.* 78. *ex Hall. Helv.*

31. AGARICUS qui fungus totus griseus. *bot. par.* 65.

32. AGARICUS qui fungus siccior pulvinatus rufus, lamellis rarioribus. *Hall. Helv.* 49.

Fungus multiplex sordidè carneus. *bot. par.* 66.

33. AGARICUS qui fungus pileo conico, leonini coloris. *Hall. Helv.* 54.

an Fungus nostras multiplex pileolo lato mammoso. *bot. par.* 66 ?

34. AGARICUS qui fungus pileo

obtusè conico, coccineus, orâ lamellarum flavâ. *Hall. Helv.* 48.
an Fungus parvus coccineus. *Cimel. Reg*?

35. AGARICUS qui fungus tener papillatus ſtriatus griſeus, laminis raris nigerrimis. *Hall. Helv.* 56.

Fungus minimus totus niger umbilicatus. *bot. par.* 66.

36. AGARICUS qui fungus minor totus rufus. *bot. par.* 66. *tab.* 13. *f.* 10. 11. 12.

37. AGARICUS qui fungus minor, citrino colore, pedunculo flaveſcente. *bot. par.* 66. *tab.* 12. *f.* 12. 13. 14.

38. AGARICUS qui fungus minor, pilei ſuperficie floſculis fuſcis villosâ. *bot. par.* 67. *tab.* 13. *f.* 4. 5. 6.

39. AGARICUS qui fungus durior totus amethyſtinus, lamellis craſſioribus. *Hall. Helv.* 52.

Fungus minor amethyſtinus. *bot. par.* 67.

40. AGARICUS cauleſcens, pilei

margine violaceo tomentoso, capite cæruleſcente lanâ ferrugineâ. *fl. ſuec.* 1067.

* Fungus eſculentus bulboſus, dilutè purpureus. *Hall. Helv.* 52.

Fungus major violaceus. *bot. par.* 67.

41. AGARICUS qui fungus tener dilutè violaceus, oræ ſtriatâ. *Hall. Helv.* 53.

Fungus dilutè carneus vel incarnatus. *bot. par.* 67.

42. AGARICUS qui fungus aurantii coloris capitulo in conum abeunte. *I. R. H.* 559. *tab.* 327.

43. AGARICUS qui fungus flaveſcens viſcidus, oris ſtriatis. *Hall. Helv.* 46.

an Fungus aureus, capitulo in conum abeunte. *bot. par.* 67.

a. an Fungus glutinoſus colore aurantio. *bot. par.* 72. *ex Hall. Helv.*

44. AGARICUS qui fungus pileo campanulato rufo, lamellis albidis tenerior. *Hall. Helv.* 38.

Fungus colore caſtaneo, margine

per maturitatem introrſum convoluto. *bot. par.* 68.

45. AGARICUS qui fungus minimus, pediculo conico. *bot. par.* 68.

46. AGARICUS cauleſcens, pileo hemiſphærico ſordido, umbilico prominente, lamellis albis, ſtipite longo cylindraceo albo. *fl. lapp.* 506. *fl. ſuec.* 1057.

* Fungus viſcidus papillaris ſtriatus terreus, ſubtùs albus. *Hall. Helv.* 41.

Fungus clipeatus in medio protuberans. *bot. par.* 68.

47. AGARICUS qui fungus capitulo mammoſo, centro papillari. *bot. par.* 69.

48. AGARICUS qui fungi uli incarnati coloris, minuti, muſco innati. *Mentz. pugill. tab.* 6.

49. AGARICUS qui fungus colore homogeneo pallido, pileolo & pediculo glutine obducto. *bot. par.* 69.

50. AGARICUS qui fungus viſcidus ex albo flavus, pileolo conico, pediculo gracili. *Hall. Helv.* 47.

an Fungus colore homogeneo grisco, pediculo glutine obducto. *bot. par.* 69.

51. AGARICUS qui fungus pediculo croceo, splendoris participe. *bot. par.* 69. *tab.* 11. *f.* 16. 17. 18.

52. AGARICUS cauleſcens albus, pileo plicato membranaceo, ſtipite nigro. *fl. ſuec.* 1054.

*——cauleſcens albus minimus, petiolo anguſto, pileo plano venoſo, margine octifido. *fl. lapp.* 472.

Fungus pileolo candicante, lamellis paucis, pediculo fuſco ſplendente. *bot. par.* 69. *tab.* 11. *f.* 21. 22. 23. *Hall. Helv.* 36.

53. AGARICUS qui fungus parvus totus viridis & ad aureum non nihil tendens limacino glutine oblitus, pileolo extinctorii formâ, pediculo fiſtuloſo. *Mich. nov. gen.* 150. *Hall. Helv.* 48.

Fungus cono primum obtuſo, poſtea plano, pileolo, & pediculo glutine obducto. *bot. par.* 70.

54. AGARICUS qui fungus fimi

equini, capitulo pileum romanum referente. *bot. par.* 70.

55. AGARICUS acaulis, lamellis bifidis pulverulentis. *fl. fuec.* 1083.
*——lateraliter ſeſſilis, ſuperne protuberans rotundus lignoſus. *obſ. pl.* 21.

* Agarico-fungus lamellis bifidis pulverulentis. *Hall. Helv.* 58.

Fungus parvus lamellatus, pectunculi formâ, alno adnaſcens. *Rai. ſyn.* 14. *n.* 27. *bot. par.* 70. *tab.* 10. *f.* 7.

56. AGARICUS cauleſcens, pileo luteo convexo ſtriato, lamellis ſtipiteque albis. *fl. fuec.* 1053.

Fungus minimus aurantius mammillaris. *bot. par.* 76. *tab.* 11. *f.* 19. 20.

57. AGARICUS qui fungus pileolo latiſſimè conico, murinus. *Hall. Helv.* 55.

an Fungus capitulo mammoſo. *bot. par.* 70?

58. AGARICUS qui fungus flavus, annulo fugaci, lamellis ex ſulphureo fuliginoſis. *Hall. Helv.* 55.

Fungus noſtras multiplex, pediculo fiſtuloſo. *bot. par.* 70.

59. AGARICUS qui fungus pileolo planiori viridi, lamellis ſtramineis. *Hall. Helv.* 48.

an Fungus mediæ magnitudinis, pileolo ſupernè ĕ rufo flavicante, lamellis ſubtùs ſordidè virentibus. *Rai. hiſt.* 3. 17?

60. AGARICUS qui fungus parvus, pediculo oblongo, pileolo hemiſphærico ex albido ſubluteus. *Rai. ſyn.* 13. *n.* 13.

61. AGARICUS cauleſcens, pileo plicato membranaceo, lamellis baſi latioribus. *fl. ſuec.* 1033.

*—cauleſcens albus parvus, ſtipite longo, pileo plano pellucido, margine multifido. *fl. lapp.* 471.

* Fungus minimus totus albus, pileolo hemiſphærico utrinque ſtriato, lamellis rarioribus. *Mich. nov. gen.* 166. *Hall. Helv.* 36.

Fungus minimus albus umbilicatus ſtriatus. *bot. par.* 71.

62. AGARICUS cauleſcens, pileo

conico cinereo, lamellis albis, ſtipite longo. *fl. lapp.* 502. *fl. ſuec.* 1054.

* Fungus minimus fimetarius, pileolo undique ſtriato cinereo aut murino, pediculo lanuginoſo & fiſtuloſo albo. *Mich. nov. gen.* 167. *Hall. Helv.* 42.

Fungus multiplex obtusè conicus, colore griſeo murino. *bot. par.* 71. *tab.* 12. *f.* 1. 2.

63. AGARICUS qui fungus farinoſus, lamellis tenuiſſimis, variabilis. *Hall. Helv.* 56.

Fungus typhoides. *bot. par.* 72.

64. AGARICUS qui fungus multiplex ovatus cinereus minor. *bot. par.* 72.

65. AGARICUS qui fungus campanulatus ſubhirſutus albidus. *Hall. Helv.* 36.

Fungus minor tenerrimus, farinâ reſperſus pileolo ſupernè cinereo, lamellis ſubtùs tenuiſſimis creberrimis nigris. *Rai. ſyn.* 13. *n.* 12.

66. AGARICUS qui fungus foliaceus vel lamellatus, infundibuli

formâ, fuſco-lividus. *bot. par.* 73.

67. AGARICUS qui fungus campaniformis murinus, lamellis umbrinis. *Hall. Helv.* 55.

Fungus multiplex campaniformis, colore fuſco. *bot. par.* 73.

68. AGARICUS qui fungus tener campaniformis obſoletè ruber. *Hall. Helv.* 50.

Fungus multiplex campaniformis, colore caſtaneo. *bot. par.* 73.

69. AGARICUS qui fungus capitulo mammoſo rufeſcente. *bot. par.* 73.

70. AGARICUS qui fungus multiplex ovatus cinereus. *bot. par.* 73. *tab.* 12. *f.* 10. 11.

71. AGARICUS pediculo annulato, pileo & pediculo variegatis. *obſ. pl.* 23.

Fungus pileolo lato, longiſſimo pediculo variegato. *Pin.* 371.

72. AGARICUS qui fungus annulatus, pileo umbonato villoſo & lamellis ochroleucis. *Hall. Helv.* 44. *an.* Fungus pileolo lato, micis furfuraceis aſperſo. *bot. par.* 74.

73. AGARICUS qui fungus phalloides annulatus, ſordidè vireſcens & patulus. *Cimel. reg.*

74. AGARICUS cauleſcens, pileo convexo cinereo, verrucis lamelliſque albis, ſtipite baſi craſſiuſculo. *fl. lapp.* 512. *fl. ſuec.* 1077.

* Fungus pileo plano ad oras ſtriato ſordido, verrucoſo ſubtùs albus annulatus. *Hall. Helv.* 43.

Fungus phalloides. *bot. par.* 74.

a. Fungus pediculo in Bulbi formam excreſcente. *Pin.* 371. *ex Hall. Helv.*

75. AGARICUS qui fungus pileolo lato puniceo, lacteum & dulcem ſuccum fundens. *Pin.* 371.

76. AGARICUS cauleſcens, pileo convexo ſquamato albido, lamellis rufis. *fl. ſuec.* 1045.

*——cauleſcens petiolo ſordido lacero, pileo albo membranaceo, lamellis rufeſcentibus. *fl. lapp.* 482.

Fungus campeſtris albus ſupernè, infernè rubens. *Bauh. hiſt.* 3. 824. *Hall. Helv.* 50.

a. AGARICUS pediculo annulato,

totus albus. *obſ. pl.* 22. *ex Hall. Helv.*

Fungus totus albus edulis. *bot. par.* 75.

77. AGARICUS qui fungus colore candido tuberculis flavo-fuſcis elegantiſſimè variegato. *bot. par.* 75.

78. AGARICUS qui fungus centro mammoſo rufo, circulo ſordidè albo circumdato. *bot. par.* 76.

1. BOLETUS acaulis pulvinatus lævis, poris tenuiſſimis. *fl. ſuec.* 1096.

*——lateraliter ſeſſilis ſemiſphæricus lignoſus. *obſ. pl.* 19.

Agaricus pedis Equini facie. *I. R. H.* 562. AGARIC.

2. BOLETUS qui Agaricus Lichenis facie. *I. R. H.* 562.

3. BOLETUS qui Agaricus foliatus cornua Damæ referens. *act. Acad. reg. Sç.* 89.

4. BOLETUS qui Agaricus præcox, albo gilvus criſtatus. *I. R. H.* 562.

5. BOLETUS mollis, pediculo in centro pilei. *obſ. pl.* 20.

* Suillus ſpadiceus infernè pallidus. *Hall. Helv.* 30.

Fungus poroſus magnus craſſus. *Bauh. hiſt.* 3. 838.

a. Fungus poroſus magnus craſſus purpuraſcens. *I. R. H.*

6. BOLETUS qui ſuillus miniatus, infernè ochroleucus. *Hall. Helv.* 30.

Fungus poroſus magnus craſſus, tuberculis minimis exaſperatus, colore Pomi aurantii exſiccati. *bot. par.* 59.

7. BOLETUS cauleſcens pileo livido ſubviſcido, poris flavis convexis, ſtipite albido. *fl. ſuec.* 1088.

* Suillus annulatus terreus, infernè flaveſcens. *Hall. Helv.* 29.

Fungus poroſus magnus craſſus, coloris caſtanei nunc liquidioris, nunc magis ſordidi. *bot. par.* 59.

*—poroſus maximus craſſus luteus lacer, pediculo longiſſimo vireſcente. *Cimel. reg.*

*—~~porus~~ poroſus noſtras brachiatus maximus. *Cimel. reg.*

8. BOLETUS qui Suillus purpu-

reus infernè flavus. *Hall. Helv.* 31.

Fungus porosus medius sordidè purpurascens. *bot. par.* 59.

9. BOLETUS cauleſcens, pileo testaceo, poris compositis angulatis griseis. *fl. suec.* 1087.

* Suillus fulvus infernè ex flavo virescens. *Hall. Helv.* 29.

Fungus porosus. *bot. par.* 59.

a. Fungus porosus medius, superficie sordidè albâ, tuberculis castaneis variegatâ. *bot. par.* 59. *ex Hall. Helv.*

10. BOLETUS qui Suillus villosus cervinus infernè albidus. *Hall. Helv.* 30.

Fungus porosus, pediculo ovali, pileoli superficie sordidè albâ. *bot. par.* 60.

* Suillus totus leonini coloris. *Hall. Helv.* 30.

Fungus porosus, pediculo ovali, pileoli superficie splendidè croceâ. *bot. par.* 60.

* Suillus spadiceus, infernè pallidus. *Hall. Helv.* 30.

Fungus porosus, pediculo ovali,

pileoli ſuperficie caſtaneâ. *bot. par.* 60.

11. BOLETUS qui fungus poroſus fuſcus, pediculo tumeſcente. *bot. par.* 60.

12. BOLETUS cauleſcens perennis, pileo utrinque planiuſculo. *fl. lapp.* 519. *fl. ſuec.* 1086.

Fungus lignoſus faſciatus. *bot. par.* 61. *tab.* 12. *f.* 7.

1. HYDNUM cauleſcens, pileo convexo lævi flexuoſo. *fl. ſuec.* 1098.

* Hydna pediculata, pileo inæqualiter laciniato ſcabro flavo. *obſ. pl.* 21.

* Erinaceus eſculentus, pallidè luteus. *Mich. nov. gen.* 132. *Hall. Helv.* 32.

Fungus erinaceus. *bot. par.* 58.

1. PHALLUS pileo ovali, ſtipite nudo rugoſo. *fl. ſuec.* 1102.

*—petiolo nudo, pileo ſubtùs undique adnexo. *hort. cliff.* 479. *fl. leyd. prodr.* 517.

Boletus eſculentus rugoſus albicans quaſi fuligine infeſtus. *I. R. H.* 561. MORILLE.

*—eſculentus rugoſus fulvus. *I. R. H.* 561.

2. PHALLUS qui Boletus nigricans, capitulo fastigiato. *bot. par.* 22.

3. PHALLUS qui Boletus flavicans, capitulo foliato. *bot par.* 22.

4. PHALLUS volvâ exceptus, pileo apice pervio. *hort. cliff.* 478. *fl. leyd. prodr.* 517.

Boletus phalloides. *I. R. H.* 561.

1. ELVELA infundibuliformis, ore expanso laciniato punctato. *obs. pl.* 11.

* Peziza conica labro reflexo. *Hall. Helv.* 21.

Fungoides nigricans majus cornucopiæ formâ. *bot. par.* 57. *tab.* 13. *fig.* 2. & 3.

2. ELVELA sessilis scutellata. *obs. pl.* 10.

* Peziza disciformis ciliaris coccinea. *Hall. Helv.* 20.

Fungoides qui fungus minimus scutellatus, coloris aurantii. *Rai. syn.* 17. nº. 26.

3. ELVELA sessilis, multis amphractibus cochleata. *obs. pl.* 10.

* Peziza

* Peziza purpurea, acetabulo imperfecto. *Hall. Helv.* 19.

Fungoides auriculam Judæ referens intùs rufescens, extùs candicans & quasi farinosum. *bot. par.* 57. *tab.* 11. *f.* 8.

4. ELVELA pediculata pileata, pileo expanso subtùs revoluto glutinoso. *obs. pl.* 11.

Fungus gelatinus flavus. *bot. par.* 58. *tab.* 13. *f.* 7. 8. 9.

5. ELVELA pediculata pileata, pileo subtùs reticulato. *obs. pl.* 12.

Fungus minimus flavescens, infundibuli formâ. *Pin.* 373.

a. Fungus pileolo per maturitatem instar Agarici intybacei laciniato. *bot. par.* 60. *tab.* 11. *f.* 11. 12. 13. *ex obs. pl.*

1. CLAVARIA clavata integerrima, capite squamosa. *obs. pl.* 8.

Clavaria militaris crocea. *bot. par.* 39. *tab.* 7. *f.* 4.

2. CLAVARIA clavæformis simpliciſſima. *fl. suec.* 1104.

*—clavata integerrima obtusa erecta. *hort. cliff.* 479. *fl. leyd. prodr.* 517.

Clavaria alba Piſtilli formâ. *bot. par.* 39. *tab.* 7. *f.* 5.

3. CLAVARIA clavata integerrima compreſſa obtuſa. *obſ. pl.* 8.

Clavaria ophioglosſoides nigra. *bot. par.* 39. *tab.* 7. *f.* 3.

4. CLAVARIA ramis confertis ramoſiſſimis inæqualibus. *fl. ſuec.* 1106.

*——ramoſiſſima. *fl. leyd. prodr.* 518.

Corallo-fungus flavus. *bot. par.* 41. *tab.* 8. *f.* 4.

* Coralloides flava. *Bauh. hiſt.*

a. Corallo-fungus albidus. *bot. par.*

* Coralloides albida. *I. R. H.* 564.

b. Corallo-fungus dilutè purpuraſcens. *bot. par.*

* Coralloides dilutè purpuraſcens. *I. R. H.*

c. Corallo-fungus candidiſſimus. *bot. par. tab.* 7. *f.* 2.

d. Corallo-fungus croceus ornithopodioides. *bot. par.* 41.

} *ex fl. ſuec. Hall. Helv. & obſ. pl.* 10.

5. CLAVARIA lignea nigra. *obſ. pl.* 10.

Corallo-fungus digitatus niger. *bot. par.* 41.

* Agaricus digitatus niger, *I.R.H.* 562.

a. Corallo fungus digitatus niger apicibus albidis. *bot. par.* 41. *ex obſ. pl.*

* Agaricus digitatus niger apicibus albidis. *I. R. H.* 562.

6. CLAVARIA quæ Fungus niger compreſſus variè divaricatus, & implexus inter lignum & corticem. *Rai. ſyn.* 333.

1. PEZIZA calyciformis lentifera lævis. *Dill. Giſſ.* 195. *fl. ſuec.* 1109. *—calyce campanulato. *hort. cliff.* 479. *fl. leyd. prodr.* 518.

Fungoides infundibuli formâ ſemine fœtum. *I. R. H.* 560.

2. PEZIZA calice campanulato internè ſtriato, externè ſquamoſo. *obſ. pl.* 15.

Fungoides infundibuli formâ, ſemine fœtum, interne ſtriatum, externè hirſutum. *bot. par.* 57. *tab.* 11. *f.* 4. 5.

3. PEZIZA ſordidè alba, acetabulo variabili. *Hall. Helv.* 19.

Fungoides fuſcum, acetabuli formâ, externè ramificatum. *bot. par.* 57. *tab.* 13. *f.* 1.

4. PEZIZA quæ Fungoides maximum & multiplex aurantii coloris, ad baſim rugoſum. *bot. par.* 57.

5. PEZIZA calice campanulato globoſo, ore crenato. *obſ. pl.* 16.

*—pediculata hemiſphærica, ore dentato. *Hall. Helv.* 21.

Fungoides glandis cupulam referens, margine dentato. *bot. par.* 57. *tab.* 11. *f.* 1. 2. 3.

6. PEZIZA quæ Fungoides coloris minii. Fortè Fungus membranaceus ſeu coriaceus, acetabuli formâ concavus, colore intùs coccineo ſeu crameſino ſaturo. D. Dale. *Rai. ſyn.* 19. *n°.* 39.

7. PEZIZA quæ Crepitus Lupi flaveſcens clavatus & fiſtuloſus. *Cimel. reg.*

1. LYCOPERDON ſubrotundum lanceolato-dehiſcens. *fl. ſuec.* 1115.

*—ſubrotundum laceratum dehiſ-

cens. *fl. lapp.* 525. *fl. leyd. prodr.* 518.

Lycoperdon vulgare. *I. R. H.* 563. VESSE DE LOUP.

a. Lycoperdon medium, cortice lacero. *I. R.H.* 563.

b. Lycoperdon niveum ſphœricum, ſuperficie in areolas adamantis inſtar diſſectas diſtributâ. *I. R. H.* 564. *ex Hall. Helv.* 12.

c. Lycoperdon excipuli chimici formâ. *I. R. H.* 564. *ex Hall. Helv.* 12.

d. Lycoperdon leve ſeſſile. *Hall. Helv.* 11. *variet. ex ipſo. Hall. Helv.* 12.

*—Cepæ facie. *bot. par.* 123.

e. Lycoperdon pyriforme verrucoſum. *bot. par.* 123. *ex Hall. Helv.* 12.

f. Lycoperdon minimum verrucoſum. *I. R. H.* 564. *ex Hall. Helv.*

2. LYCOPERDON petiolo tumido, capite ſubrotundo punctulis fuſcis aſperſo.

Lycoperdon è flavo vireſcens ſquamatum. *bot. par.* 122.

3. LYCOPERDON petiolo tumido, capite ſubrotundo ſquamis fuſcis

apice dehiſcentibus diſtincto.

Lycoperdon pediculo longiori tumido donatum. *I. R. H.* 563.

4. LYCOPERDON minus & multiplex ſphæricum. *I. R. H.* 563.

5. LYCOPERDON minus & multiplex ovatum. *I. R. H.* 563.

6. LYCOPERDON petiolo longiſſimo, capitulo globoſo glabro, ore cylindraceo integerrimo. *hort. cliff.* 479. *fl. ſuec.* 1112. *fl. leyd. prodr.* 519.

Lycoperdon Pariſienſe minimum, pediculo donatum. *I. R. H.* 563.

7. LYCOPERDON minus, pediculo donatum. *prodr. bot. par.* 74.

*——pediculo donatum, ex calice aſſurgens. *bot. par.* 122.

8. LYCOPERDON volvâ multivalvi patente, capitulo glabro, ore acuminato dentato. *hort. cliff.* 479.

Lycoperdon veſicarium ſtellatum. *I. R. H.* 564.

9. LYCOPERDON petiolatum, capite ſphæroidali baſi rugoſo, laciniis obtusè emarginatis dehiſcente.

Lycoperdon aurantii coloris, ad baſim rugoſum. *bot. par.* 122.

10. LYCOPERDON ſolidum. *fl. lapp.* 526. *fl. ſuec.* 1116. *fl. leyd. prodr.* 519.

* Tuber brumale, pulpâ obſcurâ odoratâ. *Hall. Helv.* 14.

Tubera. *Matth. Diſc.* 544. TRUFFE.

1. BYSSUS filamentoſa, filamentis longis albis ramoſiſſimis. *obſ. pl.* 5.

* Agarico-polyporus cruſtaceus undoſus albus. *Hall. Helv.* 28.

Corallo-fungus argenteus, omenti formâ. *bot. par.* 41.

* *an.* Fungus ramoſus candidus? *Pin.*

1. TREMELLA plicata undulata. *fl. ſuec.* 1018.

* Byſſus gelatinoſa fugax terreſtris. *fl. lapp.* 530.

* Tremella terreſtris ſinuoſa pinguis & fugax. *hiſt. muſc.* 52.

Noſtoc ciniflonum. *hiſt. par. bot par.* 144.

a. Tremella arborea nigricans minus

pinguis & fugax. *hiſt. muſc.* 54. *ex obſ. pl.* 48.

Noſtoc nigricans arboribus adnaſcens. *bot. par.* 144.

*——candicans arboribus adnaſcens. *bot. par.* 144.

2. Tremella foliis erectis, planis margine criſpo lacinulato. *fl. ſuec.* 1020.

* Lichenoides pellucidum, Endiviæ foliis tenuibus criſpis. *hiſt. muſc.* 143.

*——pellucidum fuſcum corniculatum. *hiſt. muſc.* 143.

Noſtoc quod Lichen terreſtris minimus fuſcus. *Rai. hiſt.* 3. 43. *bot. par.* 144. *& tab.* 21. *fig.* 15.

* Lichen terreſtris membranaceus mollior fuſcus, receptaculis florum ſordidè rubris perexiguis. *Mich. gen.* 76. *tab.* 38.

3. Tremella ſubgloboſa ſeſſilis ſolitaria glabra. *fl. ſuec.* 1022.

* Lichenoides tuberculoſum amœnè purpureum. *hiſt. muſc.* 127.

* Peziza è flavo rufa gelatinoſa difformis. *Hall. Helv.* 20.

Noſtoc granuloſus coccineus, arboribus adnaſcens. *bot. par.* 144.

LYTOPHYTA.

1. SPONGIA repens fragilis, ramis teretibus obtuſis. *hort. cliff.* 480. *fl. ſuec.* 1132. *fl. leyd. prodr.* 522.

*——ramis teretibus obtuſis. *fl. lapp.* 535.

Spongia ramoſa fluviatilis polyſperma ad confervam accedens. *fl. Jenens.* 368. EPONGE.

Limnoſpongia vulgaris.

FIN.

CORRRECTIONS

ET ADDITIONS.

Corrigez.

L'Impression de ce Livre étoit bien avancée quand on a reçu celui de M. Linnæus, intitulé *Hortus Upsaliensis*, c'est pourquoi on rapporte ici en additions les Phrases qui en sont tirées, & qui n'ont pû être mises dans le corps de cet Ouvrage.

Pag. 2. ligne 3. Stellaria. *lisez* *a.* Stellaria.
Ibid. l. 6. *a.*— *lisez* *b.* Stellaria.
Ibid. l. 9. *b.*— *c.* Stellaria.
Pag. 3. l. 4. *a.*— *—
Pag. 4. l. 2. Veronica. *—ead.
Pag. 7. l. 24. *— *a.* Veronica.
Pag. 8. l. 8. Ocymi. Ocimi.
Pag. 34. l. 20. *— *
Pag. 41. l. 27. radice annuâ. *lis.* glumarum ciliis glabris. *hort. Upſ.* 22.
Pag. 44. *aprés la lig.* 6. *ajoutez*.

1. DIPSACUS foliis connato-perfoliatis. *hort. Upſ.* 25.

Ibid. l. 7. 1. DIPSACUS. *liſ.* *——

Ibid. *aprés la ligne* 13. *aj.*

2. DIPSACUS foliis petiolatis appendiculatis. *hort. Upſ.* 25.

Ibid. l. 14. 2. DIPSACUS. *liſez* *——

Pag. 48. *effacez les lig.* 16——20.

Pag. 40. l. 11. quod album. *liſ.* quod Gallium album.

Ibid. *effacez les lig.* 23. 24.

Pag. 54. *l.* 8. petiolis. *liſ.* petiolatis.

Pag. 59. l. 25. *a.* Cynogloſſum. *liſez* 2. CYNOGLOSSUM.

Pag. 71. *l.* 24. Lateralibus terminatricibus. *liſ.* lateralibus & terminatricibus.

Pag. 89. *l.* 24. OENANTHE. *liſ.* 1. OENANTHE.

Pag. 94. l. 24. *——PIMPINELLA. *liſ.* * Pimpinella.

Pag. 95. *aprés la ligne* 23. *aj.*

2 VIBURNUM foliis trilobis dentatis. *hort. Upſ.* 69.

Ibid. *l.* 24. 1. Opulus. *lif.* Opulus.

Pag. 100. *aprés la ligne* 8. *aj.*

3. ALLIUM ſcapo nudo folia adæquante, foliis teretibus ſubulato-filiformibus. *hort. Upſ.* 78.

Ibid. l. 9. 1. CEPA. *lif.* * Cepa.

Ibid. *aprés la ligne* 18. *aj.*

4. ALLIUM caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis, vaginis ancipitibus. *hort. Upſ.* 77.

* Porrum capitulo bulboſo erecto, foliis planis ſubcrenatis, vaginis anticipitibus. *fl. ſuec.* 266.

Allium ſylveſtre amphicarpon, foliis porraceis, floribus & nucleis purpureis. *Rai. ſyn.* 230.

Ibid. l. 19. 2. Cepa. *liſez* 1. CEPA.

Pag. 101. l. 6. 3. *liſez* 2. & l. 10. 4. *liſez* 3.

Ibid. *effacez les lig.* 17—23.

Pag. 107. lig. 17. * foliis. *liſez* *—foliis.

Pag. 109. l. 13. anguſtifoliis. *liſez* anguſtifolius.

Pag. 110. l. 23. *—ſemine. *liſez* *—ead. ſemine.

Pag. 112. l. 7. lyratis. *lisez* panduræformibus.

Pag. 120. l. 8. panè. *lisez* penè.

Pag. 137. l. 5. eretiuſculis. *lisez* erectiuſculis.

Pag. 143. l. 5. germinaca. *lisez* germanica.

Ibid. l. 10. 1. *lisez* 2.

Pag. 158. lig. 11. racemoſo. *lisez* racemoſo, ſtigmate ſeſſili.

Pag. 160. *aprés la ligne 6. aj.*

1. Aquilegia nectariis incurvis. *hort. Upſ.* 152.

Ibid. l. 7. 1. Aquilegia. *lisez* *——

Pag. 177. *aprés la ligne 5. aj.*

1. MENTHA floribus ſpicatis, foliis oblongis ſerratis. *hort. Upſ.* 168.

Ibid. l. 6. 1. MENTHA. *lisez* *——

Ibid. l. 18. 2. MENTHA. *lisez c.* Mentha.

Ibid. l. 21. *aprés* 325. *aj. ex hort. Upſ.*

Ibid. l. 24. 3. *liſ.* 2.

Pag. 178. l. 4. *liſ.* 3. & l. 11. 5. *lisez* 4.

Pag. 179. *aprés la ligne* 22. *aj.*

1. STACHYS verticillorum floſculis quadraginta, caule lanato. *hort. Upſ.* 170.

Ibid. l. 23. 1. STACHYS. *liſez**—

Pag. 180. *aprés la ligne* 3. *aj.*

2. STACHYS verticillorum floribus duodecim, caule viſcoſo. *hort. Upſ.* 170.

Ibid. l. 4. 2. STACHYS. *liſez* *—

Pag. 192. *aprés la ligne* 7. *aj.*

2. SCROPHULARIA foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule acutangulo, racemis terminalibus. *hort. Upſ.* 177.

Ibid. l. 8. 2. SCROPHULARIA. *liſ.* *—

Pag. 192. *aprés la ligne* 12. *aj.*

1. DIGITALIS foliolis calycinis ovatis acutis, corollis obtuſis, labio ſuperiore integro. *hort. Upſ.* 178.

Ibid. l. 13. 1. DIGITALIS. *liſez* *—

Pag. 192. *aprés la ligne* 21. *aj.*

2. DIGITALIS foliis calycinis lanceolatis, corollis acutis, labio ſuperiore bifido. *hort. Upſ.* 178.

Ibid. l. 22. 2. DIGITALIS. *lisez* *—

Pag. 197. *après la lig.* 1. *aj.*

1. ALYSSUM ramulis suffruticosis diffusis, foliis punctato-echinatis. *hort. Upsal.* 185.

Ibid. l. 2. 1. ALYSSUM. *lisez* *—

Pag. 206. l. 20. quinque epartito-multifidis. *lisez* quinquepartito-multifidis.

Pag. 209. *après la ligne* 25. *aj.*

4. MALVA foliis radicalibus reniformibus incisis, caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *hort. Upsal.* 202.

Ibid. l. 26. 4. MALVA. *lisez* *—

Pag. 216. *après la ligne* 3. *aj.*

1. PISUM stipulis deorsùm gibbis crenatis, petiolis teretibus, caule tereti, pedunculis multifloris. *hort. Upsal.* 215.

Ibid. l. 4. 1. PISUM. *lisez* *—

Pag. 227. *effacez les lig.* 11—13.

Ibid. l. 14. 2. *lisez* 1.

Pag. 228. *après la ligne* 4. *aj.*

3. CICER pistillorum germinibus

undulato-plicatis. *hort. Upſ.* 224.

* Ervum leguminibus pendulis. *hort. cliff.* 370. *fl. leyd. prodr.* 390.

Ervum verum. *Cam. hort.* 57. ERS.

Pag. 228. *après la ligne* 11. *aj.*

2. ASTRAGALUS acaulis, ſcapo declinato longitudine foliorum, leguminibus ſubulatis teretibus ſubarcuatis glabris. *hort. Upſ.* 227.

Ibid. lig. 12. 2. ASTRAGALUS. *liſez* *——

Pag. 237. *après la ligne* 26. *aj.*

4. HIERACIUM caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis ſemiamplexicaulibus. *hort. Upſ.* 238.

Ibid. l. 27. *a.* Hieracium. *liſez* Hieracium.

Pag. 238. l. 3. *b. liſ. a.* & l. 5. 4. *liſez* 5.

Ibid. *effacez les lig.* 13——17.

Ibid. l. 18. 2. *liſez* 1. & l. 27. 3. *liſez* 2.

Pag. 239. l. 6. 4. *liſez* 3.

Pag. 243. l. 6. * annuus. *liſez* *——annuus.

Pag. 244. *après la lig.* 18. *aj.*

2. LAPSANA calycibus pyramidatis, seminibus papposis, foliis oblongis subdentatis scabris *hort. Upsal.* 245.

* Crepis foliis sagittato-dentatis, scapis ramulisque supernè conicè inflatis. *obs. pl.* 378.

CHONDRILLA Hieracii folio annua. *I. R. H.* 475.

Pag. 253. l. 6—9. foliis linearibus, caule &c. *lise* foliis semiamplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis utrinque pubescentibus, floribus conglomeratis. *fl. leyd. prodr.* 149.

Pag. 256. *après la lig.* 5. *aj.*

4. ERIGERON pedunculis unifloris lateralibus, calycibus squarrosis. *hort. Upsal.* 258.

* After foliis serratis, petiolis simplicibus lateralibus unifloris longitudine folii folioſis. *hort. cliff.* 409. *fl. leyd. prodr.* 169.

Virga aurea minor, foliis glutinosis & graveolentibus. *I. R. H.* 484.

Pag. 260. *effacez les lig.* 26. 27. & pag. 261. *les lig.* 2—5.

Pag. 302. l. 21. 121. *lis. Pin.* 121.

Pag. 304. *aprés la ligne* 21. *aj.*

2. ÆGILOPS ſpicâ compreſsâ ariſtis raris longiore.

Ibid. l. 22. **— liſez* Gramen.

Pag. 305. l. 24. Ocymi. *liſ.* Ocimi.

Pag. 316. l. 16. ** liſ. a.* & l. 18. *ajoutez ex fl. ſuec.*

Ibid. l. 22. ** liſez c.* & l. 23. *ajoutez ex fl. ſuec.*

Pag. 317. *effacez les lignes* 2. 3. 4.

Pag. 323. l. 8. ſteretibus. *liſez* ſterilibus.

Pag. 327. l. 7. capitulis. *liſez* capſulis.

Pag. 334. l. 9. ſilicinus. *liſez* ſilicinus.

Pag. 343. *aprés les lignes* 5. *aj.*

2. JUNGERMANNIA ſurculis linearibus planis æqualibus multoties dichotomis.

Ibid. l. 6. *effacez* 2. JUNGERMANNIA. quæ.

Pag. 366. l. 13. ex cavato. *liſez* excavato.

Pag. 372. l. 10. ovâ. *liſ.* orâ.

Pag. 373. l. 19. Fungilli. *liſez* Funguli.

Pag. 376. l. 13. ex albido. *liſez* exalbido.

Pag. 377. l. 5. undique. *liſez* undique & utrinque.

Pag. 381. l. 25. prorſus. *liſ.* poroſus.

Pag. 384. l. 19. ſcutella. *liſez* ſcutellata.

Pag. 3. *de la Préface*, *ligne* 22. nonmenclature. *liſez* Nomenclature.

Pag. xij. l. 10. ſinus eſt. *liſez* ſinus en eſt.

Pag. xxiv. n°. 61. *liſez* 61. *Teres*, celle qui eſt cilindrique dans toute ſa longueur, excepté au ſommet. *fig.* 62.

Pag. lij. l. 4. Sou ous-diviſions. *liſez* ou Sousdiviſions.

INDEX.

GENERUM

ET SYNONYMORUM.

A.

Abies. 295
Abrotanum. 255
Acer. 114. 115
Acetosa. 110. 111
Achillea. 263. 264
Acrosticum. 314
Actæa. 152
Adiantum. 317
Adonis. 162
Adoxa. 122
Ægilops. 304. 402
Ægopodium. 95
Agarico-fungus. 375
Agarico-Polyporus. 391
Agaricus. 364-380
Agaricus. 387
Agrimonia. 139
Agrostema. 135
Agrostis. 23-24
Aira. 25-27

Ajuga. 169
Alcea. 209. 210
Alchimilla. 53. 75. 126
Alga. 16. 297. 363. 364
Algoides. 280
Aliſma. 113
Alkekengi. 74
Allium. 99. 100. 396
Allium. 99-101
Alnus. 289
Alopecurus. 20. 21
Alſinaſtrum. 122. 123
Alſine. 130. 131
Alſine. 52. 56. 58. 130-134
Alſineformis. 43
Alſinoides. 43
Althæa. 210
Alyſſon. 193. 196. 197
Alyſſum. 197. 399
Amaranthus. 290. 291
Ammi. 86
Ammi. 86. 89.
Anacampſeros. 137
Anagallis. 64
Anagallis. 52
Anblatum. 191
Androſæmum. 235
Anemone. 161
Anethum. 94
Angelica. 88
Angelica. 87. 88. 95

Anonis. 214. 215
Anthemis. 262. 263
Anthericum. 101. 102
Anthoceros. 342
Anthoxanthum. 18
Anthyllis. 222
Antirrhinum. 184. 187
Antirrhinum. 185. 186
Aparine. 49. 50
Aparine. 46. 49. 50. 305
Aphaca. 217
Aphanes. 53
Apium. 95
Aquifolium. 54
Aquilegia. 160. 397
Arabis. 200
Arctium. 245
Arenaria. 131. 132
Ariſtolochia. 279
Artemiſia. 254. 255
Arum. 279
Arundo. 38
Arundo. 19
Aſarum. 138
Aſclepias. 76
Aſparagus. 103
Aſperugo. 61
Aſperula. 46. 47
Aſplenium. 310. 311
After. 259. 260
After. 255. 259. 260. 402

Aſterocephalus. 45
Aſtragalus. 228. 400
Atriplex. 305. 506
Atropa. 70
Avena. 36-38

B.

Ballota. 182
Ballote. 182
Balſamina. 271
Belladona. 70
Bellis. 264
Berberis. 109
Betonica. 176. 177
Betonica. 176. 177. 180
Betula. 289
Bidens. 251
Blattaria. 72
Blitum. 291
Boletus. 380-383
Boletus. 383. 384
Borrago. 61
Braſſica. 199
Briza. 30
Bromus. 31-33
Brunella. 183. 184
Bryonia. 296
Bryum. 317-326
Bryum. 336
Bugloſſum. 57. 59. 61
Bugula.

Bugula. 169. 170
Bulbocastanum. 86
Bunium. 86
Buplevrum. 91
Bursa pastoris. 196. 197
Butomus. 123
Buxus. 289
Byssus. 391

C.

Calamintha. 175
Calcitrapa. 267
Calendula. 268
Caltha. 169
Caltha. 268
Campanula. 66-69
Cannabis. 300
Caprifolium. 69
Cardamine. 168. 169
Cardiaca. 182
Carduus. 247-249
Carduus. 246-249. 267
Carex. 281-287
Carlina. 250
Carpinus. 294
Carthamus. 250
Carvi. 90 94
Carum. 94
Caryophyllata. 150

Caryophyllus. 124 125
Caſſida. 184
Caſtanea. 294
Cataria. 176
Caucalis. 84. 85
Celtis. 304
Cenchrus. 305
Centaurea. 265-267
Centaurium. 82
Centaurium minus. 81. 82
Centunculus. 52
Cepa. 100. 101
Ceraſtium. 134. 135
Ceraſus. 140. 141
Ceratophyllum. 292
Chærophyllum. 92
Chamæceraſus. 70
Chamædris. 170. 171
Chamæmelum. 262. 263
Chamæmerion. 116
Chamæpytis. 172
Chara. 361. 362
Cheiranthus. 197
Chelidonium. 152
Chenopodium. 77-80
Chondrilla. 236
Chondrilla. 235. 236. 238. 401
Chriſtophoriana. 153
Chryſanthemum. 261
Chryſocoma. 250
Cicer. 227. 400

Cichorium. 244
Cicuta. 80. 90
Circæa. 3
Cirsium. 246. 249
C[illegible]. 157. 158
Clandestina. 191
Clavaria. 385 387
Clematis. 160
Clematitis. 160
Clinopodium. 174
Clynopodium. 172. 174
Clymenum. 218
Clypeola. 196
Cnicus. 267
Cnicus. 250. 267.
Colchicum. 112
Colutea. 228
Comarum. 149
Conferva. 363. 364
Conium. 86
Convallaria. 103. 104.
Convolvulus. 65
Conyza. 255
Conyza. 250. 255. 260
Corallina. 348. 364
Corallo fungus. 386. 391
Coralloides. 346-351. 359 386
Coriandrum. 90
Corispermum. 1
Cornus. 52
Coronilla. 232. 233

Coronopus. 51
Corrigiola. 96
Corylus. 294
Craſſula. 98
Craſſula. 43
Cratægus. 141-143
Crepis. 238. 239
Crepis, 241. 401
Cruciata. 48. 49. 305
Cucubalus. 127. 128
Cupreſſus. 295
Cuſcuta. 53
Cyanus. 265
Cynogloſſum. 59. 395
Cynogloſſum. 57. 59
Cynoſurus. 30
Cyperoides. 281-287
Cyperus. 14. 15
Cyperus. 14-16
Cypripedium. 278
Cytiſo-geniſta. 213

D.

Damaſonium. 113. 114
Dantia. 53
Daphne. 117. 118
Datura. 70
Daucus. 85
Daucus. 84. 85
Delphinium. 159
Dens Leonis. 238. 240-242

Dentaria. 198
Descurea. 204
Dianthus. 124. 125
Digitalis. 192. 399
Digitalis. 9. 192
Dipsacus. 44. 395
Doria. 258
Doronicum. 256
Draba. 197
Drosera. 98

E.

Echinops. 245
Echinopus. 245
Echium. 61
Elatine. 122
Elichrysum. 252. 253
Elvela. 384. 385
Elvela. 365
Epilobium. 115. 116
Equisetum. 307. 308
Equisetum. 1. 307. 308. 364
Erica. 116. 117
Erigeron. 255. 402
Erinaceus. 383
Eriophorum. 18
Eruca. 201. 204. 205
Ervum. 227
Ervum. 400
Eryngium. 83
Erysimum. 200-202

Eſculus. 114
Ethuſa. 90
Evonymus. 52
Eupatorium. 250
Euphorbia. 153-156
Euphraſia. 189

F.

Faba. 220
Fagopyrum. 121. 122
Fagus. 294
Ferrum equinum. 232. 233
Feſtuca. 33-36
Feſtuca. 31-33. 36
Filago. 253. 254
Filicula. 311. 312. 314
Filipendula. 144
Filix. 309. 310. 312-314
Fluvialis. 280
Fœniculum. 86. 92-94
Fœnum græcum. 229. 231
Fontinalis. 339
Fragaria. 147
Frangula. 72
Fraxinus. 306
Fucus. 363
Fumaria. 210. 211
Fungoides. 384. 385. 387. 388
Fungus. 365-385. 391

G.

Galanthus. 99
Gale. 300
Galeopſis. 181
Galeopſis. 180-183
Galium. 47 49. 305
Gallium. 47. 48
Geniſta. 213. 214
Geniſta ſpartium. 214. 215
Geniſtella. 214
Gentiana. 80-82
Geranium. 206-208
Geum. 150
Glaucium. 152
Glaux. 109
Globularia. 43
Globularia. 44
Gnaphalium. 252-254
Gramen. 10. 13. 14. 19-42. 107-109 284-288. 304. 305.
Graminifolia. 361
Gratiola 8
Groſſularia. 74. 75

H.

Hedera. 74
Hedera terreſtris. 176
Hedyſarum. 231

Helianthemum. 157. 158
Heliotropium. 57
Helleborine. 276. 277
Helleborus. 169
Helxine. 121. 122
Hepatica. 340-344
Hepaticoides. 343-346
Heracleum. 93
Herba paris. 122
Herminium. 277
Herniaria. 76
Heſperis. 197
Heſperis. 197. 201
Hieracium. 237. 238-400
Hieracium. 237. 240. 242
Hippocaſtanum. 114
Hippocrepis. 232
Hippuris. 1
Hippuris. 361. 362
Hordeum. 42
Horminum. 9
Hottonia. 63
Humulus. 301
Hyacinthus. 104. 105
Hydna. 383
Hydnum. 383
Hydroceratophyllon. 292. 293
Hydrocharis. 303
Hydrocotyle. 83
Hyoſciamus. 70
Hyoſeris. 240

Hypericum. 233-235
Hypnum. 326-335
Hypochœris. 239
Hypophyllum. 343

I.

Jacea. 246. 265. 266
Jacobæa. 257-259
Jaſione. 268
Iberis. 195
Iberis. 194
Ilex. 54
Illecebrum. 76
Impatiens. 270
Imperatoria. 88
Iris. 13
Iſatis. 205
Iſchœmum. 287
Iſnardia. 53
Juglans. 293
Juncago. 112
Juncus. 105-109
Juncus. 14. 18. 105-109
Jungermannia. 342. 346. 403
Juniperus. 303

L.

Lactuca. 236
Lamium. 178. 179
Lampſana. 240. 244

Lappathum. 111 112
Lappa. 245
Lapsana. 244. 401
Laserpitium. 88
Lathræa. 191
Lathyrus. 216-218
Lemna. 360
Lens. 227
Lentibularia. 8
Lenticula. 360
Leontodon. 240-242
Leonurus. 182
Lepidium. 194
Leucanthemum. 261
Leucoium. 197. 201. 205
Lichen 346-359
Lichen. 340-343. 349-359. 392
Lichenastrum. 342-346
Lichenoides. 352-359. 392
Ligustrum. 2
Lilac. 2. 3
Lilium convallium 103. 104
Limnopeuce. 1
Limnospongia. 393
Limodorum. 275
Limosella. 193
Linagrostis. 18
Linaria. 185-188
Lingua cervina. 310
Linum. 97
Lithospermum. 58. 59

Lithoſpermum. 57. 58
Lobelia. 268
Lolium. 39. 40
Lonchitis. 314
Lonicera. 69
Lotus. 221. 222
Lupulus. 301
Luteola. 159
Lychnis. 135
Lychnis. 125. 126. 128-130. 132. 135.
Lycoperdon. 388-391
Lycopodium. 339. 340
Lycopſis. 61
Lycopus. 9
Lyſimachia. 63. 64
Lythrum. 138

M.

MAlva. 208. 209. 399
Malus. 144
Marchantia. 340. 341
Mariſcus. 14
Marrubiaſtrum. 176
Marrubium. 182
Marſilea. 360
Matricaria. 261. 262
Medica. 229-231
Medicago. 228-231
Melampyrum. 189. 190
Melica. 23

Melilotus. 227. 231
Melissa. 174. 175
Melissa. 174. 175. 178
Melissophyllon. 178
Melittis. 178.
Mentha. 177. 178. 397
Menyanthes. 62
Mercurialis. 302. 303
Merulius. 365
Mespilus. 142. 143
Milium. 23
Milium. 22. 23
Millefolium. 8. 63. 264
Mnium. 335. 336
Mollugo. 48
Monotropa. 123
Montia. 43
Morsus ranæ. 303
Morus. 290
Moschatellina. 122
Muscari. 105
Musco-fungus. 348
Muscus. 315-340. 344-346. 352. 360
Myagrum. 193
Myosotis. 57. 58
Myosotis. 134. 135
Myosuros. 98
Myosurus. 98
Myrica. 300
Myriophyllum. 292
Myrrhis. 92

N.

Naïas. 280
Napus. 199
Narciſſo-leucoium. 99
Narciſſus. 99
Nardus. 18. 19
Naſturtium. 194. 195
Neottia. 277
Nepeta. 176
Nidus avis. 277
Nigella. 160
Niſſolia. 218
Noſtoc. 391-393
Nummularia. 64
Nux juglans. 293. 294
Nymphæa. 150. 151
Nymphoides. 63
Oenanthe. 89. 90. 395
Onobrychis. 231
Ononis. 214. 215
Onopordum. 246
Ophioglosſum. 309
Ophrys. 278
Ophris. 277. 278
Opulus. 95
Oreoſelinum. 86. 87
Orchis. 271-275
Orchis. 271-278
Origanum. 174

Ornitogalum. 102. 103
Ornithopodium. 232
Ornithopus. 232
Orobanche. 190. 191
Orobanchoides. 123
Orobus. 221
Osmunda. 308. 309
Oxalis. 135
Oxicoccus. 119
Oxys. 136

P.

PAnicum. 21
P*anicum.* 21. 24
Papaver. 151. 152
Parietaria. 305
Paris. 122
Parnassia. 96
P*aronychia.* 77
Passerina. 118
Pastinaca. 94
Pedicularis. 188. 189
P*edicularis.* 188. 189
P*entaphylloides.* 149. 150
Peplis. 109
Percepier. 53
Persicaria. 119-121
P*ervinca.* 75
Petasites. 256
Peucedanum. 87

Peziza. 387. 388
Peziza. 384. 385. 392
Phalangium. 101. 102
Phalaris. 19. 20
Phallus. 383. 384
Phaseolus. 215
Phellandrium. 90
Phleum. 20
Physalis. 73
Phyteuma. 69
Piloſella. 238
Pilularia. 361
Pimpinella. 94
Pimpinella. 51. 291
Pinguicula. 8
Pinus. 295
Pisum. 216. 400
Plantaginella. 193
Plantago. 50. 51
Poa. 27-30
Poa. 26. 34. 35
Polium. 172
Polygala. 211. 212
Polygonatum. 104
Polygonifolia. 96
Polygonum. 121
Polygonum. 77
Polypodium. 311
Polypodium. 310-314
Polytrichum. 314-317
Populago. 169

Populus. 301. 302
Porrum. 101
Porrum. 100. 101. 396
Portulaca. 158
Potamogeito ſimilis. 280
Potamogeton. 54-56
Potamogeton. 292
Potentilla. 148. 149
Poterium. 291
Prenanthes. 235
Primula. 62
Primula veris. 62
Prunus. 139. 140
Pſeudoacacia. 215
Pſeudo Cyperus. 14
Pſyllium. 51
Ptarmica. 264
Pteris. 309. 310
Pulmonaria. 60
Pulſatilla. 160
Pyrola. 124
Pyrus. 143

Q.

Quercus. 293
Quinquefolium. 149

R.

Ranunculus. 163-168
Ranunculus. 98. 161-169

Raphaniſtrum. 198
Raphanus. 198
Rapiſtrum. 193. 194
Rapunculus. 69. 268
Rapuntium. 268
Reſeda. 159
Rhamnus. 72
Rhinanthus. 188
Ribes. 74. 75
Riccia. 342
Robinia. 215
Roſa. 144-146
Ros ſolis. 98
Rubeola. 47
Rubia. 50
Rubus. 146. 147
Rumex. 110 112
Ruſcus. 304
Ruta. 115
Ruta muraria. 311

S

Sagina. 56
Sagitta. 291
Sagittaria. 291
Salicaria. 138
Salix. 297-300
Salſola. 80
Salvia. 9. 10
Sambucus. 96

Samolus. 69
Sanguiſorba. 51
Sanicula. 83
Saponaria. 125. 126
Satyrium. 275. 276
Saxifraga. 127
Scabioſa. 44-46
Scandix. 91
Scilla. 102
Schoenus. 13. 14
Scirpus. 15-18
Scirpus. 14-18
Sclarea. 10
Scleranthus. 126
Scorzonera. 242
Scrophularia. 191. 192. 398
Scutellaria. 184
Secale. 41
Secale. 42
Sedum. 136. 137. 139
Sedum. 43. 98. 136. 137
Selinum. 86. 87
Sempervivum. 139
Senecio. 257-259
Serapias. 276. 277
Serpillum. 173. 174
Serratula. 246
Seſeli. 92. 93
Sherardia. 46
Sideritis. 176
Sideritis. 176. 180

Silene. 129. 130
Silibum. 247
Sinapi. 199. 200
Sinapis. 199. 200
Siſon. 89
Siſymbrium. 203-205
Siſymbrium. 202-204
Sium. 88. 89
Smilax. 104
Smirnium. 94
Solanum. 72. 73
Solidago. 256
Sonchus. 243. 244
Sorbus. 142
Sparganium. 288
Spartium. 213
Spergula. 133. 134
Sphagnum. 337. 338
Sphondylium. 93
Spongia. 393
Stachys. 179. 180. 398
Statice. 97
Stellaria. 1. 2
Stramonium. 70
Stratiotes. 63
Suillus. 381. 382
Symphitum. 59
Symphitum. 60
Syringa. 2

T.

T *Amnus.*	301
Tamus.	301
Tanacetum.	251
Taxus.	303
Teucrium.	170-172
Thalictrum.	162
Theſium.	75
Thlaſpi.	195. 196
Thymelæa.	118
Thymus.	172
Thyſſelinum.	87
Tilia.	153
Tillæa.	43
Tithymalus.	153-157
Tordylium.	84
Tormentilla.	149
Tragopogon.	242
Tragoſelinum.	94. 95
Trapa.	52
Tremella.	391. 392
Tremellæ.	362. 391
Tribuloides.	53
Trichomanes.	311
Trifolium.	222-226
Trifolium.	222-226. 231
Triglochin.	112
Trigonella.	228
Triticum.	40. 41
Tuber.	391

Tubera. 391
Turritis. 202
Turritis. 200. 202. 203
Tuſſilago. 256
Typha. 288

V.

Vaccinium. 118. 119
Valantia. 305
Valeriana. 11
Valerianella. 12
Valliſneria. 296
Verbaſcum. 70. 72
Verbena. 9
Veronica. 3-8
Viburnum. 95. 396
Vicia. 218-221
Vicia. 218-221. 227. 228
Vinca. 75
Viola. 268-270
Virga aurea. 256. 257. 261. 402
Viſcum. 300
Vitis. 74
Vitis idæa. 119
Ulex. 215
Ulmaria. 144
Ulmus. 82. 83
Ulva. 362. 363
Urtica. 288. 289
Uſnea. 359. 360

Utricularia. 8
Vulneraria. 222

X.

Xanthium. 290

Z.

Zannichellia. 280

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez & féaux Conſeillers, les geus tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, Grand Conſeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Juſticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre amé LAURENT DURAND, Libraire à Paris, nous a fait expoſer qu'il déſireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre *Flora Pariſienſis Prodromus*, ou *Catalogue des Plantes qui naiſſent dans les environs de Paris*, &c. s'il nous plaiſoit lui accorder nos Lettres de Privilége ſur ce néceſſaires A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expoſant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préſentes de faire imprimer ledit ouvrage en un ou pluſieurs volumes, & autant de fois que bon lui ſemblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par-tout notre Royaume pendant le tems de ſix années conſécutives, à compter du jour de la datte deſdites Préſentes : Faiſons défenſes à tous Imprimeurs Libraires & autres perſonnes de quelque qualité & condition qu'elles ſoient d'en introduire d'impreſſion étrangere dans aucun lieu de notre obéiſſance, comme auſſi

d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit ouvrage, ni d'en faire aucun extrait ſous quelque prétexte que ce ſoit, d'augmentation, correction, changement ou autres ſans la permiſſion expreſſe & par écrit dudit expoſant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiſcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit expoſant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la datte d'icelles, que l'impreſſion dudit ouvrage ſera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele ſous le contre-ſcel deſdites Préſentes, que l'impétrant ſe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. qu'avant de l'expoſer en vente, le manuſcrit qui aura ſervi de copie a l'impreſſion dudit ouvrage ſera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le ſieur Dagueſſeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, &

qu'il en ſera enſuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier le ſieur Dagueſſeau, Chancelier de France, le tout à peine de nullité deſdites Préſentes, du contenu deſquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expoſant & ſes ayant cauſes pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie deſdites Préſentes qui ſera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit ouvrage, ſoit tenue pour dûement ſignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés féaux Conſeillers & Sécretaires, foi ſoit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceſſaires, ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eſt notre plaiſir. DONNÉ à Verſailles le vingt-deuxiéme jour du mois de Mars, l'an de grace mil ſept cent quarante-neuf, & de notre regne le trente-quatriéme. Par le Roy en ſon Conſeil.

SAINSON.

Registré sur le Registre douze de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 125. fol. 114. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris, le premier Avril 1749.

G. CAVELIER, Syndic.

De l'Imprimerie de P. Alex. Le Prieur, Imprimeur-Libraire.